

# Übung Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Jiří Černý und Gerald Teschl

SS2016

1. Ein Marktforschungsinstitut hat für Sie folgende Daten erhoben: 80% ihrer potentiellen Kunden besitzen einen Computer, 70% haben einen DVD-Player und 40% besitzen beides. Bezahlen Sie die Rechnung des Marktforschungsinstituts?
2. Drücke die folgenden Ereignisse in Mengenschreibweise mit Hilfe der Ereignisse  $A$ ,  $B$  und  $C$  aus:  
 $D_1$  = „Mindestens eines der Ereignisse  $A$ ,  $B$  oder  $C$  tritt ein.“  
 $D_2$  = „Höchstens eines der Ereignisse  $A$ ,  $B$  oder  $C$  tritt ein.“  
 $D_3$  = „Weder  $A$  noch  $B$  noch  $C$  tritt ein.“  
 $D_4$  = „Mindestens eines der Ereignisse  $A$ ,  $B$  oder  $C$  tritt nicht ein.“  
 $D_5$  = „Genau eines der drei Ereignisse  $A$ ,  $B$  oder  $C$  tritt ein.“
3. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,  
a) beidemal 5    b) wenigstens einmal 1    c) Augensumme 4 zu werfen.
4. In einer Schublade sind 6 rote und 8 blaue Socken. Wenn Sie in der Dunkelheit (also zufällig) zwei Socken aus der Schublade ziehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit  
a) zwei rote    b) zwei blaue    c) zwei verschiedene    d) zwei zueinander passende Socken zu treffen?
5. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 90 Studierenden (mindestens) zwei am selben Tag Geburtstag haben?
6. Ein Multiple-Choice Test besteht aus 4 Fragen, bei jeder stehen drei Antworten zur Auswahl. Nur eine davon ist jeweils richtig. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, durch zufälliges Raten  
a) alle vier Fragen    b) nur eine Frage richtig zu beantworten?
7. In einer Warenpackung befinden sich 50 Stück, davon sind 5 fehlerhaft. Man entnimmt eine Stichprobe vom Umfang 2 (ohne Zurücklegen). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,  
a) kein fehlerhaftes Stück    b) ein fehlerhaftes Stück    c) zwei fehlerhafte Stücke zu ziehen?
8. **Ziege oder Mercedes?**: In einer Quizsendung wird folgendes Spiel gespielt: Ein Kandidat steht vor drei geschlossenen Türen. Es ist bekannt, dass sich hinter einer ein Mercedes, hinter den anderen beiden aber jeweils eine Ziege befindet. Der Kandidat wählt eine Tür, die aber geschlossen bleibt. Daraufhin öffnet der Quizmaster eine der beiden verbleibenden Türen, hinter denen sich eine Ziege befindet. Nun hat der Kandidat die Möglichkeit, bei seiner gewählten Tür zu bleiben, oder die andere noch

verschlossene Tür zu wählen. Bestimmen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für folgende Strategien:

- a) Der Kandidat entscheidet nach Zufall, welche der beiden noch verschlossenen Türen er wählt.
- b) Der Kandidat bleibt bei der Tür, die er zu Beginn gewählt hat.
- c) Der Kandidat wechselt zur anderen verschlossenen Tür.

9. **HIV Test:** Ein Test gibt mit 99.9%-iger Wahrscheinlichkeit bei einer mit HIV infizierten Person ein positives Testresultat. Mit 99.8%-iger Wahrscheinlichkeit gibt der Test bei einer nicht mit HIV infizierten Person ein negatives Testresultat. Man weiß weiters, dass insgesamt 0.05% der Menschen in Österreich infiziert sind.
  - a) Wie viele von 1000 getesteten HIV-positiven Personen erhalten fälschlicherweise ein negatives Testresultat (*falsch negativ*)?
  - b) Wie viele von 1000 getesteten nicht HIV-positiven Personen erhalten fälschlicherweise ein positives Testresultat (*falsch positiv*)?
  - c) Eine zufällig ausgewählte Person (nicht aus einer Risikogruppe) lässt sich testen und der Test fällt positiv aus. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie trotzdem nicht mit HIV infiziert ist?
10. **DNA-Test:** Am Tatort wird eine DNA-Probe sichergestellt. Von 1 Million Menschen hat statistisch gesehen nur einer ein DNA-Profil, das mit dieser Probe übereinstimmt. Nun wird ein DNA-Test an  $n$  Verdächtigen durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test irrt, ist 0.001%.
  - a) Bei wie vielen von 10 Millionen Menschen würden Sie ein positives Testergebnis erwarten?
  - b) Der Test bei Mr. X ist positiv, und er ist einer von  $n = 20$  möglichen Tätern. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mr. X unschuldig ist? Es darf angenommen werden, dass alle Personen verschiedene DNA-Profile haben.
11. Ein Kunde bezieht von einem Lieferanten Bauteile in Lieferungen zu je 1000 Einheiten. Bevor er eine Lieferung annimmt, macht er eine Stichprobenprüfung im Umfang von 100 Einheiten. Er nimmt die Lieferung an, wenn er in der Stichprobe höchstens 3 fehlerhafte Stück findet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Annahme, wenn in der Lieferung
  - a) 10      b) 20      c) 100 Einheiten fehlerhaft sind?
12. Bitfolgen der Länge 3 werden über einen Nachrichtenkanal gesendet, der Störungen ausgesetzt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bit falsch übertragen wird (d.h., dass eine gesendete Null als eine Eins ankommt oder umgekehrt), ist  $p = 0.001$  („Bitfehlerwahrscheinlichkeit“). Man interessiert sich für  $X = \text{Anzahl der Bitfehler in einer zufällig gesendeten Bitfolge der Länge 3}$ .
  - a) Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von  $X$  an.
  - b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass (mindestens) ein Bitfehler auftritt?
  - c) Wie viele Fehler sind im Mittel pro gesendeter Bitfolge zu erwarten?
13. Eine Fluggesellschaft weiß aus empirischen Untersuchungen, dass im Durchschnitt 10% der gebuchten Flugplätze storniert werden. Daher verkauft sie

für eine Maschine mit 100 Sitzplätzen von vornherein 5% mehr Flugtickets. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine überbucht ist?

14. Ein Unternehmen produziert mit einem konstanten Ausschussanteil von 3%. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, unter 50 hintereinander entnommenen Einheiten genau eine fehlerhafte Einheit vorzufinden?
15. Kater Karlo zahlt in einer Bank 60 Hundert-Euro-Scheine ein, von denen 10 seiner eigenen Produktion entstammen. Der Bankangestellte prüft 3 der eingezahlten Scheine auf Echtheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fliegt Kater Karlo auf? Lösen Sie exakt und mithilfe einer Näherung durch die Binomialverteilung.
16. Sei  $X$  eine Zufallsvariable, die die Werte  $i \in \{0, \dots, n\}$  mit den Wahrscheinlichkeiten  $p_i$  annimmt. Dann heißt

$$\hat{p}(z) = \sum_{i=0}^n p_i z^i$$

die **erzeugende Funktion** der Verteilung. Zeigen Sie:

- a)  $\hat{p}(1) = 1$
- b)  $E(X) = \hat{p}'(1)$
- c)  $\text{Var}(X) = \hat{p}''(1) + \hat{p}'(1)(1 - \hat{p}'(1))$

Berechnen Sie damit den Erwartungswert und die Varianz der Binomialverteilung.

17. **Geometrische Verteilung:** Ein Experiment, bei dem ein Ereignis  $A$  mit der Wahrscheinlichkeit  $P(A) = p$  eintritt, wird wiederholt. Die Zufallsvariable  $X = \text{Anzahl der Wiederholungen, bis zum ersten Mal } A \text{ eintritt}$  heißt geometrisch verteilt:

$$P(X = x) = p(1 - p)^{x-1}, \quad x \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

(Z.B. indem Sie die erzeugende Funktion berechnen.)

18. Ein fairer Würfel wird geworfen,  $X = \text{Anzahl der Würfe, bis zum ersten Mal die Augenzahl 1 geworfen wird}$ .
  - a) Geben Sie die möglichen Werte von  $X$  an.
  - b) Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von  $X$  an.
  - c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, höchstens 3 Würfe zu brauchen,
19. Bei einem Glücksspiel können Sie eines von drei Losen ziehen (jedes mit der gleichen Wahrscheinlichkeit).
  - a) Die zugehörigen Gewinne sind 0, 1, 99 Euro. Wie groß ist der (bei vielen Spielen) erwartete durchschnittliche Gewinn?
  - b) Angenommen, die zu den Losen gehörenden Gewinne sind 25, 30, 45 Euro. Wie groß ist nun der erwartete durchschnittliche Gewinn?
  - c) Berechnen Sie für beide Spiele die Varianz.
  - d) Ist es sinnvoll, bei Spiel a) oder b) mitzuspielen, wenn der Einsatz (Teilnahmegebühr) 35 Euro ist?



die der Grenzwert der Cesàro-Mittel

$$\text{LIM}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

existiert.

a) Zeige, dass  $\mathfrak{c}(\mathbb{N})$  ein Teilraum ist der die konvergenten Folgen enthält. Zeige, dass LIM für konvergente Folgen mit dem üblichen Grenzwert übereinstimmt.

b) Zeige  $\text{LIM}(Sx) = \text{LIM}(x)$  wobei  $(Sx)_n = x_{n+1}$  die Folge um eine Stelle nach links verschiebt.

c) Zeige, dass LIM linear ist und  $|\text{LIM}(x)| \leq \|x\|_\infty$  erfüllt, wobei  $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$ .

27. **Banachlimes 2.** Aus dem Satz von Hahn–Banach der in der Funktionalanalysis besprochen wird folgt, dass das lineare Funktional LIM aus dem letzten Beispiel auf alle beschränkten Folgen ausgedehnt werden kann, so dass weiterhin c) aus dem letzten Beispiel gültig bleibt (diese Erweiterung ist *nicht* eindeutig). Zeige, dass jede solche Erweiterung folgende Eigenschaften hat:

a) Es gilt weiterhin  $\text{LIM}(Sx) = \text{LIM}(x)$ .

b)  $\text{LIM}(x) \geq 0$  für alle nichtnegativen Folgen,  $x_n \geq 0$  für alle  $n$ .

c)  $\liminf_n x_n \leq \text{LIM}(x) \leq \limsup_n x_n$ .

Hinweise: zu a) Angenommen  $x \in \ell^\infty(\mathbb{N})$ , gilt dann  $Sx - x \in \mathfrak{c}(\mathbb{N})$ ?

zu b) Untersuche  $\text{LIM}(e - x)$  für  $x \geq 0$  mit  $\|x\|_\infty = 1$  und  $e = (1, 1, 1, \dots)$ .

zu c) Verwende b) und beachte, dass wegen a) endlich viele Folgenglieder weggeworfen werden können.

28. Gleichverteilung auf  $\mathbb{N}$ : Es sei LIM das in den letzten beiden Beispielen konstruierte positive Funktional auf  $\ell^\infty(\mathbb{N})$ . Definiere

$$P(A) = \text{LIM}(\mathbb{1}_A), \quad A \subseteq \mathbb{N},$$

wobei  $\mathbb{1}_A$  die charakteristische Funktion der Menge  $A$  (aufgefasst als Folge) ist. Nach Konstruktion ist  $P : \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$  additiv. Sei  $\mathcal{M} = \{A \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{1}_A \in \mathfrak{c}(\mathbb{N})\}$ .

a)  $\mathcal{M}$  ist abgeschlossen unter Komplementen.

b)  $\mathcal{M}$  ist abgeschlossen unter der disjunkten Vereinigung (zweier Mengen).

c)  $\mathcal{M}$  ist *nicht* abgeschlossen unter dem Durchschnitt (zweier Mengen).

Anleitung für c): Wähle eine Teilmenge gerader Zahlen  $A_1 \notin \mathcal{M}$  und die fehlenden geraden Zahlen  $A_2$ . Nun betrachte  $A = A_1 \cup A_2 = 2\mathbb{N}$  und  $B = A_1 \cup \tilde{A}_2$ , wobei  $\tilde{A}_2 = A_2 + 1$ .

29. Finde alle Algebren auf  $\Omega = \{1, 2, 3\}$ .

30. Es sei  $\mathcal{A}$  eine  $\sigma$ -Algebra auf  $\Omega$  und  $P : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$  erfülle

$$P(\Omega) = 1, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B), \quad A \cap B = \emptyset.$$

- a)  $P(\emptyset) = 0$ .  
 b)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ,  $\bar{A} = \Omega \setminus A$ .  
 c)  $P(A) \leq P(B)$ ,  $A \subseteq B$ .  
 d)  $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \leq P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$  falls  $A_n \cap A_m = \emptyset$  für  $n \neq m$ .

31.  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  sei wie in der letzten Aufgabe. Zeige:  $P$  ist genau dann  $\sigma$ -additiv wenn es stetig von unten ist.

32. **Ballot-Problem.** Bei einem Wahlgang mit insgesamt  $n$  Stimmen erhält der Sieger von zwei Kandidaten  $k$  Stimmen mehr als sein Gegner ( $k > 0$ ). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Sieger während der ganzen Auszählung in Führung liegt, wenn die Stimmen in zufälliger Reihenfolge ausgezählt werden?

Anleitung: Betrachte dazu die Irrfahrt  $(S_j)_{0 \leq j \leq n}$ . Wie viele Pfade gibt es mit  $S_n = k$  und wie viele davon erfüllen  $S_j > 0$  für  $1 \leq j \leq n$ ? Um die zweite Anzahl zu berechnen kann man die Pfade von  $(1, 1)$  nach  $(n, k)$  betrachten und jene die irgendwann 0 treffen abziehen. Unter einer geeigneten Reflexion ist ein jeder solcher Pfad äquivalent zu einem von  $(1, 1)$  nach  $(n, -k)$ .

33. **Ruin des Spielers.** Arno und Benno spielen folgendes Spiel: In jeder Runde wird eine faire Münze geworfen. Erscheint Kopf, so zahlt Benno einen Euro an Arno. Bei Zahl erhält Benno von Arno einen Euro. Arnos bzw. Bennos Vermögen vor der ersten Runde beläuft sich auf  $a$  bzw.  $b$  Euro ( $a, b \in \mathbb{N}$ ). Das Spiel geht zu Ende, wenn einer der beiden kein Geld mehr hat, spätestens aber nach  $n$  Runden.  $p_n$  bzw.  $q_n$  bezeichne die Wahrscheinlichkeit, dass Arno bzw. Benno nach diesem Spiel ruiniert ist. Betrachte die Irrfahrt  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ , wobei

$$X_k = \begin{cases} +1 & \text{falls Arno die } k\text{-te Runde gewinnt,} \\ -1 & \text{falls Benno die } k\text{-te Runde gewinnt.} \end{cases}$$

a) Beschreibe das Ereignis  $C = \{\text{keiner der beiden ist am Ende ruiniert}\}$  durch  $S_k$ .

b) Zeige:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n + q_n) = 1$ .

Hinweis: Benutze (a) arbeite mit der Stoppzeit  $T_b = \inf\{n > 0 : S_n = b\}$  und verwende was in der VO über  $T_b$  gezeigt wurde.

34. Gegeben sei eine überabzählbare Menge  $\Omega$ .

a)  $\mathcal{A} = \{A \subseteq \Omega \mid A \text{ oder } \Omega \setminus A \text{ ist abzählbar}\}$  ist eine  $\sigma$ -Algebra.

b) Mit

$$P(A) = \begin{cases} 0, & \text{falls } A \text{ abzählbar ist,} \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases}$$

ist  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  ein Wahrscheinlichkeitsraum.

35. Sei  $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$  eine (beliebige) Klasse von  $\sigma$ -Algebren auf einem Raum  $\Omega$ .

Zeige, dass  $\mathcal{B} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$  eine  $\sigma$ -Algebra ist.

36. Zeige, dass die Vereinigung  $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$  zweier  $\sigma$ -Algebren  $\mathcal{A}_1$  und  $\mathcal{A}_2$  genau dann eine  $\sigma$ -Algebra ist, wenn  $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A}_2$  oder  $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{A}_1$ .

37. **Gegenbeispiele zu Borel-Cantelli.**

a) Konstruiere ein Beispiel mit  $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \infty$ , aber wo  $P(\cap_n \cup_{k \geq n} A_k) = 0$ .

Hinweis: Wähle für  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  das Einheitsintervall  $[0, 1)$  mit Borel- $\sigma$ -Algebra und Gleichverteilung.

b) Konstruiere ein Beispiel mit  $\lim P(A_i) = 0$ ,  $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \infty$ , und  $P(\cap_n \cup_{k \geq n} A_k) = 1$ .

38. Seien  $f : (\Omega_1, \mathcal{A}_1) \rightarrow (\Omega_2, \mathcal{A}_2)$  und  $g : (\Omega_2, \mathcal{A}_2) \rightarrow (\Omega_3, \mathcal{A}_3)$  messbar. Zeige dass  $g \circ f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_3$   $\mathcal{A}_1$ - $\mathcal{A}_3$ -messbar ist.

39. Es sei  $f : X \rightarrow Y$  und  $\mathcal{A} \subseteq \mathfrak{P}(Y)$  eine  $\sigma$ -Algebra. Zeige dass auch  $f^{-1}(\mathcal{A}) := \{f^{-1}(A) | A \in \mathcal{A}\}$  eine  $\sigma$ -Algebra ist.

40. Es seien  $s, t : X \rightarrow \mathbb{R}$  einfache Funktionen. Zeige, dass

$$\int_A (s + t) d\mu = \int_A s d\mu + \int_A t d\mu$$


wobei das Integral wie in der Vorlesung definiert ist.

41. Zeige dass aus dem Satz über die dominierte Konvergenz (unter den gleich Voraussetzungen) auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$$

folgt.

42. Die **Cantormenge** ist wie folgt definiert: Beginne mit  $C_0 := [0, 1]$  und entferne das mittlere Drittel:  $C_1 := [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ . Entferne vom Rest wiederum das mittlere Drittel:  $C_2 := [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$ :



Auf diese Weise erhält man eine Folge von absteigenden Mengen  $C_n$  und der Grenzwert  $C := \bigcap_n C_n$  ist die Cantormenge. Zeige, dass das Lebesgue-Mass von  $C$  gleich Null ist (Warum ist  $C$  überhaupt messbar?)

Hinweis: Was ist das Mass von  $C_n$ ?

43. Die **Cantorfunktion** wird wie folgt konstruiert: Es seien  $C_n$  die Mengen aus der Konstruktion der Cantormenge  $C$ :  $C_n$  ist die Vereinigung von  $2^n$  abgeschlossenen Intervallen mit  $2^n - 1$  offenen Lücken dazwischen. Setze  $F_n$  gleich  $j/2^n$  auf der  $j$ 'ten Lücke von  $C_n$  und dehne es durch lineare Interpolation auf ganz  $[0, 1]$  aus. Beachte dass sich  $F_n$  dabei auf den Lücken aus den vorhergehenden Schritten nicht mehr verändert. Der Grenzwert  $F(x) := \lim F_n(x)$  ist die Cantorfunktion.

a) Zeige, dass  $F_n$  gleichmäßig konvergiert und  $F$  somit wohldefiniert und stetig ist.

b) Zeige, dass  $F' = 0$  auf einer Menge vom Lebesgue-Maß 1 ist.

c) Zeige, dass  $F$  keine Dichte besitzt.

Hinweis: Angenommen  $F$  hätte eine Dichte, dann müsste diese Dichte auf den Lücken – also auf dem Komplement der Cantormenge – verschwinden.

44. Zeige

$$I_n := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} d^n x = \pi^{n/2}.$$

Hinweis: Verwende Fubini um  $I_n = I_1^n$  zu zeigen und berechne  $I_2$  mit Polarkoordinaten.

45. Die **Gammafunktion** ist definiert als

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty x^{z-1} e^{-x} dx, \quad z > 0.$$

Zeige dass das Integral konvergiert.

Verwende partielle Integration um

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(1) = 1,$$

zu zeigen und schließe daraus  $\Gamma(n) = (n-1)!$  für  $n \in \mathbb{N}$ .

46. Zeige  $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$  und

$$\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}$$

Hinweis: Substitution  $x = t^2$  und Aufgabe 44.

47. Es sei  $\lambda$  das Lebesgue-Maß auf  $\mathbb{R}$  und  $F$  sei eine streng monoton steigende, stetige Funktion mit  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = a$  und  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = b$ . Zeige

$$d(F_*\lambda) = d(F^{-1}),$$

wobei  $F^{-1}$  die Inverse von  $F$  ist und  $d(F^{-1})$  das Maß auf  $(a, b)$  zur Verteilungsfunktion  $F^{-1}$  bezeichnet.

Besitzt  $F$  sogar eine Dichte  $f > 0$ , so ist

$$d(F_*\lambda) = \frac{1}{f(F^{-1})} \mathbb{1}_{(a,b)} d\lambda.$$

Hinweis: Betrachte  $F$  als Verteilungsfunktion eines Maßes  $dF$  und verwende die in der Vorlesung gezeigte Substitutionsregel

$$\int_{\mathbb{R}} g dF = \int_a^b (g \circ F^{-1})(x) dx.$$

48. Es sei  $d\mu(x) := \mathbb{1}_{[0,1]}(x) dx$  and  $f(x) := \mathbb{1}_{(-\infty, t]}(x)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Berechne  $f_*\mu$ .

49. Zeigen Sie, dass die Exponentialverteilung gedächtnisfrei ist:

$$P(X \leq t) = P(X \leq s + t | X \geq s).$$

Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist unabhängig vom Alter.



50. Die **Weibull-Verteilung** ist gegeben durch

$$F(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{T}\right)^b}.$$

Sie wird für die Modellierung von Lebensdauern verwendet. Dabei ist  $T$  die charakteristische Lebensdauer, bei der die Ausfallwahrscheinlichkeit gleich  $F(T) = 1 - \frac{1}{e} = 63.2\%$  ist. Zeigen Sie:

a) Ist  $X$  Weibull-verteilt, so gilt

$$E(X^n) = T^n \Gamma\left(1 + \frac{n}{b}\right).$$

Insbesondere

$$E(X) = T \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right), \quad \text{Var}(X) = T^2 \left(\Gamma\left(1 + \frac{2}{b}\right) - \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right)^2\right).$$

(Tipp: Substitution  $s = \left(\frac{t}{T}\right)^b$  und Vergleich mit der Definition der Gammafunktion  $\Gamma(x)$ .)

b) Ist  $X$  exponentialverteilt mit Parameter  $k$ , so ist  $Y = X^c$  Weibull-verteilt mit Parametern  $T = k^{-c}$  und  $b = \frac{1}{c}$ .

(Tipp:  $P(Y \leq y) = P(X^c \leq y)$ .)

51. Es sei

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{16}, & 0 \leq x < 2, \\ x - \frac{x^2}{8} - 1, & 2 \leq x < 4, \\ 1, & 4 \leq x, \end{cases}$$

die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariable  $X$ . Berechne  $E(X)$ .

52. Die Dichte von  $X$  sei gegeben durch

$$a + bx^2, \quad 0 \leq x \leq 1$$

und  $f(x) = 0$  sonst. Bestimme  $a, b \in \mathbb{R}$  unter der Annahme  $E(X) = \frac{3}{4}$ . Bestimme die Verteilungsfunktion von  $X$ .

53. Es sei  $X$  eine nichtnegative Zufallsvariable mit stetiger Dichte und endlichem Erwartungswert. Zeige

$$E(X) = \int_0^\infty (1 - F(y)) dy.$$

54. Es sei  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$  standardnormalverteilt. Zeige

$$E(X^k) = \begin{cases} 0, & k \text{ ungerade,} \\ (k-1)!!, & k \text{ gerade.} \end{cases}$$

Mit  $(k-1)!! := \frac{(2j)!}{2^j j!} = (k-1) \cdot (k-3) \cdots 1$  für  $k = 2j$  gerade (Doppelfakultät).



64. Es sei  $X \sim \mathcal{F}(m, n)$  fisherverteilt. Berechne  $\text{Var}(X)$ .
65. Ein System bestehe aus 3 unabhängigen Bauteilen deren Ausfallszeitpunkt (in Stunden)  $X_j \sim \text{Exp}(\alpha)$  exponentialverteilt mit Erwartungswert 50 Stunden sei. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach 100 Stunden noch  
a) mindestens ein Bauteil funktioniert.  
b) alle Bauteile funktionieren.
66. Es seien  $X_1, \dots, X_n$  identisch verteilte, unabhängige Zufallsvariablen. Was ist die Verteilung von  $X_\wedge = \min(X_1, \dots, X_n)$  bzw.  $X_\vee = \max(X_1, \dots, X_n)$ ? (Hinweis: Was hat das mit dem vorherigen Beispiel zu tun?)
67. Die Lebensdauer (in Jahren) eines Brandmelders  $X \sim \text{Exp}(3)$  sei exponentialverteilt. Die Anzahl der pro Jahr auftretenden Auslöseereignisse  $Y \sim \text{Poi}(1)$  sei poissonverteilt. Beide Zufallsvariablen werden als unabhängig angenommen.  
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Brandmelder während seiner ganzen Lebensdauer nie anspricht? (Hinweis: Verwende die gemeinsame Dichte.)
68. Es sei  $X \sim \mathcal{B}e(\frac{1}{2})$  bernoulliverteilt. Setze  $X_n = 1 - X$ . Konvergiert  $X_n \rightarrow X$   
a) in Wahrscheinlichkeit b) fast sicher c) schwach?
69. Es seien  $X_n$  und  $X$  Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . Zeige: falls  $X_n \rightarrow X$  in Wahrscheinlichkeit, dann gilt  $E(f(X_n)) \rightarrow E(f(X))$  für jede gleichmäßig stetige, beschränkte Funktion  $f$ .
70. Gegeben sei ein Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  und  $X, X_n, Y$  seien Zufallsvariablen. Die **Ky Fan Metrik** ist definiert als

$$d(X, Y) := \min\{\varepsilon \geq 0 \mid P(|X - Y| > \varepsilon) \leq \varepsilon\}.$$

Zeige:

- a) Das Minimum in der Definition wird in der Tat angenommen.  
b)  $d(X, Y) = 0 \Leftrightarrow X = Y$  fast sicher.  
c)  $d$  erfüllt die Dreiecksungleichung:  $d(X, Z) \leq d(X, Y) + d(Y, Z)$ .  
d)  $X_n \rightarrow X$  in Wahrscheinlichkeit  $\Leftrightarrow d(X_n, x) \rightarrow 0$ .  
(Hinweis zu d): Beginne mit  $P(|X - Z| > d(X, Y) + d(Y, Z)) \leq P(|X - Y| > d(X, Y)) + P(\dots) \leq \dots$ )
71. Es seien  $X, X_n, Y, Y_n$  Zufallsvariablen und  $\alpha_n, \alpha$  reelle Zahlen. Falls  $X_n \rightarrow X, Y_n \rightarrow Y$  fast sicher und  $\alpha_n \rightarrow \alpha$ , dann folgt auch  
a)  $X_n + Y_n \rightarrow X + Y$  fast sicher.  
b)  $\alpha_n X_n \rightarrow \alpha X$  fast sicher.  
a)  $X_n Y_n \rightarrow XY$  fast sicher.
72. Es sei  $X_j$  eine Folge quadratintegrierbarer Zufallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ . Zeigen Sie, dass das schwache Gesetz der großen Zahlen gilt falls  $\text{Cov}(X_j, X_k) \leq c_{|j-k|}$  mit einer Nullfolge  $c_n$  gilt. (Hinweis: Verwende die Bilinearität der Kovarianz und zerlege die Summe in einen Teil mit  $|j - k| \leq R$  und in einen Teil mit  $|j - k| > R$ .)

73. Eine Maschine produziert Bolzen mit einem mittleren Durchmesser von  $9.9\text{mm}$  und Standardabweichung  $0.1\text{mm}$  und eine weitere Maschine bohrt Löcher mit einem mittleren Durchmesser von  $10.0\text{mm}$  und Standardabweichung  $0.2\text{mm}$ . Beide Werte seien normalverteilt und unabhängig. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewählter Bolzen in ein zufällig gewähltes Loch passt.
74. Die Produktion eines Artikels besteht aus vier unabhängigen Teilschritten die eine Zeit  $T_j \sim \mathcal{U}(1, 2)$  (in Stunden) benötigen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Produktion des Artikels mehr als 7 Stunden dauert?  
 a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit näherungsweise mit dem Zentralen Grenzwertsatz.  
 b) Bestimmen Sie Wahrscheinlichkeit exakt (Sie dürfen dafür ein Computeralgebrasystem (z.B. *Mathematica*) Ihrer Wahl verwenden).
75. Ein fairer Würfel wird  $n$  Mal geworfen. Wie groß muss  $n$  ungefähr sein, damit die mittlere Augenzahl mit 95% Wahrscheinlichkeit zwischen 3.49 und 3.51 liegt?
76. Berechne näherungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass bei 10 000 Würfeln mit einer Münze zwischen 4 500 und 5 500 Mal Zahl fällt.
77. Es sei  $X \subseteq \mathbb{R}$ ,  $Y$  ein Maßraum und  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ . Weiters sei  $y \mapsto f(x, y)$  messbar für alle  $x$  und  $x \mapsto f(x, y)$  stetig für alle  $y$ . Zeige dass

$$F(x) := \int_A f(x, y) d\mu(y)$$

steig ist falls es eine integrierbare Majorante  $g(y)$  mit  $|f(x, y)| \leq g(y)$  gibt.

78. Es sei  $X \subseteq \mathbb{R}$ ,  $Y$  ein Maßraum und  $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ . Weiters sei  $y \mapsto f(x, y)$  integrierbar für alle  $x$  und  $x \mapsto f(x, y)$  differenzierbar für alle  $y$ . Zeige dass

$$F(x) := \int_Y f(x, y) d\mu(y)$$

differenzierbar ist falls es eine integrierbare Majorante  $g(y)$  mit  $|\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)| \leq g(y)$ . In diesem Fall ist  $y \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$  messbar und

$$F'(x) = \int_Y \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) d\mu(y).$$

79. Berechne das **Dirichlet-Integral**

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

(Hinweis: Verwende  $\text{Si}(R) = \int_0^R \int_0^\infty \sin(x)e^{-xt} dt dx$  und Fubini.)

80. Es sei  $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ . Berechne die charakteristische Funktion von  $X$ .

81. Berechne die charakteristische Funktion von  $X$ , wenn  $X$  dreiecksverteilt ist ( $f_X(x) = \max(0, 1 - |x - 1|$ ). Wie kann man das ohne Integrale zu berechnen aus dem letzten Beispiel erhalten?
82. (Panini-Problem). Angenommen ein Stickeralbum besteht aus  $n$  Bildern. Die Bilder werden einzeln gekauft (unabhängig und gleichverteilt) und es wird nicht getauscht. Berechne den Erwartungswert und die Varianz für die Anzahl der Bilder die gekauft werden müssen bis das Album voll ist. Wie viel kostet einem durchschnittlichen Sammler ein WM-Album mit  $n = 620$  Bildern bei einem Bilderpreis von 14 Cent. (Hinweis: Betrachte die Anzahl der Bilder die notwendig sind um von  $k$  auf  $k + 1$  Bilder im Album zu kommen.)
83. Die Stichprobenvariablen  $X_1, \dots, X_5$  seien unabhängig und identisch verteilt mit Mittelwert  $m$  und Varianz  $\sigma^2$ . Betrachte folgende Schätzer für den Mittelwert:

$$T_1 := \frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$$

$$T_2 := \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$$

$$T_3 := \frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5$$

$$T_4 := X_1 + X_2$$

$$T_5 := X_1$$

- a) Welche Schätzer sind erwartungstreu?  
 b) Welcher Schätzer hat die kleinste quadratische Abweichung?
84. Die Stichprobenvariablen  $X_j \sim \mathcal{B}e(p)$  seien bernoulliverteilt. Zeige: Der Schätzer  $\bar{X} := \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j$  für  $p$  ist erwartungstreu und konsistent im quadratischen Mittel.
85. Die Stichprobenvariablen  $X_j \sim \mathcal{B}e(p)$  seien bernoulliverteilt. Um die Varianz  $p(1 - p)$  zu schätzen betrachten wir den Schätzer  $T := \bar{X}(1 - \bar{X})$ . Ist  $T$  erwartungstreu? Wenn nein, kann man das beheben?
86. Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängige Zufallsvariablen, uniform verteilt auf dem Intervall  $[0, a]$ . Der Parameter  $a$  sei unbekannt und soll geschätzt werden. Wir betrachten drei verschiedene Schätzer:

$$Y_n := \frac{2}{n} \sum_{j=1}^n X_j$$

$$M_n := \max_{1 \leq j \leq n} X_j$$

$$M'_n := \frac{n+1}{n} \max_{1 \leq j \leq n} X_j$$

Bestimme den systematischen Schätzfehler von  $Y_n$ ,  $M_n$  und  $M'_n$ . Welche Schätzer sind erwartungstreu? (Hinweis: Finde zuerst die Dichte  $f_{M_n}(x)$ .)

87. Zeige dass die Schätzer aus dem letzten Beispiel konsistent im quadratischen Mittel sind. Welcher der beiden erwartungstreuen Schätzer konvergiert schneller?
88. Die **Pareto-Verteilung**  $X \sim \mathcal{P}ar(k, x_0)$  ist gegeben durch die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_0}{x}\right)^k, & x > x_0, \\ 0, & x \leq x_0. \end{cases}$$

Finde einen Schätzer für den Parameter  $k$  (bei bekannten  $x_0$ ).

89. Betrachte den Schätzer

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2}$$

für die Standardabweichung  $\sigma$  einer normalverteilten Zufallsstichprobe  $X_j \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ . Finde eine Konstante  $c_n$  so dass  $c_n S$  erwartungstreu ist. (Hinweis: In der Vorlesung wurde die Verteilung von  $S^2$  berechnet.)

90. Finde den Momenten- und den ML-Schätzer für den Parameter  $k$  (bei bekannten  $x_0$ ) der Pareto-Verteilung.
91. Finde den Momenten- und den ML-Schätzer für den Parameter  $\alpha$  der Exponentialverteilung.
92. Es seien  $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{U}(a, b)$  unabhängige Zufallsvariablen. Bestimme den ML-Schätzer für die Parameter  $a$  und  $b$ .
93. Es seien  $X_j \sim \mathcal{N}(m, \sigma_j^2)$ ,  $1 \leq j \leq n$  unabhängige Zufallsvariablen. Zeige dass der Schätzer

$$T = \sum_{j=1}^n w_j X_j, \quad 0 \leq w_j \leq 1, \quad \sum_{j=1}^n w_j = 1$$

für den Mittelwert  $m$  erwartungstreu ist. Berechne die Varianz. Für welche Wahl der Gewichte  $w_j$  wird die Varianz minimal?

94. Es sei  $X_1, \dots, X_n$  eine unabhängige und identisch verteilte Zufallsstichprobe mit gegebener Dichte  $f_\theta(x)$  die von einem Parameter  $\theta \in \mathbb{R}$  abhängt. Die Dichte sei partiell nach  $\theta$  differenzierbar und die **Fisher-Information**

$$\mathcal{I}(\theta) := \int_{R(\theta)} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log(f_\theta(x)) \right)^2 f_\theta(x) dx > 0$$

existiere, wobei  $R(\theta) := \{x \in \mathbb{R} | f_\theta(x) > 0\}$ .

Weiters sei  $T$  ein Schätzer mit Erwartungswert  $E(T) = m(\theta)$  für den Parameter  $\theta \in \mathbb{R}$ . Zeige die **Cramér-Rao Schranke**

$$\text{Var}(T) \geq \frac{m'(\theta)^2}{\mathcal{I}(\theta)}$$

unter der Annahme, dass es eine integrierbare Majorante  $g(x)$  mit  $(|T(x)|+1)|\frac{\partial}{\partial\theta}f_{\theta}(x)|\leq g(x)$  gibt. (Hinweis: Differenziere die Erwartungstreue  $E(T-m(\theta))=0$  nach  $\theta$ . Betrachte das Ergebnis als Skalarprodukt und verwende Cauchy-Schwarz.)

95. Bestimme die Verteilung der Kleinsten-Quadrate-Schätzer für die Parameter  $\alpha$  und  $\beta$  der Regressionsgerade.
96. Bei 10 PKWs wurden Gewicht und Benzinverbrauch pro 100 km gemessen. Es ergaben sich folgende Daten (Tonnen, Liter): (1.5, 7.7), (1.8, 9.1), (1.4, 8.3), (2.2, 10.0), (1.3, 7.7), (1.7, 8.3), (1.5, 9.1), (1.7, 8.3), (1.4, 8.3), (1.2, 7.1). Bestimme die Regressionsgerade.
97. Aus einer normalverteilten Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe vom Umfang  $n = 10$  mit Mittelwert  $\bar{x} = 98.9$  gezogen. Die Standardabweichung sei  $\sigma = 2$ . Bestimmen Sie das zweiseitige Konfidenzintervall für den Erwartungswert auf dem Niveau 0.99.
98. Aus einer normalverteilten Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe vom Umfang  $n = 10$  mit Mittelwert  $\bar{x} = 98.9$  und Standardabweichung  $s = 2.183$  gezogen.  
Bestimmen Sie das zweiseitige Konfidenzintervall für den Erwartungswert auf dem Niveau 0.99.
99. Aus einer normalverteilten Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe vom Umfang  $n = 10$  mit Mittelwert  $\bar{x} = 98.9$  gezogen. Die Standardabweichung sei  $\sigma = 2$ .  
Eine Verbraucherorganisation möchte anhand der Stichprobe feststellen, ob das Sollgewicht von 100 g unterschritten wird. Mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält  $(-\infty, 99.9]$  den Erwartungswert?
100. Die Werbeeinnahmen  $X$  (in Euro) einer großen Tageszeitung, die durch Werbeinserate an Werktagen (Montag bis Freitag) erzielt werden, können als normalverteilt angenommen werden. An  $n = 35$  Werktagen wurden durchschnittlich  $\bar{x} = 92\,500$  Euro pro Werktag eingenommen, mit einer Standardabweichung von  $s = 17\,200$  Euro. Geben Sie mithilfe eines Konfidenzintervalles eine Schätzung zur Vertrauenswahrscheinlichkeit  $1-\alpha = 95\%$  dafür an, welche durchschnittlichen Werbeeinnahmen  $m$  diese Tageszeitung an Werktagen erwarten kann.
101. Wie groß müsste der Stichprobenumfang in der letzten Aufgabe sein, damit die durchschnittlichen Werbeeinnahmen pro Werktag mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von  $1-\alpha = 95\%$  auf  $\pm 5\,000$  Euro genau geschätzt werden können?
102. Eine Firma stellt Präzisionswiderstände her. Der Erwartungswert darf um maximal 0.1% vom Sollwert 100 Ohm abweichen. Die Standardabweichung darf 0.2 nicht überschreiten. Zur Qualitätssicherung wird aus dem laufenden Produktionsprozess eine Stichprobe vom Umfang  $n = 50$  mit Mittelwert  $\bar{x} = 100.014$  und Standardabweichung  $s = 0.11$  entnommen. Sind die Vorgaben auf einem Konfidenzniveau von 0.95 erfüllt (unter der Annahme einer normalverteilten Grundgesamtheit)?

103. Ein Bauer füttert seine Kühe mit zwei verschiedenen Futtermitteln *Supergras*<sup>®</sup> und *Turboheu*<sup>®</sup>. Er möchte den Einfluss auf die Milchleistung untersuchen und nimmt dazu zwei Stichproben (in Liter):

*Supergras*<sup>®</sup>: 23.8, 28.6, 26.1, 32.0, 31.0, 27.1, 20.2, 26.8, 29.6, 23.6

*Turboheu*<sup>®</sup>: 27.1, 32.2, 29.7, 32.0, 26.6, 33.8, 31.1, 28.9, 34.1, 29.2

Bestimmen Sie das Konfidenzintervall für die Differenz der Erwartungswerte  $m_S - m_T$  auf dem Niveau 0.95 unter der Annahme, dass beide Grundgesamtheiten normalverteilt mit derselben Varianz sind.

104. Aus einer normalverteilten Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe vom Umfang  $n = 15$  mit Varianz  $s^2 = 20$  gezogen. Bestimmen Sie das zweiseitige Konfidenzintervall für die Varianz auf dem Niveau 0.90.
105. Ein Hersteller untersucht die Ausfallwahrscheinlichkeit von Bauteilen unter erhöhter Belastung. Ein Test mit 50 Bauteilen ergab 6 Ausfälle. Bestimmen Sie ein approximatives Konfidenzintervall auf dem Niveau 0.95 für die Ausfallwahrscheinlichkeit.
106. Aus einer normalverteilten Grundgesamtheit wurde eine Stichprobe vom Umfang  $n = 10$  mit Mittelwert  $\bar{x} = 98.9$  und Standardabweichung  $s = 2.183$  gezogen. Testen Sie die Nullhypothese  $H_0 : m \geq 100$  auf einem Niveau von  $\alpha = 0.05$ .
107. Lösen Sie die Fragestellung aus Übungsaufgabe 102 mithilfe von Hypothesentests. Machen Sie dazu für den Erwartungswert zwei einseitige Tests.
108. Die Dosiermenge  $X$  einer chemischen Substanz, die bei einem Neutralisationsverfahren eingeleitet wird, ist normalverteilt. Aus längerer Beobachtung weiß man, dass sich die Standardabweichung  $\sigma$  der Dosiermenge auch bei Änderung des Erwartungswertes praktisch nicht ändert und ihr Wert mit  $\sigma = 1.0$  g angegeben werden kann. Der Erwartungswert  $m$  wurde vor einiger Zeit auf den Sollwert  $m_0 = 40.0$  g eingestellt. Es soll nun überprüft werden, ob dieser Sollwert noch eingehalten wird. Dazu wird eine Stichprobe entnommen, die folgende Werte (in g) enthält:

39.2 40.0 41.4 42.3 40.6 40.3 39.6 41.2 41.7 40.8

- a) Prüfen Sie mithilfe eines Tests, ob bei einem Signifikanzniveau  $\alpha = 5\%$  weiterhin angenommen werden kann, dass die mittlere Dosiermenge  $m$  unverändert gleich  $m_0$  ist. ( $H_0 : m = 40.0$  gegen  $H_1 : m \neq 40.0$ ).
- b) Wie würde die Testentscheidung lauten, wenn  $\alpha = 1\%$  gewählt wird?
109. Berechnen Sie den  $p$ -Wert zur Stichprobe aus dem letzten Beispiel und interpretieren Sie!
110. Berechne die charakteristische Funktion der Multinomialverteilung und daraus Erwartungswert und Kovarianzmatrix. (Hinweis: Multinomialsatz.)
111. Ein Würfel wurde 60 Mal geworfen und es ergaben sich dabei folgende Häufigkeiten: 11, 4, 13, 15, 2, 15. Man untersuche die Frage ob der Würfel fair ist mit einem  $\chi^2$ -Anpassungstest zum Niveau 0.05



112. Eine Firma hat die Lebenserwartung eines Bauteils (in Monaten) bestimmt und dabei folgende Daten erhoben ( $n = 60$ , Mittelwert  $m = 9.93$ ):

0.3, 0.3, 0.7, 0.8, 0.8, 1.2, 1.2, 1.6, 2., 2.1, 2.8, 2.9, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6, 4.7,  
4.7, 4.8, 4.9, 4.9, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 6., 6.9, 6.9, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7,  
7.7, 7.8, 8.4, 9.4, 10.2, 10.3, 10.6, 11.5, 12.6, 12.8, 13.3, 14.1, 14.7, 15.3,  
16.2, 16.3, 16.5, 17.4, 18.3, 19.2, 21.2, 25.4, 25.7, 35.7, 40.1, 42.5

Untersuche mit einem  $\chi^2$ -Anpassungstest zum Niveau 0.05 ob die Annahme einer  $\mathcal{E}xp(\frac{1}{m})$ -Verteilung sinnvoll ist. (Hinweis: Partitioniere dazu den Wertebereich der Exponentialverteilung in  $k = 10$  gleich wahrscheinliche Intervalle. Da der Mittelwert aus der Stichprobe geschätzt wird gilt zusätzlich zu  $\sum_{j=1}^k N_j = n$  auch  $\bar{N} = \frac{n}{k}$  und die Anzahl der Freiheitsgrade bei der  $\chi^2$ -Verteilung muss um 2 verringert werden.)