

# Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Mathias Beiglböck

Nathanaël Berestycki

3. Juli 2023

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>3</b>
1.1	Begriffe . . . . .	3
1.2	Gleichwahrscheinliche Ausgänge . . . . .	5
1.3	Die Stirlingformel . . . . .	7
1.4	Zusammenfassung des Kapitels . . . . .	8
<b>2</b>	<b>Axiomatischer Zugang</b>	<b>9</b>
2.1	Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie . . . . .	9
2.2	Elementare Eigenschaften . . . . .	10
2.3	Bedingte Wahrscheinlichkeit . . . . .	11
2.4	Der Satz von Bayes . . . . .	13
2.5	Unabhängigkeit . . . . .	14
2.6	Unabhängigkeit von mehreren Ereignissen . . . . .	15
2.7	Zusammenfassung des Kapitels . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Zufallsvariablen</b>	<b>16</b>
3.1	Definition; Verteilungen . . . . .	16
3.2	Diskrete Zufallsvariablen; wichtige Beispiele . . . . .	17
3.3	Verteilungen als Wahrscheinlichkeitsmaße . . . . .	18
3.4	Die Poissonapproximation der Binomialverteilung . . . . .	20
3.5	Erwartungswert . . . . .	21
3.6	Funktionen einer Zufallsvariable . . . . .	23
3.7	Varianz einer Zufallsvariable . . . . .	24
3.8	Unabhängige Zufallsvariablen . . . . .	25
3.9	Varianz einer Summe . . . . .	26
3.10	Kovarianz und Korrelation . . . . .	28
3.11	Zusammenfassung des Kapitels . . . . .	30

<b>4</b>	<b>Ungleichungen und Abweichungen</b>	<b>31</b>
4.1	Jensen'sche Ungleichung . . . . .	31
4.2	Entropie einer Zufallsvariable . . . . .	33
4.3	Markov'sche Ungleichung . . . . .	36
4.4	Chebyshev'sche Ungleichung . . . . .	36
4.5	Schwaches Gesetz der großen Zahlen . . . . .	37
<b>5</b>	<b>Bedingte Erwartung und Martingale</b>	<b>39</b>
5.1	Bedingte Verteilung . . . . .	39
5.2	Bedingte Erwartung . . . . .	41
5.3	Turmeigenschaft . . . . .	43
5.4	Bedingte Erwartung bezüglich $\sigma$ -Algebren . . . . .	45
5.5	Martingale . . . . .	47
5.6	Stoppzeiten . . . . .	50
5.7	Konvergenz von Martingalen . . . . .	53
5.8	Uniform integrierbare Martingale . . . . .	54
5.9	Kolmogorovs 0-1-Gesetz . . . . .	56
5.10	Starkes Gesetz der großen Zahlen unter Momentenbedingungen . . . . .	57
5.11	Klassische Variante des starken Gesetzes der großen Zahlen . . . . .	58
5.12	Skizze eines weiteren Beweises des starken Gesetzes der großen Zahlen . . . . .	59
5.13	Maximalungleichungen . . . . .	60
5.14	Zusammenfassung . . . . .	61
<b>6</b>	<b>Stetige Verteilungen und zentraler Grenzwertungssatz</b>	<b>62</b>
6.1	Wiederholung - Dimension 1 . . . . .	62
6.2	Wiederholung - mehrdimensionale Zufallsvektoren . . . . .	62
6.3	Exponentialverteilung . . . . .	65
6.4	Die Normalverteilung . . . . .	66
6.5	Charakteristische Funktion . . . . .	67
6.6	Schwache Konvergenz . . . . .	70
6.7	Der zentrale Grenzwertungssatz . . . . .	71
6.8	Beispiele und Anwendungen . . . . .	73
<b>7</b>	<b>Einführung in die Statistik</b>	<b>75</b>
7.1	Was ist Statistik? . . . . .	75
7.2	Empirische Verteilungsfunktion . . . . .	76
7.3	Maximum-Likelihood Schätzung . . . . .	77
7.4	Abstrakter Blickwinkel auf Parameterschätzung . . . . .	79
7.5	Konfidenzintervalle . . . . .	82
7.6	Lineare Regression . . . . .	85
7.7	Hypothesentest und Neyman–Pearson lemma . . . . .	89

# 1 Einführung

Diese Vorlesungsunterlagen basieren hauptsächlich auf den wunderbaren Unterlagen (auf Englisch) von Richard Weber. Sie stehen auf

<http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/prob/index>

zur Verfügung.

**Prüfung.** Am Ende des Kurses findet eine schriftliche Prüfung statt. Weiter Details folgen.

Diese Vorlesung baut inhaltlich auf der Vorlesung “Integration und Stochastik” aus. Insbesondere in den ersten Kapiteln werden jedoch viele Begriffe wiederholt und wir werden zunächst nur sparsam auf die Maßtheorie zurückgreifen.

Wir bitten um Verständnis, dass die Unterlagen erst im Laufe der Vorlesung entstehen. Insbesondere, der Teil des Skriptums, der in der Vorlesung noch nicht besprochen wurde wird sich jeweils noch stark ändern.

## 1.1 Begriffe

In diesem Kurs werden wir in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie einführen.

Im Vergleich zum Rest der Mathematik, handelt es sich um ein relativ junges Gebiet (Die ersten echten Bemühungen stammen von Pascal und Fermat im 17. Jahrhundert. Der Formalismus, den wir heute verwenden, wurde hingegen von Kolmogorov im 20. Jahrhundert entwickelt.)

Für diese Theorie brauchen wir drei Zutaten. Der Ausgangspunkt ist Folgender. Wir gehen davon aus, dass wir alle möglichen Ausgänge (oder Fälle, oder Ergebnisse) eines Zufallsexperiments beschreiben können. Sie bilden eine Menge  $\Omega$ , die wir **Grundraum** nennen.

**Beispiel 1.1.** Wurf eines Würfels. Es gibt 6 Möglichkeiten, deswegen nehmen wir  $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ .

Dieses Zufallsexperiment war einfach zu beschreiben. Manchmal ist der Grundraum  $\Omega$  komplexer.

**Beispiel 1.2.** Unendlich viele Würfe einer Münze: wir können

$$\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}} = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots) : \omega_i \in \{0, 1\}\}$$

nehmen. Das heißt,  $\Omega$  ist die Menge aller binären Folgen.

Oder, noch komplexer:

**Beispiel 1.3.** Bewegung eines mikroskopischen Teilchens in einer Flüssigkeit. Wir nehmen  $\Omega = C(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^3)$ .

Als nächstes führen wir die Menge  $\mathcal{A}$  der **beobachtbaren Ereignisse** ein. Dies ist eine Menge von Teilmengen von  $\Omega$ , d.h.,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ . Für ein  $A \in \mathcal{A}$  sagen wir, dass  $A$  eintritt, falls das realisierte Ergebnis  $\omega$  ein Element von  $A$  ist. Wir nennen ein Element  $A \in \mathcal{A}$  ein **Ereignis**.

Ein Ereignis kann auch oft mit Worten beschrieben werden.

**Beispiel 1.4.** “Das Resultat ist eine gerade Zahl”  $\leftrightarrow A = \{2, 4, 6\} \subset \Omega$ .

**Beispiel 1.5.** “Der dritte Wurf ist Kopf”  $\leftrightarrow A = \{\omega \in \Omega : \omega_3 = 1\} \subset \Omega$ .

“Mindestens die Hälfte der ersten 10 Würfe ist Kopf”:  $\leftrightarrow B = \{\omega \in \Omega : \sum_{i=1}^{10} \omega_i \geq 5\} \subset \Omega$ .

**Beispiel 1.6.** “Das Teilchen bleibt bis zur Zeit  $T$  in einer Kugel vom Radius  $R$  um 0”  $\leftrightarrow A = \{\omega \in \Omega : \sup_{0 \leq t \leq T} \|\omega(t)\| \leq R\} \subset \Omega$ .

Mit Hilfe der Operationen der Mengenlehre kann man aus gegebenen Ereignissen neue bilden. Seien  $A, B$  Ereignisse. Dann

- $A^c = \Omega \setminus A$  ist das Komplement von  $A$ . Das heißt,  $A^c$  tritt ein dann und nur dann, wenn  $A$  nicht eintritt.
- $A \cup B$  ist die Vereinigung von  $A$  und  $B$ . Das heißt,  $A \cup B$  tritt ein dann und nur dann, wenn entweder  $A$  oder  $B$  oder beide eintreten.
- $A \cap B$  ist der Durchschnitt von  $A$  und  $B$ . Das heißt,  $A \cap B$  tritt ein dann, und nur dann, wenn sowohl  $A$  als auch  $B$  eintreten.
- $A \setminus B = A \cap B^c$  ist  $A$  ohne  $B$ . Das heißt,  $A \setminus B$  tritt ein dann und nur dann, wenn  $A$  eintritt, jedoch  $B$  nicht.

Außerdem sind einige Begriffe der Mengenlehre hilfreich und haben eine bestimmte Bedeutung oder Bezeichnung:

- $A \subset B$ . Das Eintreten von  $A$  impliziert das Eintreten von  $B$ .
- $A \cap B = \emptyset$ . Dann sagen wir, dass  $A$  und  $B$  disjunkt sind. Das heißt, dass es unmöglich ist, dass  $A$  und  $B$  gleichzeitig eintreten.

**Beispiel 1.7.** Seien  $A, B$  und  $C$  drei Ereignisse. Was ist das Ereignis  $E$ , dass nur eines von diesen drei eintritt? Wir haben

$$E = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (B \cap A^c \cap C^c) \cup (C \cap A^c \cap B^c).$$

Falls  $\Omega$  endlich (wie im Beispiel 1.1) oder abzählbar unendlich ist (diskreter Fall), wählen wir meistens als  $\mathcal{A}$  die Potenzmenge  $\mathcal{P}(\Omega)$  von  $\Omega$ . Im allgemeinen (wie im Beispiel 1.2 und 1.3) wird  $\mathcal{A}$  aber nicht aus allen Teilmengen von  $\Omega$ , bestehen.

Die letzte und wichtigste Zutat der Wahrscheinlichkeitstheorie ist schließlich das **Wahrscheinlichkeitsmaß**  $\mathbb{P}$ , eine Abbildung von  $\mathcal{A}$  nach  $[0, 1]$ . Gegeben  $A \in \mathcal{A}$  ist  $\mathbb{P}(A)$  die

Wahrscheinlichkeit, dass  $A$  eintritt wird. Je größer diese Wahrscheinlichkeit ist, desto eher rechnen wir damit, dass  $A$  eintritt.

Die Festlegung des Wahrscheinlichkeitsmaßes ist wichtig für die Anwendungen. Im allgemeinen gibt es keine Regel dafür, wie man es spezifiziert: es kommt darauf an, wie plausibel man die verschiedenen Möglichkeiten schätzt. Während des Wahrscheinlichkeitsteils wird das Wahrscheinlichkeitsmaß immer (zumindest implizit) vorgegeben sein. Während des Statistikteils werden wir jedoch Methoden finden, um es richtig auszuwählen.

Das Tripel  $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$  heißt ein **Wahrscheinlichkeitsraum**.

## 1.2 Gleichwahrscheinliche Ausgänge

Bevor wir den axiomatischen Ansatz entwickeln, betrachten wir einen “einfachen” Fall. Das ist die Situation, wenn der Grundraum  $\Omega$  endlich ist, und alle Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind. Das heißt,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$  und gegeben  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Wir bemerken, dass  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$  und  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

Man kann in dieser Weise viele standardmäßige Wahrscheinlichkeitsberechnungen durchführen. Man muß “nur” der Zahl aller *günstigen Ergebnisse* (Laplace) zählen. In der Praxis kann das natürlich sehr herausfordernd sein!

**Beispiel 1.8.** Es wird mit 2 Würfeln gewürfelt. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine 6 auftritt? Und was ist das wahrscheinlichste Ergebnis für die Augensumme?

Zuerst müssen wir einen Grundraum wählen. Hier ist es praktisch  $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$  zu wählen. Die Ausgänge sind dann Paare von Augenzahlen, wobei die Augenzahl des ersten Würfels an der ersten Stelle steht und die Augenzahl des zweiten Würfels an der zweite Stelle. Offensichtlich ist  $|\Omega| = 36$ . Wir nehmen auch  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$  und gehen davon aus, dass alle Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind. Da

$$A = \{(1, 6), \dots, (6, 6), (6, 1), \dots, (6, 5)\}$$

haben wir  $|A| = 11$  und deshalb  $\mathbb{P}(A) = 11/36$ .

Sei  $S_k$  das Ereignis, dass die Augensumme gleich  $k$  ist (wobei  $2 \leq k \leq 12$ ). Ein erfolgreicher Ausgang ist von der Form  $\omega = (i, k - i)$  mit  $1 \leq i \leq 6$  und  $1 \leq k - i \leq 6$ . Deswegen gilt

$$(k - 6) \vee 1 \leq i \leq 6 \wedge (k - 1).$$

(Hier schreiben wir  $a \wedge b = \min(a, b)$  und  $a \vee b = \max(a, b)$ .) Das heißt:

- für  $k \leq 7$ ,  $1 \leq i \leq k - 1$ . Deshalb gilt  $|S_k| = k - 1$ ,
- für  $7 \leq k \leq 12$ ,  $k - 6 \leq i \leq 6$ , dann  $|S_k| = 13 - k$ .

Deshalb ist  $\mathbb{P}(S_k)$  maximal für  $k = 7$ , in diesem Fall ist  $\mathbb{P}(S_k) = 6/36 = 1/6$ .  $\square$

**Beispiel 1.9.** Nehmen wir an, dass wir  $r$  Ziffern zwischen 0 und 9 schreiben. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass (i) keine Ziffer (strikt) größer als  $k$  ist, und (ii), genau  $k$  die größte geschriebene Ziffer ist ( $0 \leq k \leq 9$ )?

Hier ist es praktisch,  $\Omega = \{0, \dots, 9\}^r = \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_r) : 0 \leq \omega_i \leq 9\}$  zu wählen. Dann ist  $|\Omega| = 10^r$ . Sei  $A_k$  das Ereignis, dass keine Ziffer größer als  $k$  ist. Dann gilt  $A_k = \{\omega \in \Omega : \omega_i \leq k, 1 \leq i \leq r\}$  und daher  $|A_k| = (k+1)^r$ . Deshalb gilt für (i)  $\mathbb{P}(A_k) = (k+1)^r/10^r$ .

(ii) Sei  $B_k$  das Ereignis, dass genau  $k$  die größte gezeichnete Ziffer ist. Dann gilt  $B_k = A_k \setminus A_{k-1}$ . Weil  $A_{k-1} \subset A_k$ , schließen wir daraus,  $|B_k| = |A_k| - |A_{k-1}|$ . Schließlich ist

$$\mathbb{P}(B_k) = \frac{(k+1)^r - k^r}{10^r}.$$

Bei Beispielen wie oben ist es stets wichtig darauf zu achten, ob wir *mit* oder *ohne* Wiederholung zeichnen.

**Beispiel 1.10.** Ich habe  $n$  Schlüssel in meiner Tasche. Ich wähle einen zufällig aus und versuche die Tür zu öffnen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau beim Versuch  $r \geq 1$  (und nicht früher) erfolgreich bin (i) mit Wiederholung, (ii) ohne Wiederholung?

(i) Mit Wiederholung haben wir

$$\mathbb{P}(A_r) = \frac{(n-1)^{r-1} \times 1}{n^r},$$

wobei  $A_r$  das Ereignis ist, dass ich beim Versuch  $r$  (und nicht früher) erfolgreich bin.

(ii) Ohne Wiederholung haben wir stattdessen:

$$\mathbb{P}(A_r) = \frac{(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) \times 1}{n(n-1)\dots(n-r+1)} = \frac{1}{n}.$$

Das ist die logische Antwort!  $\square$

**Beispiel 1.11** (Geburtstagsproblem). Wieviele Leute muß man in einen Raum sperren, damit die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens zwei am selben Tag Geburtstag haben, größer als  $1/2$  ist?

Um die Überlegung zu vereinfachen, ignorieren wir Schaltjahre, sodass es 365 mögliche Geburtstage gibt. Dann könnte man denken, dass halb so viele, also 183, gebraucht werden um die Wahrscheinlichkeit über  $1/2$  zu bekommen. Tatsächlich reichen jedoch viel weniger, nämlich 23. Die Rechnung dazu geht wie folgt: Sei  $f(r)$  die Wahrscheinlichkeit, dass es unter  $r$  Menschen ein Paar mit gleichem Geburtstag gibt. Denn gilt

$$\mathbb{P}(\text{kein Paar hat gleichen Geburtstag}) = 1 - f(r) = \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdot \dots \cdot \frac{365 - (r-1)}{365}.$$

Wenn man das auswertet, erhält man  $f(22) = 0.476\dots$  und  $f(23) = 0.507\dots$

Um die richtige Intuition für das Beispiel zu bekommen, ist es vielleicht sinnvoll im Auge zu haben, dass es bei 23 Personen gerade  $\binom{23}{2} = \frac{23 \cdot 22}{2} = 253$  Paare gibt und jedes dieser Paare mit Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{365}$  am selben Tag Geburtstag hat.  $\square$

**Beispiel 1.12** (Lotto). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit beim Lotto “6 aus 45” alle Zahlen richtig zu erraten? Dazu müssen wir überlegen auf wieviele Art 6 Kugel aus den 45 vorhandenen Kugeln gezogen werden können.

Für die erste Kugel gibt es 45 Möglichkeiten, für die zweite 44, ..., für die sechste 40 Möglichkeiten. Allerdings gibt es nicht tatsächlich  $45 \cdot 44 \cdot \dots \cdot 40$  Möglichkeiten, da Kugelfolgen, die sich nur durch die Reihenfolge der Kugeln unterscheiden, als gleich angesehen werden. Es gibt  $6 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 1$  Möglichkeiten diese Kugeln anzuordnen. Daher erhalten wir insgesamt

$$\frac{45 \cdot 44 \cdot \dots \cdot 40}{6 \cdot 5 \cdot \dots \cdot 1} = \binom{45}{6}$$

verschiedene Möglichkeiten 6 Kugel zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeit beim Lotto einen Sechser zu machen ist entsprechend  $1/\binom{45}{6}$ .  $\square$

Analog gibt es beim Lotto “ $k$  aus  $n$ ” natürlich  $\binom{n}{k}$  verschiedene Möglichkeiten.

Man kann natürlich eine Reihe weiterer, verwandter Abzählaufgaben angeben und auch versuchen diese einigermaßen zu kategorisieren. In der Praxis erscheint es jedoch fast einfacher sich die entsprechenden Formeln anhand des gegebenen Beispiels selbst zu überlegen. Wir betrachten noch eine Variante des letzten Beispiels:

**Beispiel 1.13.** Beim Bridge wird ein Stapel von 52 Karten auf 4 Spielerinnen aufgeteilt, jede erhält 13 Karten. Wieviel Möglichkeiten gibt es die Karten zu verteilen? Analog zur Lottogeschichte erhalten wir

$$\frac{52!}{13! \cdot 13! \cdot 13! \cdot 13!}$$

Dieses Beispiel motiviert den Multinomialkoeffizienten

$$\binom{n}{n_1, \dots, n_k} := \frac{n!}{n_1! \dots n_k!},$$

wobei  $n_1, \dots, n_k$  natürliche Zahlen mit  $n_1 + \dots + n_k = n$  sind.

### 1.3 Die Stirlingformel

In obigen Abzählaufgaben ist wiederholt  $n!$  aufgetreten. Die sogenannte Stirlingformel gibt den Wert näherungsweise an.

**Satz 1.14.** (Stirlingformel) Für  $n \rightarrow \infty$  gilt

$$\log \left( \frac{n! e^n}{n^{n+1/2}} \right) = \log(\sqrt{2\pi}) + O(1/n).$$

Eigentlich interessieren wir uns mehr für

**Korollar 1.15.** Für  $n \rightarrow \infty$  gilt  $n! \approx \sqrt{2\pi} n^{n+1/2} e^{-n}$ .

In diesem Zusammenhang meint  $\approx$ , dass der Quotient der linken und der rechten Seite gegen 1 konvergiert. Tatsächlich ist obige Approximation schon für kleine Werte erstaunlich gut: bei  $n = 1$  unterscheiden sich linke und rechte Seite um weniger als 10%, bei  $n = 10$  um weniger als 1%.

Um ein ungefähres Gefühl für die Größenordnungen bei der Stirlingformel zu bekommen, bemerken wir zunächst das aus der Taylorentwicklung  $e^n = 1 + n + \dots + n^n/n! + \dots$  jedenfalls folgt, dass

$$1 \leq \frac{n^n}{n!} \leq e^n.$$

Tatsächlich wollen wir die Stirlingformel nicht beweisen, wir begnügen uns mit einer schwachen Version der Stirlingformel, nämlich mit

$$\log(n!) \approx n \log n. \tag{1.1}$$

*Beweis von (1.1).* Es gilt  $\log n! = \sum_{k=1}^n \log k$ . Außerdem haben wir

$$\int_1^n \log x \, dx \leq \sum_{k=1}^n \log k \leq \int_1^{n+1} \log x \, dx$$

und  $\int_1^z \log x \, dx = z \log z - z + 1$ , also

$$n \log n - n + 1 \leq \log n! \leq (n + 1) \log(n + 1) - n. \tag{1.2}$$

Wenn wir beide Seiten durch  $n \log n$  teilen, erhalten wir das Ergebnis. □


**Beispiel 1.16.** Angenommen wir werfen eine faire Münze  $2n$  mal. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau so oft Kopf wie Zahl werfen? Wir erhalten

$$\binom{2n}{n} \frac{1}{2^{2n}} = \frac{(2n)!}{[2^n(n!)]^2} \approx \frac{\sqrt{2\pi}(2n)^{2n+1/2}e^{-2n}}{[2^n\sqrt{2\pi}n^{n+1/2}e^{-n}]^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

## 1.4 Zusammenfassung des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels sollten Sie vertraut damit sein:

- Wahrscheinlichkeitsraum; (beobachtbaren) Ereignisse;
- die Berechnung (durch Kombinatorik) der Wahrscheinlichkeiten wenn die Ausgänge gleichwahrscheinlich sind;
- die Verwendung der Stirling-Formel um Näherungen dieser Wahrscheinlichkeiten zu finden



**Abbildung 1:** Andrey Kolmogorov (1903–1987), der im Jahr 1933 die axiomatische Zugang der Wahrscheinlichkeitstheorie einführte.

## 2 Axiomatischer Zugang

### 2.1 Axiome der Wahrscheinlichkeitstheorie

Ein Wahrscheinlichkeitsraum ist ein Tripel  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , wobei  $\Omega \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ,  $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ . Von  $\mathcal{F}$  verlangen wir, dass es eine  $\sigma$ -Algebra ist, d.h.

1.  $\emptyset \in \mathcal{F}$ ,  $\Omega \in \mathcal{F}$ .
2. Falls  $A \in \mathcal{F}$ , dann auch  $A^c \in \mathcal{F}$ .
3. Falls  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ , dann auch  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ .

Damit  $\mathbb{P}$  ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, muss es die folgenden Axiome erfüllen:

- I. Für alle  $A \in \mathcal{F}$  gilt  $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ .
- II.  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .
- III. Sind  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  paarweise disjunkt, so gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

Axiom III. nennen wir als die  $\sigma$ -**Additivität** von  $\mathbb{P}$ . Falls  $\Omega$  höchstens abzählbar ist, nehmen wir in der Regel  $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ .

**Beispiel 2.1.** Sei  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ . Gegeben  $p_1, p_2, \dots \geq 0$  mit  $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ , definiert

$$\mathbb{P}(A) := \sum_{i:\omega_i \in A} p_i$$

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf  $\mathcal{P}(\Omega)$ . Tatsächlich ist für abzählbaren Grundraum  $\Omega$  jedes Wahrscheinlichkeitsmaß von dieser Form.

Es ist hilfreich für die Intuition, im Auge zu haben, dass wir bei einem Ereignis  $A$

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(A)}{N} \quad (2.1)$$

erwarten.

D.h.  $\mathbb{P}(A)$  ist der Grenzwert, von  $N(A)$  durch  $N$ , wobei  $N(A)$  ist die Anzahl jener Versuche ist, für die  $A$  eintritt, wenn wir den Versuch  $N$ -mal “unabhängig von einander” wiederholen. (Später werden wir “Unabhängigkeit” richtig definieren, und (2.1) wird sich als wichtiger Satz herausstellen: **das Gesetz der großen Zahlen.**) In diesem Sinn repräsentiert  $\mathbb{P}(A)$  die relative Häufigkeit des Eintretens von  $A$ .

## 2.2 Elementare Eigenschaften

Wir beweisen ein Paar elementare aber nützliche Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmaßen.

**Proposition 2.2.** Sei  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum. Dann gilt:

(i)  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ ,

(ii)  $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$  für  $A \in \mathcal{F}$ ,

(iii) für  $A, B \in \mathcal{F}$  mit  $A \subset B$ , gilt  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$  (Monotonie)

(iv) für alle  $A, B \in \mathcal{F}$ ,  $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ ,

*Beweis.* Sei  $A \in \mathcal{F}$ , und sei  $A_1 = A, A_2 = A^c, A_3 = \emptyset, A_4 = \emptyset, \dots$ . Dann sind  $A_n$  paarweise disjunkt, daraus schließen wir (durch  $\sigma$ -Additivität Axiom III.),

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathbb{P}(A_n).$$

Deshalb gilt  $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ , und  $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c) = 1$ . Das beweist (i) und (ii).

Für (iii) bemerken wir, dass  $B = A \cup (B \setminus A)$  und diese Mengen sind disjunkt. Deswegen ( $\sigma$ -Additivität) gilt  $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$ .

Für (iv) schreiben wir  $A \cup B$  als  $[A \cap B] \cup [A \setminus (A \cap B)] \cup [B \setminus (A \cap B)]$ , wobei die drei Ereignisse disjunkt sind. Deshalb gilt auch

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \setminus (A \cap B)) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \quad \text{durch (ii)} \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \end{aligned}$$

wie gewünscht. □

**Beispiel 2.3.** Wir wählen eine Zahl  $N$  aus  $\{1, \dots, 500\}$ , wobei jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich sein soll. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass  $N$  durch 5 oder 3 teilbar ist?

Sei  $A$  (beziehungsweise  $B$ ) das Ereignis, dass  $N$  durch 5 (beziehungsweise 3) teilbar ist. Dann gilt (weil 5 und 3 relativ prim sind),

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \frac{\lfloor 500/5 \rfloor}{500} = \frac{100}{500} \\ \mathbb{P}(B) &= \frac{\lfloor 500/3 \rfloor}{500} = \frac{166}{500} \\ \mathbb{P}(A \cap B) &= \frac{\lfloor 500/(3 \times 5) \rfloor}{500} = \frac{33}{500},\end{aligned}$$

deshalb erhalten wir

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{100 + 166 - 33}{500} = \frac{233}{500} = 0.466. \quad \square$$

**Proposition 2.4** (Stetigkeit des Wahrscheinlichkeitsmaßes). Für  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  mit  $A_1 \subset A_2 \subset \dots$  gilt

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

wobei  $A = \cup_{n=1}^{\infty} A_n$ . Äquivalent dazu, gilt für  $B_1, \dots \in \mathcal{F}$  mit  $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ , dass

$$\mathbb{P}(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$$

wobei  $B = \cap_{n=1}^{\infty} B_n$ .

*Beweis.* Sei  $A'_n = A_n \setminus A_{n-1}$ ,  $A'_1 = A_1$ . Dann gilt  $A_n = \cup_{i=1}^n A'_i$ . Deshalb ist  $A = \cup_{i=1}^{\infty} A'_i$ , wobei die  $A'_n$  paarweise disjunkt sind. Deswegen gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A'_i) \quad (\text{wegen } \sigma\text{-Additivität}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A'_i) \quad (\text{Definition von unendlichen Reihen}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (\text{wegen } \sigma\text{-Additivität}).\end{aligned}$$

Die zweite Aussagen bekommen wir indem wir Komplemente nehmen. □

## 2.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Seien  $A$  und  $B$ , Ereignisse mit  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Ein entscheidendes Konzept der Wahrscheinlichkeitstheorie ist bedingte Wahrscheinlichkeit. Es erlaubt uns, Aussagen wie “wenn  $B$  eintritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit von  $A$  gleich  $p$ ” zu machen. Betrachten wir zum Beispiel  $A =$  “der Bus wird zu spät kommen” und  $B =$  “es wird regnen”. Unter der Voraussetzung, dass  $B$  eintritt, ist es wahrscheinlicher, dass  $A$  eintritt.

**Definition 2.5.** Seien  $A$  und  $B$  Ereignisse mit  $\mathbb{P}(B) > 0$ . Die bedingte Wahrscheinlichkeit von  $A$ , gegeben  $B$ , ist

$$\mathbb{P}(A|B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Diese Definition ist mit (2.1) intuitiv einfach zu rechtfertigen. Wenn wir das Experiment  $N$ -mal wiederholen, achten wir nur auf Fälle, in denen  $B$  eintritt. (Andere Experimente können ignoriert werden.) Unter jenen Experimenten, für die  $B$  eintritt, zählen wir, wie oft  $A$  eintritt. Deswegen sollte die bedingte Wahrscheinlichkeit gleich

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(A \cap B)}{N(B)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N(A \cap B)/N}{N(B)/N} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

sein.

**Beispiel 2.6.** Ein Würfel wird geworfen. Sei  $B$  das Ereignis, dass das Resultat eine gerade Zahl ist. Und sei  $A$  das Ereignis, dass wir eine 6 würfeln. Was ist  $\mathbb{P}(A|B)$ ? Was ist  $\mathbb{P}(B|A)$ ?

Die Rechnung ist nicht schwer:  $\mathbb{P}(A) = 1/6$ ,  $\mathbb{P}(B) = 1/2$  und  $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) = 1/6$ . Deshalb gilt

$$\mathbb{P}(A|B) = 1/3, \mathbb{P}(B|A) = 1. \quad \square$$

**Beispiel 2.7.** Eine Familie hat 2 Kinder. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Jungs sind, gegeben dass mindestens einer ein Junge ist? (Wir nehmen an, dass jedes Kind entweder ein Junge oder ein Mädchen sein kann, und beide Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind).

Viele Leute antworten  $1/2$ , aber das ist nicht richtig. Warum? Es gibt für die 2 Kinder insgesamt 4 Möglichkeiten:

$$\Omega = \{JJ, JM, MJ, MM\}.$$

Das Ereignis  $B$  = "mindestens einer ist ein Junge" ist deswegen  $B = \{JJ, JM, MJ\}$ : die einzige Information, die uns gegeben wird, ist dass  $MM$  tritt nicht ein. Deswegen gilt  $\mathbb{P}(A|B) = 1/3$ , wobei  $A$  das Ereignis "Beide sind Jungs" ist.  $\square$

Für ein ähnlich kontraintuitives berühmtes Problem, suchen Sie "**Monty Hall Problem**"! Achtung - es wird Sie verrückt machen...

**Proposition 2.8** (Gesetz der vollständigen Wahrscheinlichkeit). Seien  $A, B$ , Ereignisse mit  $0 < \mathbb{P}(B) < 1$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A|B^c)\mathbb{P}(B^c).$$

In Worten bedeutet dieser Satz, dass man über die zwei Möglichkeiten  $B$  und  $B^c$  zerlegen kann, um die Gesamtwahrscheinlichkeit von  $A$  zu berechnen.

*Beweis.* Es reicht  $A$  in der Form  $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$  zu zerlegen und zu bemerken, dass die zwei Ereignisse paarweise disjunkt sind. Deshalb gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B^c) \\ &= \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}\mathbb{P}(B) + \frac{\mathbb{P}(A \cap B^c)}{\mathbb{P}(B^c)}\mathbb{P}(B^c).\end{aligned}$$

Daraus schließen wir sofort auf das Ergebnis. □

**Beispiel 2.9** (“Ruin des Spielers”, “Gambler’s ruin”). Eine Münze wird wiederholt geworfen. Für jeden Wurf bekommt der Spieler 1€ (wenn Kopf kommt) oder verliert er 1€ (wenn Zahl kommt). Anfänglich hat er  $x$  Euros. Er spielt weiter, bis er entweder pleite ist oder  $N$  Euros hat ( $0 < x < N$ ).

Sei  $p_x$ , die Wahrscheinlichkeit, dass er  $N$  euros bekommt, bevor er pleite ist.

Durch das Gesetz der vollständigen Gesamtwahrscheinlichkeit gilt

$$p_x = \frac{1}{2}p_{x+1} + \frac{1}{2}p_{x-1};$$

mit den Randbedingungen  $p_0 = 0; p_N = 1$ . (Die eindeutige Lösung dieser Gleichung ist  $p_x = x/N$ .) □

## 2.4 Der Satz von Bayes

**Satz 2.10** (Satz von Bayes). Sei  $\{B_i : i \in I\}, B_i \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(B_i) > 0$  eine Partition des Wahrscheinlichkeitsraumes, wobei  $I$  eine höchstens abzählbare Indexmenge ist, und bezeichne  $A$  ein Ereignis mit  $\mathbb{P}(A) > 0$ . Dann gilt für  $j \in I$

$$\mathbb{P}(B_j|A) = \frac{\mathbb{P}(A|B_j)\mathbb{P}(B_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)}.$$

*Beweis.* Folgt direkt aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit. □

**Beispiel 2.11.** Ein medizinischer Test erkennt eine infizierte Personen mit einer Wahrscheinlichkeit von 98%. Allerdings hat er eine ‘false positive’ Rate von einem 1%. Angenommen 0.1% der Bevölkerung hat die Krankheit. Wenn eine zufällige Person positiv getestet wurde, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie tatsächlich infiziert ist? Wir schreiben  $+$  für das Ereignis positiv getestet zu werden und  $K$  für das Ereignis erkrankt zu sein. Dann erhalten wir mit dem Satz von Bayes

$$\mathbb{P}(K|+) = \frac{\mathbb{P}(+|K)\mathbb{P}(K)}{\mathbb{P}(+|K)\mathbb{P}(K) + \mathbb{P}(+|K^c)\mathbb{P}(K^c)} \tag{2.2}$$

$$= \frac{0.98 \cdot 0.001}{0.98 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999} \approx 0.09 \tag{2.3}$$

D.h. nur etwa 9% der Leute die positiv getestet werden, sind tatsächlich positiv.

## 2.5 Unabhängigkeit

**Beispiel 2.12.** Ein Würfel wird geworfen und wir betrachten die Ereignisse  $G$  “Augenzahl gerade” und  $D$  “Augenzahl durch drei teilbar. Dann gilt  $\mathbb{P}(G|D) = \mathbb{P}(G)$ . Anders gesagt, zu wissen, dass  $D$  eintritt verrät einem nichts darüber ob  $G$  eintreten wird, “das Eintreten von  $D$  ist unabhängig vom Eintreten von  $G$ ”.

**Definition 2.13.** Zwei Ereignisse  $A, B$  heißen unabhängig falls

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Falls zusätzlich  $\mathbb{P}(B) > 0$ , dann sind  $A, B$  genau dann unabhängig wenn

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A).$$

Falls  $A, B$  unabhängige Ereignisse sind, so auch  $A, B^c$ , wie man leicht nachrechnet:

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B^c) = \mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \cap B^c).$$

**Beispiel 2.14.** Wir werfen zwei Würfel.  $A$  ist das Ereignis, dass der erste Würfel eine gerade Augenzahl zeigt.  $B$  ist das Ereignis, dass der zweite Würfel eine gerade Augenzahl zeigt. Es ist dann leicht einzusehen, dass  $A$  und  $B$  unabhängig sind.

Sei weiters  $C$  das Ereignis, dass die Summe der beiden Augenzahlen ungerade ist. Man kann sich dann auch überlegen, dass  $A$  und  $C$  unabhängig sind. (Am besten malt man dazu ein Bild.)

Unabhängige Experimente: Wenn wir über unabhängige Ereignisse reden, stellen wir uns typischer Weise vor, dass zwei Experimente durchgeführt werden, die nichts mit einander zu tun haben. Gegeben seien  $\Omega_1 = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$  und  $\Omega_2 = \{\beta_1, \beta_2, \dots\}$  mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen  $p_1, p_2, \dots$  und  $q_1, q_2, \dots$ . Wenn wir in diesem Zusammenhang von zwei unabhängigen Experimenten reden, dann meinen wir damit, dass wir den Ereignisraum  $\Omega_1 \times \Omega_2$  mit der durch

$$\mathbb{P}((\alpha_i, \beta_j)) = p_i q_j$$

definierten Wahrscheinlichkeitsverteilung betrachten.

Sei nun  $A \subseteq \Omega_1, B \subseteq \Omega_2$ . Wir können dann das Ereignis  $A$  auch als Ereignis auf  $\Omega_1 \times \Omega_2$  auffassen, indem wir es mit der Menge  $A \times \Omega_2$  identifizieren. Analog verfahren wir mit der Menge  $B$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \sum_{\alpha_i \in A, \beta_j \in B} p_i q_j = \sum_{\alpha_i \in A} p_i \sum_{\beta_j \in B} q_j = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Das erklärt warum wir die beiden Experimente als unabhängig bezeichnen.

## 2.6 Unabhängigkeit von mehreren Ereignissen

**Definition 2.15.** Ereignisse  $A_1, A_2, \dots$  heißen unabhängig oder gemeinsam unabhängig falls für alle  $i_1 < i_2 < \dots < i_k$  gilt, dass

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1})\mathbb{P}(A_{i_2}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Wie zuvor überlegt man sich leicht, dass die Unabhängigkeit von Ereignissen erhalten bleibt, wenn man manche der Ereignisse  $A_i$  durch ihre Komplementärereignisse  $A_i^c$  ersetzt.

Analog zu oben, erhalten wir gemeinsam unabhängige Ereignisse indem wir Ereignisse auf unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsräumen stattdessen auf dem gemeinsam Produktraum betrachten.

Es kann übrigens passieren, dass Ereignisse  $A_1, A_2, \dots$  paarweise unabhängig sind, aber nicht gemeinsam. Etwa gilt in Beispiel 2.14

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = 1/8 \neq 0 = \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

**Beispiel 2.16.** Wir nehmen an, dass eine Münze einmal geworfen wird, mit möglichen Ausgängen  $\{K, Z\} = \Omega$ . Für  $p \in [0, 1]$  ist die *Bernoulliverteilung*  $B(1, p)$  gegeben durch

$$\mathbb{P}(K) = p, \quad \mathbb{P}(Z) = 1 - p =: q.$$

**Beispiel 2.17.** Wenn wir die obige Münze  $n$ -mal werfen, erhalten wir eine Folge von *Bernoullixperimenten*. Die Anzahl der Köpfe die man dabei erhält, ist eine Zahl in der Menge  $\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$ . Gegeben  $k \in \Omega$ , gibt es  $\binom{n}{k}$  Wurffolgen die zu  $k$  Köpfen führen und jede dieser Folgen passiert mit Wahrscheinlichkeit  $p^k(1-p)^{n-k}$ . Insgesamt erhalten wir die *Binomialverteilung*  $B(n, p)$  durch

$$\mathbb{P}(k \text{ Köpfe}) = p_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Wie viele Köpfe erwarten wir im Durchschnitt? Im nächsten Kapitel werden wir besprechen, wie man diese Frage formalisiert.

## 2.7 Zusammenfassung des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels sollten Sie vertraut damit sein:

- die Axiome von Wahrscheinlichkeitstheorie
- die Definition von bedingte Wahrscheinlichkeit, das Gesetz der vollständigen Wahrscheinlichkeit und der Satz von Bayes
- dem Begriff der Unabhängigkeit (für zwei oder mehrere Ereignisse)

## 3 Zufallsvariablen

### 3.1 Definition; Verteilungen

Oft interessieren wir uns nicht nur für ein Experiment und seinen Ausgang, sondern auch für numerische Größen, die diesem Experiment zugeordnet sind. Zum Beispiel interessiert sich ein Spieler nicht nur für den Ausgang eines Spiels, sondern auch dafür, wie viel er gewinnt oder verliert. Ein Netzbetreiber interessiert sich dafür, wie lang ein typischer Anruf dauert, und wie viele Leitungen ungefähr zu einem bestimmten Zeitpunkt belegt sind.

Aus diesem Grund ist das Konzept von *Zufallsvariablen* sehr wichtig und hilfreich. Eine Zufallsvariable ist einfach eine numerische Größe, die einem Zufälligen Experiment zugeordnet ist. D.h., gegeben ein Ausgang  $\omega \in \Omega$ , können wir ihm eine bestimmte Größe  $X(\omega) \in \mathbb{R}$  zuordnen. Formal ist eine Zufallsvariable  $X$  nur eine Funktion von  $\Omega$  nach  $\mathbb{R}$ .

**Definition 3.1.** Sei  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  ein Wahrscheinlichkeitsraum. Eine Zufallsvariable  $X$  ist eine Funktion  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , sodass für alle  $a, b \in \mathbb{R}$ , das Ereignis  $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (a, b)\} \in \mathcal{F}$ .

Manchmal ist es auch praktisch, Zufallsvariable zu betrachten die Werte in einem anderen Raum annehmen, zB in der Menge  $\{\text{Kopf, Zahl}\}$ , wenn wir über Münzwürfe reden.

**Notation.** Wir kürzen den Begriff Zufallsvariable mit ZV ab. Das Ereignis,  $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (a, b)\}$  wird IMMER wie folgt abgekürzt:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (a, b)\} = \{X \in (a, b)\}.$$

Das heißt, wir lassen  $\omega$  aus der Beschreibung des Ereignisses weg.

**Bemerkung 3.2.** Im diesem Kurs achten wir nicht auf die Bedingung  $\{X \in (a, b)\} \in \mathcal{F}$ , die aus der Maßtheorie stammt. Diese und ähnliche Bedingungen werden im Folgenden ignoriert.

**Konvention.** Wir verwenden Großbuchstaben wie  $X, Y, Z$  um Zufallsvariablen darzustellen. Die Kleinbuchstaben wie  $x, y, z$  werden verwendet, um mögliche Werte dieser Zufallsvariablen darzustellen. Diese Konvention ist sehr hilfreich.

**Definition 3.3.** Die Abbildung, die einer Menge<sup>1</sup>  $S \subset \mathbb{R}$ , die Wahrscheinlichkeit  $\mathbb{P}(X \in S)$  zuordnet, wird als **Verteilung** von  $X$  bezeichnet.

**Beispiel 3.4.** Sei  $X$  das Resultat eines Würfels. Dann ist die Verteilung von  $X$

$$\mathbb{P}(X \in S) = \frac{|S \cap \{1, \dots, 6\}|}{6}.$$

Wir sagen, dass  $X$  die **uniforme Verteilung** auf  $\{1, \dots, 6\}$  hat oder dass  $X$  auf  $\{1, \dots, 6\}$  *gleichverteilt* ist.

**Bemerkung 3.5.** Die Verteilung einer Zufallsvariable  $X$  beschreibt keine bestimmte Erkenntnis über den Ausgang von  $X$ , sondern ihre **statistischen Eigenschaften**, z.B. ist es wahrscheinlicher, dass  $X$  positiv oder negativ ist? Genauer gesagt, beschreibt die Verteilung von  $X$  *alles* was statistisch mit  $X$  passieren kann.

---

<sup>1</sup>mit  $\{X \in S\} \in \mathcal{F}$

## 3.2 Diskrete Zufallsvariablen; wichtige Beispiele

Sei  $X$  eine Zufallsvariable (implizit definiert über einen bestimmten Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ).

**Definition 3.6.** Wir sagen, dass  $X$  **diskret** ist, falls eine diskrete Menge  $\mathcal{W}$  existiert, sodass  $\mathbb{P}(X \in \mathcal{W}) = 1$ . Wir sagen dann, dass die  $X$  fast sicher Werte in  $\mathcal{W}$  annimmt. In diesem Fall können wir die Verteilung von  $X$  einfach über die sogenannte Wahrscheinlichkeitsfunktion WF<sup>2</sup> (oder Zähldichte)

$$p(x) := \mathbb{P}(X = x); x \in \mathcal{W}$$

beschreiben.

Hier bedeutet *diskret*, dass  $\mathcal{W}$  entweder endlich, oder abzählbar unendlich, ist. Zum Beispiel ist das Resultat  $X$  eines Würfels eine diskrete Zufallsvariable, mit  $\mathcal{W} = \{1, \dots, 6\}$ . Ihre WF ist einfach zu berechnen:

$$p(x) = \frac{1}{6}, x \in \mathcal{W}.$$

Gegeben die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Zufallsvariable  $X$  erhalten wir die Verteilung von  $X$  durch

$$\mathbb{P}(X \in S) = \sum_{x \in S} p(x). \quad (3.1)$$

Beobachten Sie, dass  $p(x) \geq 0$  und  $\sum_{x \in \mathcal{W}} p(x) = 1$ . D.h., mit Wahrscheinlichkeit 1 nimmt Zufallsvariable irgendeinen Wert an.

**Beispiel 3.7.** Zwei Würfel werden geworfen, wobei alle Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind. Seien  $X$  und  $Y$  (respektive) die Ergebnisse. Was ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion  $p$  von  $X + Y$ ?

Tatsächlich haben wir sie schon berechnet: das Ereignis  $\{X + Y = k\}$  ist genau das Ereignis  $S_k$  von Beispiel 1.8. Deshalb gilt

$$p(k) = \begin{cases} (k-1)/36, & \text{falls } 2 \leq k \leq 7 \\ (13-k)/36 & \text{falls } 7 \leq k \leq 12. \end{cases}$$

Als nächstes geben wir ein paar wichtige Beispiele, denen wir in der Wahrscheinlichkeitstheorie sehr oft begegnen.

**Beispiel 3.8.** (Fortsetzung von Beispiel 2.16.) Wir nehmen an, dass eine Münze einmal geworfen wird, mit möglichen Ausgängen  $\{0, 1\}$ . Sei  $X$  das Ergebnis, dann gilt

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p =: q.$$


Deshalb hat  $X$  die **Bernoulliverteilung**  $B(p)$ .

---

<sup>2</sup>Im Gegensatz zum Englischen Pendant “probability mass function” wird der Begriff “Wahrscheinlichkeitsfunktion” in der deutschen Literatur leider nicht ganz einheitlich verwendet.

**Bemerkung 3.9.** Wenn wir im folgenden von einem *Würfel* sprechen, meinen wir damit stets eine diskrete *Zufallsvariable*, die auf der Menge  $\{1, 2, \dots, 6\}$  gleichverteilt ist.

Eine *Münze* ist eine diskrete *Zufallsvariable* die fast sicher Werte in der Menge  $\{0, 1\}$  annimmt. Wir nennen die Münze *fair*, wenn sie sowohl den Wert 0 als auch den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{2}$  annimmt.



**Abbildung 2:** Die Binomialverteilung mit  $n = 100$ ,  $p = 0.3$ .

**Beispiel 3.10.** (Fortsetzung von Beispiel 2.17). Wenn wir die obige Münze  $n$ -mal werfen, erhalten wir eine Folge von *Bernoulliexperimenten*. Die Anzahl  $X$  der Köpfe die man dabei erhält, ist eine Zahl in der Menge  $\mathcal{W} = \{0, 1, \dots, n\}$ . Gegeben  $k \in \mathcal{W}$ , gibt es  $\binom{n}{k}$  Wurffolgen die zu  $k$  Köpfen führen und jede dieser Folgen passiert mit Wahrscheinlichkeit  $p^k(1-p)^{n-k}$ . Insgesamt erhalten wir

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Deshalb hat  $X$  die **Binomialverteilung**  $B(n, p)$ .

Wir beobachten, dass  $\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(X = k) = 1$ , weil  $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  (binomischer Lehrsatz).

**Beispiel 3.11.** Wir betrachten eine unendliche Folge von Münzwürfen (Bernoulliexperimenten) und fragen uns wie viele Male  $Z$  müssen wir die Münze werfen, bis wir das erste Mal Kopf bekommen. Dann ist  $Z$  eine diskrete Zufallsvariable mit Werten in  $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots\}$  (bemerken Sie, dass der kleinste mögliche Wert von  $Z$  nach Definition  $z = 1$  ist; d.h., der erste Wurf hat Nummer 1). Ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion ist offenbar


$$\mathbb{P}(Z = k) = (1-p)^{k-1} p; \quad k \geq 1.$$

Wir sagen, dass  $Z$  die **geometrische Verteilung** mit Parameter  $p$  hat. Wir beachten, dass  $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(Z = k) = 1$ , d.h. mit Wahrscheinlichkeit 1 kommt irgendwann ein Kopf.

### 3.3 Verteilungen als Wahrscheinlichkeitsmaße

Sei  $X$  eine diskrete Zufallsvariable (auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ) mit Wertebereich  $\mathcal{W} = \{x : \mathbb{P}(X = x) > 0\}$ . Dann bezeichnen wir die Abbildung

$$P_X(S) := \mathbb{P}(X \in S) \tag{3.2}$$



**Abbildung 3:** Die geometrische Verteilung mit  $p = 0.4$

als Verteilung von  $X$  (auf  $\mathcal{W}$ ). Die (von uns oft großzügig ignorierte) Bedingung  $\{X \in S\} \in \mathcal{F}$  stellt sicher, dass  $P_X$  für alle Teilmengen  $S$  von  $\mathcal{W}$  definiert ist. Sei weiters  $p(x) = \mathbb{P}(X = x); x \in \mathcal{W}$  wie oben die Massenfunktion der Zufallsvariable  $X$ . Gemäß Gleichung (3.1) gilt

$$P_X(S) = \mathbb{P}(X \in S) = \sum_{x \in S} p(x).$$

Das bedeutet, dass das Tripel  $(\mathcal{W}, \mathcal{P}(\mathcal{W}), P_X)$  selbst ein Wahrscheinlichkeitsraum ist.

Wir sagen, dass zwei Zufallsvariable  $X, Y$  *gleich in Verteilung* sind falls  $P_X = P_Y$ , i.Z.  $X \sim Y$ .

**Lemma 3.12.** *Angenommen  $X$  ist eine diskrete Zufallsvariable. Dann gibt es eine Zufallsvariable  $Y$  auf einem höchstens abzählbaren Wahrscheinlichkeitsraum, so dass  $Y$  die selbe Verteilung wie  $X$  hat.*

*Beweis.* Das könnte eine einfache Übungsaufgabe sein. □

Formal haben wir Zufallsvariable als Funktionen definiert. Dies geschieht allerdings in erster Linie weil es technisch praktisch ist; im Gegensatz dazu ist es für unser intuitives Verständnis nicht so wichtig. Das kann man insbesondere an der Art von Fragen festmachen, die wir in der Wahrscheinlichkeitstheorie stellen. Beispielsweise fragen wir uns ob eine Zufallsvariable mit positiver Wahrscheinlichkeit positiv ist. Wir fragen uns *nicht* ob eine Zufallsvariable differenzierbar ist. Grob gesagt, stellen wir in der Wahrscheinlichkeitstheorie nur Fragen die sich schon beantworten lassen wenn man die Verteilung einer Zufallsvariablen kennt.

Angenommen diskrete Zufallsvariable  $X_1, X_2$  sind auf dem selben Wahrscheinlichkeitsraum definiert. Seien  $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$  diskrete Mengen mit  $\mathbb{P}(X_i \in \mathcal{W}_i) = 1$ . Dann können wir auch die Abbildung

$$X(\omega) := (X_1(\omega), X_2(\omega))$$

als Zufallsvariable interpretieren. Dann gilt

$$\mathbb{P}((X_1, X_2) \in \mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2) = \mathbb{P}(X_1 \in \mathcal{W}_1, X_2 \in \mathcal{W}_2) = 1,$$

d.h.  $(X_1, X_2)$  liegt mit Wahrscheinlichkeit 1 in der diskreten Menge  $\mathcal{W}_1 \times \mathcal{W}_2$  und ist daher auch eine diskrete Zufallsvariable.


Wir sagen das Paare von Zufallsvariablen  $(X_1, X_2)$  und  $(Y_1, Y_2)$  dieselbe *gemeinsame Verteilung* haben, wenn  $P_{(X_1, X_2)} = P_{(Y_1, Y_2)}$ .

### 3.4 Die Poissonapproximation der Binomialverteilung

**Beispiel 3.13.** Die *Poissonverteilung* wird oft verwendet um zu modellieren wieviele Ereignisse innerhalb einer festen Zeitspanne stattfinden werden, zum Beispiel die Anzahl der Glühbirnen die innerhalb eines Jahres ausfallen werden. Die Poissonverteilung  $P(\lambda), \lambda > 0$  ist gegeben durch

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots$$

Heuristisch, gibt der Parameter  $\lambda$  an wie viele Ereignisse ‘durchschnittlich’ passieren werden, wir werden das später noch formalisieren.



**Abbildung 4:** Die Poissonverteilung mit  $\lambda = 3$ .

**Satz 3.14** (Poissonapproximation der Binomialverteilung). *Sei  $\lambda > 0$ . Angenommen  $n \rightarrow \infty$  und  $p = \lambda/n$  (eigentlich brauchen wir für  $p$  nur dass  $pn \rightarrow \lambda$ ). Dann gilt*

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots,$$

wobei  $X_n$  die Binomialverteilung  $B(n, p = \lambda/n)$  hat. Das heißt für großes  $n$  und kleines  $p$  verhält sich  $B(n, p)$  ungefähr wie  $P(pn)$ .

*Beweis.* Wir erinnern uns, dass  $(1 - \frac{a}{n})^n \approx e^{-a}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_n = k) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} (np)^k \left(1 - \frac{np}{n}\right)^{n-k} \rightarrow \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda}. \end{aligned} \quad (3.3) \quad \square$$

### 3.5 Erwartungswert

Sei  $X$  eine diskrete Zufallsvariable. Wie groß ist  $X$  *durchschnittlich*? Ist sie eher klein oder groß? Das ist eine statistische Frage über  $X$  und natürlich können wir sie präzise mit Hilfe der Verteilung beantworten. Aber oft brauchen wir nur eine grobe Zusammenfassung, oder eine Größenordnung. In diesem Fall ist der Erwartungswert von  $X$  sehr hilfreich.

**Definition 3.15.** Der Erwartungswert einer Zufallsvariable  $X$  mit  $\int |X| d\mathbb{P} < \infty$  ist definiert als

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} x dP_X(x).$$

Der Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariable  $X$  mit Wahrscheinlichkeitsfunktion  $p(x)$  ist dann gleich

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x:p(x)>0} xp(x) = \sum_x x\mathbb{P}(X = x) \in (-\infty, \infty).$$

Offenbar hängt der Erwartungswert einer Zufallsvariable (und auch dessen Existenz) nur von der Verteilung der Zufallsvariable ab.

**Beispiel 3.16.** Sei  $X$  mit Wahrscheinlichkeit  $p$  gleich 1, sonst 0, d.h.  $X \sim B(1, p)$ . Dann ist  $\mathbb{E}[X] = p$ .

**Beispiel 3.17.** Angenommen  $X$  stellt den Wurf eines Würfels dar. Dann gilt  $\mathbb{E}[X] = 3.5$ .

**Beispiel 3.18.** Sei  $X$  binomialverteilt, i.Z.  $X \sim B(n, p)$ . Dann gilt  $\mathbb{E}[X] = np$ .

Um das zu sehen, kann man direkt in die Definition des Erwartungswertes einsetzen was

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^n kp^k(1-p)^{n-k} \binom{n}{k}$$

liefert. Ausgehend davon kommt man nach kurzer Rechnung zum Ergebnis. Wir werden unten aber gleich sehen, dass wir einem kleinen Trick das Ergebnis auch ohne Rechnung erhalten können.

**Lemma 3.19.** Angenommen  $\Omega$  ist höchstens abzählbar und der Erwartungswert von  $X$  existiert. Dann gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)p_{\omega},$$

wobei  $p_{\omega} = \mathbb{P}(\{\omega\})$ .

Beweis. Übung. □

Der folgende Satz sagt uns insbesondere, dass  $\mathbb{E}$  ein *linearer Operator* ist.

**Satz 3.20** (Eigenschaften des Erwartungswertes). *Seien  $X, Y$  Zufallsvariable deren Erwartungswerte existieren.*

1. Falls  $X \geq 0$  dann gilt  $\mathbb{E}[X] \geq 0$ .
2. Falls  $X \geq 0$  und  $\mathbb{E}[X] = 0$  dann gilt  $\mathbb{P}(X = 0) = 1$ .
3. Für reelle Zahlen  $a, b$  gilt  $\mathbb{E}[a + bX] = a + b\mathbb{E}[X]$ .
4. Es gilt  $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ .

*Beweis.* Die Aussage ist folgt aus den Eigenschaften des Integrals. Zur Illustration geben wir hier das Argument für den Fall, dass  $X, Y$  auf einem abzählbaren Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind.

1.  $X \geq 0$  impliziert, dass  $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega} X(\omega) \geq 0$ .
2. Indirekt: Wenn es ein  $\omega$  mit  $p_{\omega}$  und  $X(\omega) > 0$  gibt, dann gilt auch  $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega} X(\omega) > 0$ .
3.  $\mathbb{E}[a + bX] = \sum_{\omega \in \Omega} (a + bX(\omega))p_{\omega} = a + b \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)p_{\omega} = a + b\mathbb{E}[X]$ .
4.  $\sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega}(X(\omega) + Y(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega}X(\omega) + \sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega}Y(\omega)$ .

□

**Beispiel 3.21.** Wir machen wieder das Binomialverteilungsexperiment, d.h.,  $n$  Münzen werden unabhängig geworfen, wobei jede mit Wahrscheinlichkeit  $p$  Kopf zeigt und  $X$  bezeichne die Anzahl der Köpfe die man insgesamt sieht, d.h.  $X \sim B(n, p)$ . Sei  $X_i = 1$ , falls die  $i$ -te Münze Kopf zeigt und 0 sonst, also  $X_i \sim B(1, p)$ . Dann ist  $X = X_1 + \dots + X_n$  und somit gilt

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = p + \dots + p = np.$$

**Beispiel 3.22.** Wie viele Mal müssen wir durchschnittlich eine Münze würfen, bis wir eine Kopf bekommen? Sei  $X \sim G(p)$  (d.h.,  $X$  ist eine Zufallsvariable mit geometrischer  $G(p)$  Verteilung). Gesucht ist die Erwartungswert von  $X$ . Wir berechnen:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k \geq 1} k(1-p)^{k-1}p \\ &= p \sum_{k \geq 1} \frac{d}{dx} x^k \Big|_{x=1-p} \\ &= p \frac{d}{dx} \left( \sum_{k \geq 0} x^k \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= p \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{1-x} \right) \Big|_{x=1-p} \\ &= 1/p. \end{aligned}$$

Das ist konsistent mit unserer Intuition. Überlegen Sie zum Beispiel den Fall  $p \ll 1$ . Nach Beispiel 3.21 werden wir bei  $1/p$  Würfeln durchschnittlich einen Erfolg haben.

Der folgende Satz formalisiert, dass der Erwartungswert (in einem bestimmten Sinn) die beste Approximation einer Zufallsvariable durch eine Konstante ist.

**Satz 3.23.** *Sei  $X$  eine Zufallsvariable sodass Erwartungswert von  $X$  und Erwartungswert von  $X^2$  existieren. Dann ist  $\mathbb{E}[X]$  die Konstante die*

$$\mathbb{E} [(X - c)^2]$$

*minimiert.*

*Beweis.* Wir schreiben zur Vereinfachung  $m = \mathbb{E}(X)$ .

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(X - c)^2] &= \mathbb{E} [(X - m + m - c)^2] \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2 + 2(X - m)(m - c) + (m - c)^2] \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2] + 2\mathbb{E} [(X - m)(m - c)] + \mathbb{E} [(m - c)^2] \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2] + 2\mathbb{E} [(X - m)] (m - c) + (m - c)^2 \\ &= \mathbb{E} [(X - m)^2] + (m - c)^2. \end{aligned}$$

Der letzte Ausdruck wird offenbar genau für  $c = m$  minimal. □

Der Wert des Minimums wird später als *Varianz* bezeichnet.

### 3.6 Funktionen einer Zufallsvariable

Angenommen  $X$  ist eine diskrete Zufallsvariable und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion. Dann ist  $f(X)$  ebenso eine Zufallsvariable. Um  $\mathbb{E}[f(X)]$  zu berechnen, können wir theoretisch zuerst die Verteilung (oder genauer gesagt die WF,  $p_{f(X)}$ ) von  $f(X)$  beschreiben und schließlich den Erwartungswert durch Summierung von  $xp_{f(X)}(x)$  berechnen. In der Praxis ist das jedoch meist nicht der geschickteste Weg. Viel einfacher ist es, direkt mit der Verteilung von  $X$  zu rechnen. Der folgende Satz erlaubt uns, es zu tun.

**Proposition 3.24.** *Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit WF  $p(x), x \in \mathcal{W}$  und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Dann gilt*

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in \mathcal{W}} f(x)p(x).$$

*Genauer gesagt konvergiert die Reihe auf der rechten Seite absolut genau denn wenn die Reihe, die den Erwartungswert definiert, absolut konvergiert.*

*Beweis.* Dieser Ausdruck ist eine einfache Folgerung von Lemma 3.19. □

**Beispiel 3.25.** Sei  $X$  gleichverteilt auf  $\{0, \dots, n-1\}$ . Berechnen Sie  $\mathbb{E}(\sin(2\pi X/n))$ . Wir beobachten, dass

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\sin(2\pi X/n)) &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin(2k\pi/n) \\ &= \frac{1}{n} \Im \left( \sum_{k=0}^{n-1} e^{2ik\pi/n} \right) \\ &= \frac{1}{n} \Im \left( \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - e^{2i\pi/n}} \right) = 0.\end{aligned}$$

Finden Sie einen geometrischen Beweis!

### 3.7 Varianz einer Zufallsvariable

Der Erwartungswert einer Zufallsvariable ist eine gute Annäherung (in einem bestimmten Sinn, die *beste* Annäherung, siehe Satz 3.23) einer Verteilung durch eine Konstante. Aber wie gut ist diese Annäherung? Um dies zu messen, führen wir die *Varianz* einer Zufallsvariable ein, die die Ausbreitung der Verteilung misst.

**Beispiel 3.26.** Betrachten Sie zwei Spiele. Im ersten Spiel, werfen wir eine faire Münze. Wenn Kopf kommt, bekomme ich 1\$, sonst verliere ich 1\$.

Im zweiten Spiel, würfen wir die Münze mit  $\mathbb{P}(\text{Kopf}) = 99.9\%$ . Wenn ich Kopf erhalte, dann bekomme ich 1\$. Sonst verliere ich 999\$.

Welches Spiel möchten Sie spielen?

Tatsächlich sind beide Spiele *fair*: der erwartete Gewinn ist gleich 0 (überprüfen Sie es!) Trotzdem ist das Risiko im zweiten Spiel viel höher!

Obwohl die Erwartungswerte in diesen beiden Spielen gleich sind, sind die Varianzen sehr verschieden. Hier ist die Definition.

**Definition 3.27.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Erwartungswert  $\mu$ . Die Varianz von  $X$  ist

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mu)^2].$$

wenn dieser Erwartungswert wohldefiniert ist. Dann ist die Standardabweichung

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}.$$

Im obigen Beispiel gilt  $\mu = 0$ . Deshalb erhalten wir  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2)$ . Dies ist gleich 1 im ersten Spiel, und im zweiten Spiel gleich

$$\mathbb{E}(X^2) = p1 + (1 - p)999^2 \approx 1 + 10^3$$

wobei  $p = \mathbb{P}(\text{Kopf}) = 99.9\%$ .

Um die Varianz zu berechnen, ist es oft praktisch den folgenden Satz zu verwenden:

**Proposition 3.28.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Erwartungswert  $\mu$ . Dann gilt  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mu^2$ .

*Beweis.* Das ist eine einfache Folge der Linearität des Erwartungswertes:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.\end{aligned}$$

□

**Beispiel 3.29.** Sei  $X$  eine Bernoulliverteilte Zufallsvariable. Dann gilt  $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ . Da  $X \in \{0, 1\}$  erhalten wir  $X^2 = X$ . Weiterhin ist  $\mathbb{E}(X) = p$ . Deswegen gilt

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1 - p).$$

Bemerken Sie, dass die größte Varianz (oder Standardabweichung) für  $p = 1/2$  erreicht wird.

**Beispiel 3.30.** Sei  $X$  geometrisch verteilt. Zeigen Sie, dass die Varianz von  $X$  gleich  $(1 - p)/p^2$  ist.

Um  $\text{Var}(X)$  zu berechnen, erinnern wir uns dass (wegen Beispiel 3.22)  $\mathbb{E}(X) = 1/p$ . Weiterhin finden wir durch Proposition 3.24

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k \geq 1} k^2 (1 - p)^{k-1} p.$$

Den Rest überlassen wir als Übung. □

Was haben wir mit dieser Berechnung gelernt? Betrachten Sie zum Beispiel den Fall  $p \rightarrow 0$ . Dann haben wir  $\mathbb{E}(X) = 1/p \gg 1$  und  $\text{Var}(X) \approx 1/p^2$ . Deshalb erwarten wir, dass  $X$  typischerweise in der Größenordnung von  $1/p$  ist, mit Abweichung (oder Fluktuation) auch in dieser Größenordnung. D.h., ungefähr  $100/p$  oder  $0.01/p$  sind mögliche Werte. Tatsächlich werden wir später sehen, dass die Verteilung von  $X$ , skaliert um  $1/p$  (sodass die  $x$ -Achse um den Faktor  $p$  schrumpft) sieht ungefähr wie die exponentiale Funktion aus.

## 3.8 Unabhängige Zufallsvariablen

**Definition 3.31.** Familien von Mengen  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots$  sind unabhängig, falls  $A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2 \dots$  stets unabhängig sind. Zufallsvariablen sind unabhängig, falls die von ihnen erzeugten  $\sigma$ -Algebren unabhängig sind.

**Bemerkung 3.32.** Insbesondere sind diskrete Zufallsvariablen  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig falls für alle  $x_1, \dots, x_n$

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \dots \mathbb{P}(X_n = x_n).$$

Offenbar bedeutet das gerade dass die Ereignisse  $\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\}$  jeweils unabhängig sind.

**Beispiel 3.33.** In Beispiel 3.21 sind  $X_1, \dots, X_n$  unabhängige Zufallsvariable.

**Satz 3.34.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig und  $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  Funktionen. Dann sind auch  $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$  unabhängige Zufallsvariablen.

*Beweis.* Einfach. □

**Satz 3.35.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängige Zufallsvariablen deren Erwartungswerte existieren. Dann gilt

$$\mathbb{E}[X_1 \cdot \dots \cdot X_n] = \mathbb{E}[X_1] \cdot \dots \cdot \mathbb{E}[X_n].$$

*Beweis.* Wir bringen den Beweis für den Fall von diskreten Zufallsvariablen.

Wir schreiben  $\mathcal{W}_i$  für den Wertebereich von  $X_i$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1 \cdot \dots \cdot X_n] &= \sum_{x_1 \in \mathcal{W}_1} \dots \sum_{x_n \in \mathcal{W}_n} x_1 \dots x_n \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \\ &= \prod_{i=1}^n \left( \sum_{x_i \in \mathcal{W}_i} x_i \mathbb{P}(X_i = x_i) \right) = \mathbb{E}[X_1] \cdot \dots \cdot \mathbb{E}[X_n]. \end{aligned}$$

Der Beweis im allgemeinen Fall erfolgt über die Schritte 1) Beweis für Treppenfunktionen, 2) allgemeiner Fall über Grenzwertargument. □

### 3.9 Varianz einer Summe

Die Identität in Satz 3.35 hat fundamentale Konsequenzen in der gesamten Wahrscheinlichkeitstheorie. Um sie besser zu verstehen, wollen wir gleich auf die geometrische Interpretation eingehen.

Sei der Einfachheit halber  $\Omega$  ein endlicher Raum, d.h.  $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ . Dann können wir eine Zufallsvariable  $X, Y$  mit den Vektoren

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n) = (X(\omega_1), \dots, X(\omega_n)), \vec{y} = (y_1, \dots, y_n) = (Y(\omega_1), \dots, Y(\omega_n)) \in \mathbb{R}^n$$

identifizieren. Der Erwartungswert von  $X \cdot Y$  entspricht dann gerade einem inneren Produkt auf  $\mathbb{R}^n$  im Sinne der linearen Algebra:

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i=1}^n x_i y_i p_i = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle.$$

(Tatsächlich ist diese Intuition auch für allgemeine Zufallsvariablen tragfähig, man braucht dann nur etwas Maßtheorie und statt über lineare Algebra, redet man über Maßtheorie.) Entsprechend können wir uns  $\sqrt{\mathbb{E}[X^2]}$  als eine Art ‘Norm’ oder ‘Länge’ der Zufallsvariable vorstellen.

Im letzten Abschnitt haben wir schon begonnen über eine Zufallsvariable  $X$  nachzudenken, ist sie in einen systematischen Anteil  $\mu = \mathbb{E}[X]$  und einen unsystematischen, stochastischen Fehler, nämlich gerade  $X - \mathbb{E}[X]$ , zu zerlegen.

Im Sinne der obigen geometrischen Interpretation ist die Standardabweichung

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var } X}$$

dann gerade die Norm des unsystematischen Anteils.

Die fundamentale Folgerung aus Satz 3.35 ist nun, dass Unabhängigkeit von Zufallsvariablen die Orthogonalität der unsystematischen Anteile impliziert:

**Korollar 3.36.** *Seien  $X, Y$  unabhängig,  $\mathbb{E}[X^2], \mathbb{E}[Y^2] < \infty$ . Dann gilt*

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = 0.$$

*Beweis.*  $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0.$   $\square$

Sobald man auf eine Orthogonalitätsrelation trifft, sollte man an den Satz von Pythagoras denken:

**Satz 3.37.** *Seien  $X, Y$  unabhängige Zufallsvariable. Dann gilt*

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

*Beweis.* Wir können oBdA annehmen, dass  $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$ . Dann erhalten wir

$$\mathbb{E}[(X + Y)^2] = \mathbb{E}[X^2 + 2XY + Y^2] = \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[Y^2].$$

$\square$

Natürlich gilt ganz analog auch:

**Satz 3.38.** *Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängige Zufallsvariablen. Dann gilt*

$$\text{Var}(X_1 + \dots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n).$$

**Beispiel 3.39.** Sei  $X_i \sim B(1, p)$ ,  $i \leq n$ , und  $Z = X_1 + \dots + X_n \sim B(n, p)$ . Dann gilt ja (wie schon oben bemerkt)  $\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{E}[X_i^2] = p$  und damit  $\text{Var}[X_i] = p - p^2 = p(1 - p)$ . Wir folgern nun  $\text{Var}[Z] = np(1 - p)$ .


**Korollar 3.40.** *Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert  $\mu$  und Standardabweichung  $\sigma$ . Dann gilt*

$$\text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \text{Var}(X_i).$$

Das heißt, die Zufallsvariable

$$\bar{X}_n := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

hat Erwartungswert  $\mu$  und Standardabweichung  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ .



**Abbildung 5:** Typische Realisierungen von unkorrelierte, positiv korrelierte, und negativ korrelierte Zufallsvariablen.

### 3.10 Kovarianz und Korrelation

Eine Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras ist der Kosinussatz. Er entspricht dem Sachverhalt, dass der Winkel  $\alpha$  zwischen zwei Vektoren  $\vec{x}, \vec{y}$  durch

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle}{|\vec{x}| \cdot |\vec{y}|}$$

gegeben ist.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie interessieren wir uns insbesondere für den Winkel zwischen den unsystematischen Anteilen von Zufallsvariablen. Dementsprechend definieren wir

**Definition 3.41.** Seien  $X, Y$  Zufallsvariablen mit  $\mathbb{E}[X^2], \mathbb{E}[Y^2] < \infty$ . Die Kovarianz von  $X, Y$  ist gegeben durch

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Falls  $\text{Var}[X], \text{Var}[Y] > 0$ , ist die Korrelation von  $X, Y$  definiert als

$$\text{cor}(X, Y) = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\text{Var}[X]\text{Var}[Y]}}.$$

Die Kovarianz steht also für das innere Produkt zwischen den unsystematischen Anteilen von  $X$  und  $Y$ , die Korrelation von  $X$  und  $Y$  repräsentiert den Winkel zwischen  $X$  und  $Y$ .

Sind  $X, Y$  unabhängig, so gilt  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ , man sagt  $X, Y$  sind *unkorreliert*. Die Umkehrung gilt natürlich nicht. Überzeugen Sie sich selbst davon indem Sie wenigstens zwei Beispiele von unkorrelierten Zufallsvariablen finden die nicht unabhängig sind.

Wenn  $\text{Cov}(X, Y) > 0$  sagt man dass  $X, Y$  *positiv korreliert* sind. Weil  $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$  wissen wir, dass dies der Fall ist, wenn  $X$  und  $Y$  eher zusammen größer als ihre Erwartungswerte, und eher zusammen kleiner als ihre Erwartungswerte sind.

Wir zählen ein paar einfache Eigenschaften der Covarianz auf:

1. Für  $c \in \mathbb{R}$  gilt

$$\text{Cov}(X, c) = 0, \quad \text{Cov}(X + c, Y) = \text{Cov}(X, Y).$$

2.  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ .
3.  $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$ .
4.  $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$ .
5.  $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + \text{Var}(Y)$ .

In der Geometrie ist der Kosinus jedes Winkels betragsmäßig höchstens 1, bzw. ist das innere Produkt von zwei Vektoren (betragsmäßig) höchstens gleich dem Produkt der Längen dieser Vektoren, d.h.  $|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq |\vec{x}| \cdot |\vec{y}|$ . Die Entsprechung in unserem Kontext ist die *Cauchy-Schwarz Ungleichung*:

**Satz 3.42.** *Seien  $X, Y$  Zufallsvariablen. Dann gilt*

$$E[XY]^2 \leq E[X^2]E[Y^2].$$

*Gleichheit gilt genau dann wenn  $X, Y$  kollinear sind.*

*Beweis.* Sei oBdA  $E[Y^2] > 0$ . Wir setzen

$$W = X - Y \frac{E[XY]}{E[Y^2]}.$$

Dann gilt

$$0 \leq E[W^2] = E[X^2] - 2 \frac{E[XY]^2}{E[Y^2]} + \frac{E[XY]^2}{E[Y^2]}.$$

Daraus folgt die Aussage unmittelbar. □

Als Konsequenz erhalten wir unmittelbar

**Korollar 3.43.** *Seien  $X, Y$  Zufallsvariablen. Dann gilt*

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y)^2 &\leq \text{Var}(X) \text{Var}(Y) \\ |\text{cor}(X, Y)| &\leq 1. \end{aligned}$$

*Gleichheit gilt jeweils genau dann wenn  $X - E(X)$  und  $Y - E(Y)$  kollinear sind.*

Wir schließen diesen Abschnitt mit zwei Bemerkungen.

1. Die Sätze des vorigen Kapitels 3.9 gelten natürlich nicht nur für unabhängige Zufallsvariablen, sondern allgemeiner auch für unkorrelierte Zufallsvariablen.
2. Unabhängigkeit ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein omnipräsentes Konzept. Dementsprechend oft treten auch unkorrelierte Größen auf.

### 3.11 Zusammenfassung des Kapitels

Am Ende des Kapitels sollten Sie vertraut sein mit:

- Verteilung einer Zufallsvariable;
- Wahrscheinlichkeitsfunktion (WF) einer diskreten Zufallsvariablen;
- wichtige Verteilungen: Bernoulli-, Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung;
- der Poissonapproximation der Binomialverteilung;
- dem Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen, und wie kann man ihn über die WF berechnen kann;
- Varianz einer Zufallsvariable;
- Unabhängigkeit von Zufallsvariablen, Additivität der Varianz einer Summe von unabhängige Zufallsvariablen;
- Cauchy–Schwarz Ungleichung.

## 4 Ungleichungen und Abweichungen

In diesem Kapitel sehen wir einige wichtige Ungleichungen über Erwartungswerte einer Funktion einer Zufallsvariablen. Wir verwenden diese Ungleichungen um:

- Die Abweichungen der Zufallsvariable zu kontrollieren (Markov-, Chebyshev-Ungleichungen);
- den Begriff der Entropie zu formulieren und sich diesem Begriff zu nähern (durch die Jensen'sche Ungleichung)
- um das (schwache) Gesetz der Großen Zahlen zu beweisen.

### 4.1 Jensen'sche Ungleichung

Wir beginnen mit der Jensen'schen Ungleichung, in der es um konvexe Funktionen geht. Erinnern Sie sich, dass eine Funktion  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  konvex ist, wenn für alle  $x, y \in (a, b)$  es gilt:

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y); \quad \lambda \in [0, 1]. \quad (4.1)$$

Das heißt, der Funktionswert des Durchschnittes von  $x, y$  ist kleiner gleich der Durchschnitt der Funktionswerte von  $x$  und  $y$ . Wenn  $f$  von Klasse  $C^2$  über  $(a, b)$  ist, dann ist (4.1) äquivalent zu  $f'' \geq 0$ . Zum Beispiel sind  $f(x) = x^2, x^4, e^x$  konvexe Funktionen.

Wir können (4.1) auch als eine Ungleichung zwischen Erwartungswerten interpretieren. Sei  $X$  eine Zufallsvariable gleich  $x$  mit Wahrscheinlichkeit  $\lambda$  und gleich  $y$  mit Wahrscheinlichkeit  $1 - \lambda$ . Dann ist (4.1) äquivalent zu

$$f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X))$$

(wegen Proposition 3.24).

Diese Tatsache gilt in großer Allgemeinheit:

**Satz 4.1** (Jensen'sche Ungleichung.). *Sei  $f$  eine konvexe Funktion und sei  $X$  eine Zufallsvariable. Dann gilt*

$$f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X)). \quad (4.2)$$


*Gleichheit gilt genau dann wenn  $f$  fast sicher (bez. der Verteilung von  $X$ ) affin ist.*

Ist  $f$  strikt konvex, so gilt die Gleichheit in der Jensen'schen Ungleichung nur für konstantes  $X$ .

*Beweis von Satz 4.1.* Wir schreiben  $f'$  für die Rechtsableitung der Funktion  $f$ . Dann gilt für alle  $\omega \in \Omega$ .

$$f(\mathbb{E}X) + f'(\mathbb{E}X)(X(\omega) - \mathbb{E}X) \leq f(X(\omega)).$$

Indem wir auf beiden Seiten den Erwartungswert anwenden erhalten wir die Ungleichung.  $\square$



**Beispiel 4.2.** Für eine Zufallsvariable  $X$  gilt:

$$\mathbb{E}(X)^2 \leq \mathbb{E}(X^2). \quad (4.3)$$

Wir erhalten (4.3) direkt aus Satz 4.1, wobei  $f(x) = x^2$  (konvex) setze. (4.3) folgt auch aus folgender Bemerkung:

$$\mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \text{Var}(X) = \mathbb{E}((X - \mu)^2) \geq 0$$

wobei  $\mu = \mathbb{E}(X)$ . (Siehe Proposition 3.28).

Allgemeiner erhalten wir:

**Korollar 4.3.** Sei  $X \geq 0$  eine Zufallsvariable, und seien  $0 < p < q$ . Dann gilt

$$\mathbb{E}(X^p) \leq \mathbb{E}(X^q)^{p/q}.$$

*Insbesondere:*


$$\mathbb{E}(X^q) < \infty \implies \mathbb{E}(X^p) < \infty.$$

*Beweis.* Wir verwenden Satz 4.1 mit  $f(x) = x^\alpha$  wobei  $\alpha = q/p > 1$  für  $x \geq 0$ : dann gilt  $f''(x) = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2} \geq 0$  für  $x > 0$ , d.h.  $f$  ist konvex.  $\square$

Wir sagen, dass  $X \in L^p = L^p(\mathbb{P})$  wenn  $\mathbb{E}(|X|^p) < \infty$ . Korollar 4.3 kann auch wie folgt ausgedrückt werden:  $L^p \supset L^q$  wenn  $p < q$ .

**Beispiel 4.4.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{\zeta(s)k^s}; \quad k \geq 1$$



**Abbildung 6:** Ludwig Boltzmann und Claude Shannon

wobei  $s > 1$  und  $\zeta(s)$  die Riemann'sche Funktion ist. Für welches  $p > 0$  gilt  $X \in L^p$ ?

Bemerken Sie, dass

$$\mathbb{E}(X^p) = \frac{1}{\zeta(s)} \sum_{k \geq 1} k^p \frac{1}{k^s}$$

Die Reihe ist endlich genau dann, wenn  $p - s < -1$ . Das heißt,  $X \in L^p \iff p < s - 1$ .  $\square$

Sei

$$p_{\max} = \sup\{p > 0 : X \in L^p(\mathbb{P})\}. \quad (4.4)$$

Allgemein werden wir später sehen, dass  $p_{\max}$  der Geschwindigkeit, mit der die Wahrscheinlichkeitsfunktion im Unendlichen abfällt entspricht.

## 4.2 Entropie einer Zufallsvariable

Eine guter Artikel zur Bedeutung der Entropie in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist zum Beispiel [2].

Der Begriff der Entropie wurde von Ludwig Boltzmann (1844–1906) eingeführt. Heuristisch beschreibt die Entropie, wie ungeordnet ein physikalisches System ist. Die Entropie eines Systems ist eine messbare Größe, und ist zentral für den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Dieser besagt, dass die Entropie von isolierten Systemen, die der spontanen Evolution überlassen werden, nicht mit der Zeit abnehmen kann. Dies ist ein Grundprinzip der **statistischen Mechanik**, heute ein wichtiger Zweig der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Im Jahr 1948 entwickelte der Bell-Labs-Wissenschaftler Claude Shannon ein ähnliches statistisches Konzept. Dies misst die Unsicherheit, die mit einer Zufallsvariable verbunden ist. Der Ursprung des Namens scheint von John von Neumann vorgeschlagen worden zu sein und wird durch die folgende wunderbare Anekdote erklärt:

*My greatest concern was what to call it. I thought of calling it 'information', but the word was overly used, so I decided to call it 'uncertainty'. When I discussed it with John von*

*Neumann, he had a better idea. Von Neumann told me, ‘You should call it entropy, for two reasons: In the first place your uncertainty function has been used in statistical mechanics under that name, so it already has a name. In the second place, and more important, nobody knows what entropy really is, so in a debate you will always have the advantage.*

Um die Unsicherheit einer Zufallsvariable zu messen ist es zuerst notwendig, die folgende einfachere Situation zu überlegen. Sei  $A$  ein Ereignis von dem wir wissen, dass  $\mathbb{P}(A) = p$  (z.B. die  $\mathbb{P}(\text{Würfel zeigt } 6) = 1/6$ ). Wie überrascht sind wir, wenn wir feststellen, dass  $A$  eintritt? (Also, wie überrascht sind wir, wenn eine 6 geworfen wird.)

Wir führen eine Funktion  $S = S(p)$  ein (vielleicht kommt  $S$  vom englischen Wort “surprise”). Wir möchten, dass die Funktion die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Da ein sicheres Ereignis nicht überraschend ist,  $S(1) = 0$
- $S(p)$  ist eine fallende Funktion (je kleiner  $p$ , desto überraschender ist das Eintreten von  $A$ )
- Wenn  $A$  zweimal unabhängig eintritt, dann sind wir zweimal überrascht. Genauer gesagt,  $S(pq) = S(p) + S(q)$ .

Es gibt eine eindeutige Lösung  $S$  die diesen Anforderungen genügt,  $S(p) = -c \log p$ . Als Konvention nehmen wir  $c = 1/\log 2$ , sodass

$$S(p) = -\log_2 p.$$

$S(p)$  ist also auch die Anzahl der Binärziffern die wir brauchen um  $p$  zu approximieren (die Anzahl der 0en am Anfang der Binärentwicklung von  $p$ ).

**Definition 4.5.** Sei  $X$  eine diskrete Zufallsvariable mit  $WF p(x), x \in \mathcal{W}$ . Die Entropie oder Shannon-Entropie von  $X$ , bez.  $\mathcal{L}_X$ , ist die Größe

$$H(X) = H(\mathcal{L}_X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x).$$

Beobachten Sie, dass  $H(X) = \mathbb{E}(S(p(X)))$ , sodass  $H(X)$  misst, wie überraschend das Eintreten von  $X$  durchschnittlich ist. Das heißt,  $H(X)$  ist eher groß, wenn die Werte die  $X$  annimmt eher unwahrscheinlich sind.

**Beispiel 4.6.** Sei  $X$  eine diskrete Zufallsvariable und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine beliebige Funktion. Sei  $Y = f(X)$ . Dann  $H(Y) \leq H(X)$ . (Übung!)

**Proposition 4.7.** Sei  $X$  eine diskrete Zufallsvariable mit Werten in  $\mathcal{W} = \{x_1, \dots, x_n\}$ . Dann gilt

$$H(X) \leq \log_2 n.$$

Diese obere Schranke wird genau dann erreicht, wenn  $X$  gleichverteilt auf  $\mathcal{W}$  ist.

*Beweis.* Sei  $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$ , und ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir  $p_i > 0$  an. Weil  $h(x) = x \lg_2 x$  konvex ist, gilt mit Jensen

$$\sum_{i \leq n} h(p_i) \frac{1}{n} \geq h\left(\sum_{i \leq n} p_i \frac{1}{n}\right).$$

Daraus folgt die Behauptung unmittelbar.  $\square$

**Bemerkung 4.8** (Entropie als Maß für Informationsgehalt.). Angenommen eine (faire) Münze  $X$  wird einmal pro Sekunde geworfen. Um diese Information von einem Sender zu einem Empfänger zu übertragen, benötigt man einen Kanal der mit einer Kapazität von *einem bit pro Sekunde* übertragen kann.

Falls eine sehr unfaire Münze  $X$  (sagen wir  $p = 0.01$ ) geworfen wird, können wir die zugehörige Information effizienter übertragen. Zum Beispiel könnten wir stets nur übertragen wieviele 0en zwischen je zwei 1ern geworfen werden. Wenn man bereit ist, eine bestimmte Verzögerung zu akzeptieren, genügt also ein Kanal mit deutlich geringerer Kapazität.

Shannon's "fundamental theorem for a noiseless channel" besagt, dass die nötige Kapazität des Kanals gerade  $H(X)$  ist. Dieses Resultat gilt allgemeiner für diskrete Zufallsvariablen. Auch die Unabhängigkeit der einzelnen Würfel kann durch allgemeiner Voraussetzungen ersetzt werden.

Neben der Shannon-Entropie, betrachtet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie auch oft:

**Definition 4.9.** Seien  $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$  Wahrscheinlichkeitsmaße. Dann ist die relative Entropie oder Kullback-Leibler-Divergenz definiert durch

$$H(\mathbb{Q}|\mathbb{P}) := \begin{cases} \infty & \mathbb{Q} \not\ll \mathbb{P} \\ \int \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \log \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} & \text{else.} \end{cases}$$

1. Es gilt stets  $H(\mathbb{Q}|\mathbb{P}) \geq 0$ , wobei Gleichheit genau für  $\mathbb{P} = \mathbb{Q}$  gilt. Der Beweis ist analog zu Proposition 4.7 (Übung). Die relative Entropie wird daher oft als Maß für die Abweichung von  $\mathbb{Q}$  zu  $\mathbb{P}$  interpretiert. (Es ist wichtig im Auge zu behalten, dass  $H(\mathbb{Q}|\mathbb{P})$  im allgemeinen nicht symmetrisch in  $\mathbb{P}, \mathbb{Q}$  ist, insbesondere ist  $H$  keine Metrik.)
2. Falls  $\mathbb{P} = \sum_{i \leq n} p_i \delta_{x_i}, \mathbb{Q} = \sum_{i \leq n} q_i \delta_{x_i}$ , so gilt

$$H(\mathbb{Q}|\mathbb{P}) = \sum_{i \leq n} q_i \log(q_i/p_i) = \sum_{i \leq n} q_i \log(1/p_i) - \sum_{i \leq n} q_i \log(1/q_i) = H(\mathbb{Q}, \mathbb{P}) - H(\mathbb{Q}).$$

Hier bezeichnet  $H(\mathbb{Q}, \mathbb{P}) := \sum_{i \leq n} q_i \log(1/p_i)$  die *Kreuzentropie*.

Wir haben oben schon angemerkt, dass die Shannon-entropie  $H(\mathbb{Q})$  die notwendige Kapazität ist um ein  $\mathbb{Q}$ -Signal mit einem  $\mathbb{Q}$ -optimalen Code zu übertragen. Im Gegensatz dazu, ist  $H(\mathbb{Q}, \mathbb{P})$  die notwendige Kapazität, die man braucht um ein  $\mathbb{Q}$ -Signal mit einem auf  $\mathbb{P}$  optimierten Code zu übertragen. (Das folgt aus dem Satz von Kraft-McMillan.)

Die relative Entropie entspricht daher die extra Kapazität, die ein Kanal benötigt, falls der Code auf ein anderes Signal optimiert wurde.

### 4.3 Markov'sche Ungleichung

**Satz 4.10.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit  $\mathbb{E}[|X|] < \infty$  und  $a > 0$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{a}.$$

*Beweis.* Offenbar gilt  $I_{\{|X| \geq a\}} \leq |X|/a$  und daraus folgt

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{E}[I_{\{|X| \geq a\}}] \leq \mathbb{E}[|X|/a] = \frac{\mathbb{E}[|X|]}{a}.$$

□

Zum Beispiel, wenn  $X \geq 0$ ,  $\mathbb{P}(X \geq 100\mu) \leq 1\%$ .

**Beispiel 4.11.** Nehmen wir an, dass  $X \in L^p$ . Dann für jedes  $t > 0$  gilt

$$\mathbb{P}(|X| > t) \leq \mathbb{E}[|X|^p]/t^p.$$

Deshalb abfällt  $\mathbb{P}(X > t)$  mindestens so schnell wie  $\text{Konst.} \times t^{-p}$ . Das ist ein Grund, warum das  $p_{\max}$  von (4.4) hat etwas zu tun mit der Geschwindigkeit, mit der die Wahrscheinlichkeitsfunktion im Unendlichen abfällt.

### 4.4 Chebyshev'sche Ungleichung

**Satz 4.12.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable und  $\varepsilon > 0$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[X^2]}{\varepsilon^2}.$$

*Beweis.* Genau wie bei der Markov'schen Ungleichung. (Alternativ kann man die Markov'sche Ungleichung direkt verwenden auf  $X^2$ , weil  $\mathbb{P}(|X| > \varepsilon) = \mathbb{P}(X^2 > \varepsilon^2)$ .) □

Es lohnt sich eine Folgerung im Kopf zu behalten: Falls  $\mu = \mathbb{E}[X]$ , dann gilt

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

Die folgende Form dieser Ungleichung ist besonders beachtenswert:

$$\mathbb{P}(|X - \mu| > k\sigma) \leq 1/k^2. \tag{4.5}$$

Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass  $X$  mehr als  $k$  Standardabweichungen von seinem Erwartungswert entfernt ist, ist kleiner als  $1/k^2$ . Zum Beispiel ist  $X$  mit Wahrscheinlichkeit mindestens 96% näher von  $\mu$  als  $5\sigma$  – dass ist immer Wahr!

Manchmal ist die Verteilung von  $X$  uns bekannt; in diesem Fall können wir oft präzisere Schätzungen erhalten. Aber (4.5) gilt in jedem Fall (unter der Annahme, dass  $\text{Var}(X) < \infty$  i.e.  $X \in L^2$ ). Obwohl einfach, ist es deshalb eine mächtige Schranke, wie wir sofort sehen werden.

## 4.5 Schwaches Gesetz der großen Zahlen

**Satz 4.13** ( $L^2$ -Gesetz der großen Zahlen). Sei  $X_1, X_2, \dots$  eine Folge von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit Mittel  $\mu$  und Varianz  $\sigma^2$ . Setze

$$\bar{X}_n := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}.$$

Dann gilt

$$\mathbb{E}[(\bar{X}_n - \mu)^2] = \sigma^2/n$$

und insbesondere

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(\bar{X}_n - \mu)^2] = 0.$$

*Beweis.* Es gilt (nach Pythagoras)

$$\mathbb{E}[(\bar{X}_n - \mu)^2] = \text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{\text{Var}(X_1 + \dots + X_n)}{n^2} = \frac{n \text{Var}(X_1)}{n^2}.$$

□

Mittels der Chebyshev'schen Ungleichung erhalten wir daraus unmittelbar:

**Satz 4.14** (Schwaches Gesetz großen Zahlen). Sei  $X_1, X_2, \dots$  eine Folge von unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit Mittel  $\mu$  und Varianz  $\sigma^2$ . Setze wieder

$$\bar{X}_n := \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$$

Dann gilt für alle  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon] = 0. \quad (4.6)$$

*Beweis.* Nach der Markov'schen Ungleichung (oder der Chebyshev'schen Ungleichung) gilt für  $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}[|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon] \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2) \rightarrow 0.$$

□

Beispiele: Wenn wir einen Würfel immer wieder werfen, sehen wir im Schnitt 3.5 Augen. Wenn wir eine faire Münze immer wieder werfen kommen ungefähr 50% Köpfe.

Bemerkungen:

1. Wie schon früher angemerkt, liefert uns das (schwache) Gesetz großer Zahlen den Zusammenhang von unserem axiomatischen Zugang zu einer frequentistischen Sichtweise auf die Wahrscheinlichkeitstheorie: Sei  $A$  ein Ereignis mit  $p = \mathbb{P}(A)$ , wir stellen uns vor dass ein Experiment einen bestimmten positiven Ausgang hat (die Münze zeigt

Kopf oder so). Wir bezeichnen weiter mit  $A_1, A_2, \dots$  unabhängige Wiederholungen des Experiments und schreiben

$$N(A) := I_{A_1} + \dots + I_{A_N}$$

für die Anzahl der positiven Ausgänge innerhalb der ersten  $N$  Experimente.

Nach dem Gesetz großer Zahlen gilt dann

$$\mathbb{P} \left( \left| \frac{N(A)}{N} - p \right| \geq \varepsilon \right) \rightarrow 0, \quad (4.7)$$

d.h. der Anteil positiven Ausgänge nähert sich genau der Wahrscheinlichkeit von  $A$  an.

*Beweis von (4.7).* Es gilt  $p = \mathbb{E}[I_A]$  und daher

$$\mathbb{P} \left( \left| \frac{N(A)}{N} - p \right| \geq \varepsilon \right) = \mathbb{P} \left( \left| \frac{I_{A_1} + \dots + I_{A_N}}{N} - p \right| \geq \varepsilon \right) \rightarrow 0.$$

□

2. Anstelle von Unabhängigkeit könnten wir auch Unkorreliertheit fordern. Es ist auch nicht wesentlich, dass alle Zufallsvariablen die selbe Verteilung haben, es reicht, dass die Erwartungswerte und Varianzen übereinstimmen (oder zumindest konvergieren).
3. Komplette weglassen können wir die Voraussetzung der Unabhängigkeit nicht: Das sieht man leicht indem man z.B. den Fall  $X_1 = X_2 = \dots$  betrachtet.
4. Die Konvergenzart in (4.6) heisst ‘Konvergenz in Wahrscheinlichkeit’, man spricht auch davon, dass die Verteilungen von  $X_n, n \geq 1$  ‘schwach’ gegen den Mittelwert konvergieren.

Im Gegensatz zum ‘schwachen’ Gesetz großer Zahlen spricht man von einem ‘starken’ Gesetz großer Zahlen wenn die Konklusion statt (4.6), ist dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n(\omega) = \mu \quad (4.8)$$

für alle  $\omega$  aus einer Menge  $\tilde{\Omega}$  mit  $\mathbb{P}(\tilde{\Omega}) = 1$ . Starke Konvergenz im Sinne von (4.8) impliziert schwache Konvergenz im Sinne von (4.6). (Übung?) Wenn man sich etwas mehr bemüht als wir das getan haben, kann man in der Situation von (4.14) auch starke Konvergenz zeigen. Dafür reicht es sogar vorauszusetzen, dass  $\mathbb{E}[X_i]$  existiert, die Varianz braucht nicht endlich zu sein. (*Das ‘starke Gesetz großer Zahlen’.*)

5. Ein grundlegender Satz in der Theorie dynamischer Systeme ist der *Ergodensatz* der eine Verallgemeinerung des starken Gesetzes großer Zahlen darstellt, er wird dort im Sinne von *Raummittel = Zeitmittel* interpretiert.

## 5 Bedingte Erwartung und Martingale

In diesem Kapitel lehnen wir uns oft an das Buch [4] von Williams an.

### 5.1 Bedingte Verteilung

Seien  $X, Y$  diskrete Zufallsvariablen die auf dem selben Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind. Wir denken insbesondere an den Fall, dass  $X$  und  $Y$  nicht unabhängig sind. Die *gemeinsame Verteilung* besteht dann aus den Werten

$$p_{xy} = p_{(X,Y)}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

wobei  $x, y$  in den jeweiligen Wertebereichen  $\mathcal{W}_X$  und  $\mathcal{W}_Y$  liegen. Diese Verteilung ist nicht anderes als die Verteilung des Vektors  $(X, Y)$ , der auch eine diskrete Zufallsvariable (mit Werte in  $\mathcal{W}_X \times \mathcal{W}_Y$ ) ist.

In diesem Kontext bezeichnet man die Verteilung von  $X$

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in \mathcal{W}_Y} p_{xy}$$

auch als *Randverteilung* oder *Marginalverteilung* von  $X$ .

Wenn wir  $y \in \mathcal{W}_Y$  fixieren, betrachten wir auch die *bedingte Verteilung von  $X$  gegeben  $Y = y$* , i.Z.  $\mathbb{P}(X = \cdot | Y = y) = p_{\cdot|y}$ :

$$p_{x|y} := p_{x|Y=y} := \mathbb{P}(X = x | Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)} = \frac{p_{xy}}{p_Y(y)}.$$

Bemerkungen:

1. Offenbar erhält man die Randverteilung als entsprechend gewichtete Summe der bedingten Verteilungen:

$$p_X(x) = \sum_{y \in \mathcal{W}_Y} p_{x|y} p_Y(y).$$

2. Wenn  $X, Y$  unabhängig sind, dann ist für jedes  $y \in \mathcal{W}_Y$  die bedingte Verteilung von  $X$  gegeben  $Y = y$  gleich der Randverteilung von  $X$ . Die Umkehrung gilt auch, wie man sich leicht überlegt:

**Proposition 5.1.**  *$X$  und  $Y$  sind unabhängig genau dann, wenn  $p_{xy} = p_X(x)p_Y(y)$ , und auch genau dann, wenn  $p_{x|y} = p_X(x)$  für jedes  $x \in \mathcal{W}_X, y \in \mathcal{W}_Y$ .*

**Beispiel 5.2.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig  $B(1, p)$  verteilte Zufallsvariablen, und sei  $Y = X_1 + \dots + X_n$ . Was ist die bedingte Verteilung von  $X_1$ , gegeben  $Y = k$  (wobei  $0 \leq k \leq n$ )?

Natürlich kann  $X_1$  nur gleich 0 oder 1 sein, auch gegeben  $Y = k$ . Deshalb ist die bedingte Verteilung auch Bernoulli. Aber was ist der Parameter? Ist er noch  $p$  oder ist er etwas anderes unter der Annahme, dass  $Y = k$ ? Wir berechnen:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 = 1|Y = k) &= \frac{\mathbb{P}(X_1 = 1; X_2 + \dots + X_n = k - 1)}{\mathbb{P}(Y = k)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(X_1 = 1)\mathbb{P}(X_2 + \dots + X_n = k - 1)}{\mathbb{P}(Y = k)} \\ &= \frac{p \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)}}{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}} \\ &= \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k}{n}.\end{aligned}$$

Das heißt, gegeben  $Y = k$  ist die bedingte Verteilung von  $X_1$  eine Bernoulli Verteilung mit Parameter  $p' = k/n$ .

**Beispiel 5.3.** Nehmen wir an, dass die Anzahl  $Y$  der Tippfehler auf einer Seite Poisson( $\lambda$ ) verteilt ist, und Tippfehler unabhängig von einander mit Wahrscheinlichkeit  $p$  gefunden werden. Was ist die bedingte Verteilung von  $X$  gegeben  $Y$ ? Was ist die gemeinsame Verteilung von  $X$  und  $Y$ ? Was ist die gemeinsame Verteilung von  $X$  und  $Y - X$  (die Anzahl der Tippfehler die nicht gefunden werden)? Was sind die Randverteilungen von  $X$  und  $Y$ ?

In diesem Beispiel ist tatsächlich die bedingte Verteilung von  $X$  gegeben  $Y$  gegeben (und natürlich auch die Verteilung von  $Y$ ). Das heißt, die Annahme ist

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = n) &= e^{-\lambda} \lambda^n / n! \\ \mathbb{P}(X = k|Y = n) &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.\end{aligned}$$

Wir können von dieser Annahme die gemeinsame Verteilung von  $X$  und  $Y$  einfach berechnen:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k, Y = n) &= \mathbb{P}(Y = n)\mathbb{P}(X = k|Y = n) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^n p^k (1-p)^{n-k}}{k!(n-k)!}; 0 \leq k \leq n.\end{aligned}$$

Die gemeinsame Verteilung von  $X$  und  $Z = Y - X$  folgt sofort:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k, Z = m) &= \mathbb{P}(X = k, Y = k + m) \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+m} p^k (1-p)^m}{k!m!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \times e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^m}{m!}\end{aligned}$$

und deshalb sind  $X$  und  $Z$  unabhängig und Poisson verteilt mit Parametern  $\lambda p$  und  $\lambda(1-p)$ !

Um dieses Ergebnis zu würdigen, betrachten Sie  $\lambda = 100, p = 1/2$  (sodass ich ungefähr die Hälfte aller Fehler finde). Falls ich 200 Fehler auf einer Seite finde, wie viele Fehler sind eigentlich insgesamt auf der Seite? Vielleicht 400? Aus der vorherigen Berechnung erhalten wir, dass die unentdeckten Tippfehler unabhängig von denen sind, die wir gefunden haben. Deshalb erwarten wir insgesamt ungefähr 250.

## 5.2 Bedingte Erwartung

Die *bedingte Erwartung von  $X$  gegeben  $Y = y$*  ist definiert als der Erwartungswert der bedingten Verteilung  $\mathbb{P}(X = \cdot | Y = y)$ , d.h.

$$\mathbb{E}[X|Y = y] = \sum_{x \in \mathcal{W}_X} x p_{x|y} = \frac{\mathbb{E}[X 1_{\{Y=y\}}]}{\mathbb{P}(Y = y)}.$$

**Beispiel 5.4.** Im Beispiel 5.3 gilt  $\mathbb{E}(X|Y = n) = np$ ,  $\mathbb{E}(Z|X = k) = \mathbb{E}(Z) = \lambda(1-p)$ ,  $\mathbb{E}(Y|X = k) = k + \lambda(1-p)$ .

Im Fall, dass die Zufallsvariablen unabhängig sind, erhalten wir:

**Proposition 5.5.** Wenn  $X$  und  $Y$  unabhängig sind, dann gilt  $\mathbb{E}(X|Y = y) = \mathbb{E}(X)$  und  $\mathbb{E}(Y|X = x) = \mathbb{E}(Y)$ .

Normalerweise ist der Erwartungswert von  $X$  eine bestimmte (d.h., nicht zufällige) Größe. Das gilt auch wenn wir auf  $Y = y$  bedingen. Aber hier kommt eine grundlegender (obwohl am Anfang sehr verwirrender) Gedanke der Wahrscheinlichkeitstheorie ins Spiel: Nehmen wir an, dass ein Beobachter den Wert von  $Y = Y(\omega)$  feststellt und nichts anderes. Was ist seine Vermutung für  $X$ ? Natürlich ist sie  $\mathbb{E}(X|Y = y)$  für den beobachteten Wert von  $Y(\omega) = y$ . Aber dieser Wert hängt vom Ereignis  $\omega$  ab. Das heißt, wir sollten  $\mathbb{E}(X|Y = y)$  als eine Zufallsvariable sehen, wobei wir  $y = Y(\omega)$  einsetzen!

**Definition 5.6.** Der *bedingte Erwartungswert  $\mathbb{E}(X|Y)$*  ist die Zufallsvariable, die den Wert  $\mathbb{E}(X|Y = y)$  nimmt, wenn  $Y(\omega) = y$ . Das heißt,


$$\mathbb{E}(X|Y) = \sum_y \mathbb{E}(X|Y = y) 1_{\{Y=y\}}.$$

Sei  $\mathcal{G} = \sigma(A_1, A_2, \dots)$  wobei  $A_1, A_2, \dots$  eine endliche oder abzählbare Partition von  $\Omega$  in Mengen mit positiver Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Dann definieren wir

$$\mathbb{E}(X|\mathcal{G}) := \sum_i 1_{A_i} \mathbb{E}(X|A_i).$$

Offenbar gilt dann  $\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(X|\sigma(Y))$ .

Wenn wir  $\mathbb{E}(X|Y)$  berechnen, nehmen wir einen Durchschnitt nur über die Zufälligkeit von  $X$ , während wir so tun, als ob  $Y$  bekannt und fest wäre. Das ist eine sehr praktische



**Abbildung 7:** In diesem Bild sehen wir eine Zufallsvariable  $X$  als eine Funktion auf dem Grundraum  $\Omega$ . Die bedingte Erwartung  $\mathbb{E}(X|Y)$  ist der Mittelwert von  $X$  über die jeweilige Menge  $\{Y = y\}$ . Die **Turmeigenschaft** (Satz 5.11) sagt, dass der Mittelwert von  $X$  auch der Mittelwert von  $\mathbb{E}(X|Y)$  ist.

und natürliche Sache, weil der Zufall oft “in Scheibchen” kommt (z.B. im Beispiel 5.3, gibt es den Zufall in der Anzahl der Tippfehler, und der Zufall in Bezug auf das Entdecken dieser Tippfehler). In diesem Fall ist es natürlich, die Scheibchen zu trennen.

**Beispiel 5.7.** Im Beispiel 5.3 ist  $\mathbb{E}(X|Y) = Yp$ , und  $\mathbb{E}(Y|X) = X + \lambda(1 - p)$ . Beachten Sie, dass beides Zufallsvariablen sind!

**Beispiel 5.8.** Im Beispiel 5.2 gilt  $\mathbb{E}(X_1|Y) = Y/n$ .

Bemerkenswerter Weise erbt die bedingte Erwartung viele Eigenschaften des gewöhnlichen Erwartungswerts, die Beweise sind jeweils nicht schwer und verwenden ähnlich Argumente, wie wir sie aus dem Fall des gewöhnlichen Erwartungswertes kennen. Insbesondere haben wir in Satz 3.23 gesehen, dass der Erwartungswert  $\mathbb{E}[X]$  die beste konstante Approximation der Zufallsvariable  $X$  ist. Im selben Sinne ist  $\mathbb{E}[X|Z]$  die beste Approximation an die Funktion  $X$  gegeben die Information aus  $Z$ :

**Satz 5.9.** Seien  $X, Z$  Zufallsvariablen und  $\mathbb{E}X^2 < \infty$ . Dann gibt es eine Funktion  $f$  die

$$\mathbb{E}[(X - f(Z))^2]$$

minimiert und für jedes solche  $f$  gilt

$$\mathbb{E}[X|Z] = f(Z).$$

Weitere Eigenschaften der bedingten Erwartung:

**Satz 5.10.** Seien  $X, Y, Z$  Zufallsvariablen. Dann gilt z.B.

1. *Linearität:*  $\mathbb{E}[aX + bY|Z] = a\mathbb{E}[X|Z] + b\mathbb{E}[Y|Z]$ .

2. Wenn  $Y$  weniger Information als  $Z$  enthält, d.h. wenn es eine Funktion mit  $Y = f(Z)$  gibt, dann gilt

$$\mathbb{E}[XY|Z] = Y\mathbb{E}[X|Z].$$

3. Sind  $X, Z$  unabhängig, dann gilt  $\mathbb{E}[X|Z] = \mathbb{E}[X]$ .

4. *Jensen'sche Ungleichung:* Sei  $f$  eine konvexe Funktion. Dann gilt

$$f(\mathbb{E}[X|Z]) \leq \mathbb{E}[f(X)|Z].$$

### 5.3 Turmeigenschaft

In 99% der Fälle verwenden wir den bedingten Erwartungswert, um einen (unbedingten) Erwartungswert zu berechnen. Der folgende wichtige Satz (die sogenannte **Turmeigenschaft**) erlaubt uns dies zu tun.

**Satz 5.11** (Turmeigenschaft). Seien  $X, Y$  (diskrete) Zufallsvariablen. Dann gilt

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)].$$

*Beweis.* Wir berechnen einfach

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\mathbb{E}(X|Y)] &= \sum_y \mathbb{P}(Y = y) \mathbb{E}(X|Y = y) \\ &= \sum_y \mathbb{P}(Y = y) \sum_x x \mathbb{P}(X = x|Y = y) \\ &= \sum_{x,y} x \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_x x \mathbb{P}(X = x) \\ &= \mathbb{E}(X), \end{aligned}$$

wie gewünscht. □

Um diesen Satz zu verstehen, machen wir ein paar Beispiele.

**Beispiel 5.12.** Fortsetzung des Beispiels 5.2.  $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X_1|Y)] = \mathbb{E}[Y/n] = np/n = p$  (das war offensichtlich!)

**Beispiel 5.13.** Berechnen Sie  $\mathbb{E}(X)$  und  $\mathbb{E}(Y)$  mit der Hilfe von Satz 5.11. Überprüfen Sie, dass es mit dem übereinstimmt, was wir schon über die Verteilung von  $X$  und  $Y$  wissen.

Ein sehr wichtiges Anwendungsbeispiel zur Turmeigenschaft:

**Satz 5.14** (Wald'scher Satz). *Nehmen wir an, dass  $X_1, X_2, \dots$ , identisch verteilt sind, und sei  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . Sei  $N$  eine unabhängige und ganzzahlige Zufallsvariable. Dann gilt*

$$\mathbb{E}(S_N) = \mathbb{E}(N)m,$$

wobei  $m = \mathbb{E}(X_1)$ .

*Beweis.* Wir bedingen auf  $N = n$ . Dann ist  $\mathbb{E}(S_N|N = n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i|N = n) = nm$ , weil  $X_i$  und  $N$  unabhängig sind. Deshalb folgt

$$\mathbb{E}(S_N) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(S_N|N)] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(N = k)\mathbb{E}(S_N|N = k) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(N = k)km = m\mathbb{E}(N),$$

wie gewünscht. □

**Beispiel 5.15.**  $N$  Personen steigen in einen Aufzug, sei  $X_i$  ihr jeweiliges Gewicht. Dann ist das erwartete Gesamtgewicht  $\mathbb{E}(T) = \mathbb{E}(N)\mathbb{E}(X_i)$ .

**Beispiel 5.16.** Eine Person A hat eine Krankheit und steckt in der ersten Periode  $X_A$  Leute an. Jede Person B die angesteckt wurde, steckt in der nächsten Periode wiederum  $X_B$  neue Personen an. Wir nehmen an, dass diese Ansteckungen unabhängig und identisch verteilt sind. Sei  $R = \mathbb{E}[X_A]$ . Dann werden in der zweiten Periode im Schnitt  $R^2$  Personen infiziert. (usw)

**Beispiel 5.17.** Hier ist eine etwas aufwändigere Anwendung. Wir werfen eine Münze mit  $\mathbb{P}(\text{Kopf}) = p$ . Sei  $N$  die Anzahl der Würfe bis wir zwei Köpfe in Folge bekommen. (z.B., in dem Fall, dass die Reihenfolge der Würfe  $ZKZZKZKZZKK$  ist, erhalten wir  $N = 11$ ). Dann beobachten Sie, dass

$$N = \sum_{i=1}^M X_i + 1 \tag{5.1}$$

wobei  $M$  und  $X_i$  unabhängige Zufallsvariablen sind. Dabei sind  $M$  und  $X_1$  geometrisch verteilte Zufallsvariable, während die Verteilung von  $X_i, i \geq 2$  eine geometrische Verteilung, bedingt auf  $X_i > 1$ , ist.

Um (5.1) zu sehen, zerlegen wir die Reihenfolge der Würfe in Stücke, die mit  $K$  enden: z.B.,

$$(ZK)(ZZK)(ZK)(ZZK)(K).$$

Dabei ist  $M$  die Anzahl der Stücke (hier  $M = 4$ ) und sind  $X_i$  ihre jeweilige Länge (hier  $X_1 = 2, X_2 = 3, X_3 = 2, X_4 = 3$ ).

Wir schließen daraus und aus dem Wald'schen Satz, dass

$$\mathbb{E}(N) = (\mathbb{E}(M) - 1)\mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_1) + 1.$$

Jetzt bemerken Sie, dass  $\mathbb{E}(M) = \mathbb{E}(X_1) = 1/p$  (Erwartungswert einer geometrischen Zufallsvariable), und  $\mathbb{E}(X_2) = 1 + 1/p$  (Übung!) Deshalb erhalten wir insgesamt

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(N) &= (1/p - 1)(1/p + 1) + 1/p + 1 \\ &= 1/p^2 - 1 + 1/p + 1 \\ &= 1/p^2 + 1/p.\end{aligned}$$

**Bemerkung 5.18.** Allgemeiner ist es möglich zu beweisen, dass wenn wir  $k$  Köpfe in Folge möchten, dann müssen wir durchschnittlich  $(1/p + 1/p^2 + \dots + 1/p^k)$  warten.

## 5.4 Bedingte Erwartung bezüglich $\sigma$ -Algebren

**Definition 5.19.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$  sodass  $\mathbb{E}|X| < \infty$  und sei  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$  eine  $\sigma$ -Algebra. Dann heißt eine Zufallsvariable  $Z$  die bedingte Erwartung von  $X$  gegeben  $\mathcal{G}$ , in Zeichen,

$$Z = \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$$

falls  $Z$   $\mathcal{G}$ -messbar ist und für alle  $G \in \mathcal{G}$  gilt, dass

$$\mathbb{E}[Z1_G] = \mathbb{E}[X1_G]. \quad (5.2)$$

**Satz 5.20.** Unter den Voraussetzung der obigen Definition existiert die bedingte Erwartung und ist f.s. eindeutig bestimmt.

*Beweis.* Wir zeigen zunächst die Eindeutigkeit: Angenommen  $Z_1, Z_2$  sind Versionen von  $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$ . Dann sind beide  $\mathcal{G}$ -messbar und erfüllen  $\mathbb{E}[(Z_1 - Z_2)1_G] = 0$  für  $G \in \mathcal{G}$ . Falls sie nicht gleich sind, gilt oBdA  $\mathbb{P}(Z_1 < Z_2) > 0$ . Dann gibt es auch  $n \in \mathbb{N}$  für dass die Menge  $G = \{Z_2 - Z_1 \geq n\} \in \mathcal{G}$  erfüllt dass  $\mathbb{P}(G) > 0$ . Aber dann folgt

$$\mathbb{E}(Z_2 - Z_1)1_G \geq \mathbb{P}(G)/n > 0$$

also können die beiden Zufallsvariablen nicht beide Versionen der bedingten Erwartung sein.

Die Existenz der bedingten Erwartung folgt schnell aus dem *Satz von Radon-Nikodym*: Wir definieren auf  $\mathcal{G}$  ein *signiertes Maß*  $\nu$  durch

$$\nu(G) := \mathbb{E}X1_G.$$

Falls  $\mathbb{P}(G) = 0$  gilt auch  $\nu(G) = \mathbb{E}X1_G = 0$ , also ist  $\nu$  absolut stetig bezüglich  $\mathbb{P}$ . Weiters gilt für alle  $G \in \mathcal{G}$  dass  $|\nu(G)| \leq \mathbb{E}|X|$ , daher ist  $\nu$  ein endliches signiertes Maß. Der Satz von Radon-Nikodym besagt daher dass es eine  $\mathcal{G}$ -messbare Funktion  $Z$  gibt die eine Dichte von  $\nu$  bezüglich  $\mathbb{P}$  ist, d.h.  $Z = d\nu/d\mathbb{P}$ . Das bedeutet aber gerade dass

$$\nu(G) = \mathbb{E}Z1_G$$

für  $G \in \mathcal{G}$ . □

Bemerkungen:

1. Wenn die Bedingung (5.2) für einen durchschnittsstabilen Erzeuger gilt, dann auch schon für die ganze  $\sigma$ -Algebra. Insbesondere passt unsere neue Definition der bedingten Erwartung zu der die wir vorher im diskreten Fall betrachtet haben.
2. Man kann wiederum zeigen, dass  $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]$  genau jene  $\mathcal{G}$ -messbare Zufallsvariable  $Z$  ist, die

$$\mathbb{E}[(X - Z)^2]$$

minimiert. Umgekehrt kann man diese Eigenschaft nutzen um ohne Verwendung von Radon-Nikodym zu zeigen, dass die bedingte Erwartung existiert.

**Satz 5.21.** *Eigenschaften der bedingten Erwartung (wir betrachten dabei jeweils Zufallsvariablen mit endlichem Erwartungswert).*

1. Für die triviale  $\sigma$ -Algebra  $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$  gilt  $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$ .
2. (Turmeigenschaft 1)  $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ .
3. Falls  $X$   $\mathcal{G}$ -messbar ist, so folgt  $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = X$ .
4. (Linearität)  $\mathbb{E}[aX + bY|\mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y|\mathcal{G}]$ .
5. (Positivität) Falls  $X \geq 0$  so gilt auch  $\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] \geq 0$ .
6. Es gelten die drei Konvergenzsätze wenn man  $\mathbb{E}[\cdot]$  durch  $\mathbb{E}[\cdot|\mathcal{G}]$  ersetzt (Lemma von Fatou, Satz von der monotonen Konvergenz, Satz von der dominierten Konvergenz).
7. Es gilt die bedingte Version der Jensenschen Ungleichung:  $f(\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[f(X)|\mathcal{G}]$  für eine konvexe Funktion  $f$ . Insbesondere gilt daher  $\|\mathbb{E}[X|\mathcal{G}]\|_2 \leq \|X\|_2$ .
8. (Turmeigenschaft 2) Falls  $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$  so gilt

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X|\mathcal{H}|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X|\mathcal{G}].$$

9. Falls  $Y$  beschränkt und  $\mathcal{G}$ -messbar ist, so gilt

$$\mathbb{E}[XY|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X|\mathcal{G}]Y.$$

10. Falls  $X$  unabhängig von  $\mathcal{G}$  ist, so gilt

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{G}] = \mathbb{E}[X].$$

*Beweis.* Die meisten Eigenschaften sind relativ einfach zu zeigen und wir lassen die Beweise aus. Interessant ist vielleicht:

9. Dieser Beweis folgt mit dem Standardtrick der Maßtheorie: für Indikatorfunktionen  $Y = 1_G$ ,  $g \in \mathcal{G}$  folgt der Satz direkt aus der Definition. Wegen Linearität gilt er dann auch für  $\mathcal{G}$ -messbare Treppenfunktionen. Dann schließt man (zB) mit dem Satz von dominierter Konvergenz.

□

## 5.5 Martingale

**Definition 5.22.** Gegeben sei Wahrscheinlichkeitsraum. Eine Filtration ist eine aufsteigende Folge von  $\sigma$ -Algebren  $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}$ . Ein stochastischer Prozess  $X = (X_n)_{n=0}^\infty$  heisst adaptiert falls  $X_n$  für alle  $n$   $\mathcal{F}_n$ -messbar ist.

Ein Prozeß  $M$  ist ein Martingal wenn für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt, dass

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] = M_n.$$

Ein Prozeß  $M$  ist ein Submartingal wenn für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt, dass

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] \geq M_n.$$

Ein Prozeß  $M$  ist ein Supermartingal wenn für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt, dass

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|\mathcal{F}_n] \leq M_n.$$

Wenn man von stochastischen Prozessen spricht, geht man fast immer stillschweigend davon aus, dass diese adaptiert sind. Falls man keine Filtration spezifiziert, geht man oft davon aus, dass die vom Prozess  $X$  erzeugte Filtration  $\mathcal{F}_n := \sigma(X_0, \dots, X_n), n \geq 0$  gemeint ist.

Mittels der Turmeigenschaft zeigt man leicht:

**Lemma 5.23.** Ein Prozeß  $M$  integrierbarer Zufallsvariablen ist ein Martingal genau dann wenn  $\mathbb{E}[M_n|\mathcal{F}_k] = M_k$  für  $n > k \geq 0$ .

Ist  $M$  ein Martingal, so gilt  $\mathbb{E}M_n = \mathbb{E}M_0$  für all  $n \in \mathbb{N}$ .

Analoge Eigenschaften gelten natürlich für Sub- und Supermartingale.

Eine weitere Konsequenz der Turmeigenschaft ist:

**Lemma 5.24.** Sei  $M$  ein Martingal bezüglich einer Filtration  $(\mathcal{F}_n)_n$ . Dann ist  $M$  auch ein Martingal bezüglich der von  $M$  erzeugten Filtration.

Wir betrachten einige Beispiele.


**Beispiel 5.25.** Als zentrales Beispiel betrachten wir die Irrfahrt auf  $\mathbb{Z}$ :

Seien  $X_1, X_2, \dots$  unabhängig und  $\mathbb{P}(X_i = 1) = p, \mathbb{P}(X_i = -1) = 1 - p =: q$ . Sei weiters

$$S_n := S_0 + X_1 + \dots + X_n,$$

wobei  $S_0 \in \mathbb{R}$  (und meistens  $S_0 = 0$ ). Als Filtration betrachten wir  $\mathcal{F}_n := \sigma(S_0, S_1, \dots, S_n)$ .

Dann heißt der Prozess  $(S_n)_{n=0}$  einfache Irrfahrt oder random walk mit Start in  $S_0$ . Im Fall  $p = q = 1/2$  sprechen wir von der symmetrischen Irrfahrt. (Diese Bezeichnungen sind allerdings nicht ganz einheitlich. Oft meint man die symmetrische Irrfahrt auch wenn man es nicht extra dazusagt.)



**Abbildung 8:** Viele Simulationen der Symmetrischen Irrfahrt

Konzeptionell interessiert uns oft das Verhalten der Pfade im Lauf der Zeit. Um eine erste Idee zu bekommen, berechnen wir Erwartungswert und Varianz. Offenbar gilt  $\mathbb{E}X_i = p - q = 2p - 1$  und  $\text{Var}(X_i) = 1 - (p - q)^2 = (p + q)^2 - (p - q)^2 = 4pq$  und daher

$$\mathbb{E}[S_n] = S_0 + n(p - q) \quad (5.3)$$

$$\text{Var}[S_n] = n4pq. \quad (5.4)$$

Die Varianz der mittleren Position hängt damit linear von  $n$  ab während die Standardabweichung in der Größenordnung von  $\sqrt{n}$  liegt.

Insbesondere gilt für die symmetrische Irrfahrt

$$\mathbb{E}[S_n] = S_0 \quad (5.5)$$

$$\text{Var}[S_n] = n. \quad (5.6)$$

Der Einfachheit halber betrachten wir den Fall  $S_0 = 0$ . Typische Fragen die man sich stellt sind: Gegeben  $a, b \in \mathbb{N}$ , erreicht die Irrfahrt  $-a$  bevor sie  $b$  erreicht? Wie lange dauert es bis das passiert? Wird die Irrfahrt stets zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehren? Wir kommen später auf diese Fragen zurück.

Eine besonders wichtige Eigenschaft der symmetrischen Irrfahrt ist, ein Martingal zu sein;

$$\mathbb{E}[S_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n + \mathbb{E}[X_{n+1}] = S_n. \quad (5.7)$$

Offenbar war hier für die Martingaleigenschaft nicht die gesamte Verteilung der  $X_n$  wichtig, sondern nur dass  $\mathbb{E}[X_n] = 0$ .

Im Fall der nicht symmetrischen Irrfahrt ist  $\mathbb{E}S_n = n(p-q)$  und entsprechend ist  $S_n$  selbst kein Martingal. Allerdings erhalten wir, dass  $M_n = S_n - (p-q)$  sehr wohl ein Martingal ist.

**Beispiel 5.26** (Doob'sches Martingal). Sei  $X$  eine integrierbare Zufallsvariable und  $(\mathcal{F}_n)_n$  eine Filtration. Dann sieht man aus der Turmeigenschaft leicht, dass

$$M_n := \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n], \quad n \geq 1$$

ein Martingal ist.

Eine Operation die uns oft zu neuen Sub- bzw. Supermartingalen führt ist das anwenden von konvexen oder konkaven Funktionen. Mittels der bedingten Version der Jensen'schen Ungleichung sieht man nämlich leicht:

**Lemma 5.27.** *Sei  $M$  ein Martingal. Ist  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  konvex und  $f(M_n), n \geq 1$  integrierbar, so ist  $(f(M_n))_n$  ein Submartingal. Ist  $M$  selbst nur ein Submartingal, so ist  $(f(M_n))_n$  jedenfalls ein Submartingal falls  $f$  monoton wachsend und konvex ist.*

Ist  $S_n$  wiederum die symmetrische Irrfahrt, so folgt, dass  $Y_n := S_n^2$  ein Submartingal definiert welches wegen  $\mathbb{E}Y_n = n$  offenbar kein Martingal ist. Wir erhalten jedoch wieder ein Martingal wenn wir den Prozess

$$M_n := S_n^2 - n$$

betrachten. Es gilt nämlich

$$\mathbb{E}[M_{n+1}|F_n] = \tag{5.8}$$

$$\mathbb{E}[(S_n + X_{n+1})^2 - n - 1|F_n] = \tag{5.9}$$

$$\mathbb{E}[S_n^2 + 2S_nX_{n+1} + X_{n+1}^2 - n - 1|F_n] = M_n. \tag{5.10}$$

Martingale spielen in vielen Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie eine große Rolle, insbesondere weil sie unser Modell für faire Spiele sind. Um das zu formalisieren führen wir den Begriff der Spielstrategie ein:

**Definition 5.28.** *Ein Prozeß beschränkter Zufallsvariabler  $(H_n)_{n=1}^\infty$  heißt Strategie / Handelsstrategie / previsible falls  $H_n$  für jedes  $n$  aus der Information von  $\mathcal{F}_{n-1}$  bestimmt werden kann, d.h. falls  $H_n$  messbar bezüglich  $\mathcal{F}_{n-1}$  ist.*

Sei  $(S_n)_{n=0}^\infty$  ein weiterer Prozess. Die der Strategie  $(H_n)_{n=1}^\infty$  zugehörige Auszahlung ist gegeben durch

$$(H \cdot S)_n := \sum_{k=1}^n H_k(S_k - S_{k-1}). \tag{5.11}$$

Wir können uns vorstellen, dass  $(H \cdot S)_n$  den Gewinn oder Verlust beschreibt, den man macht, wenn man an jedem Tag  $k-1$  genau  $H_k$  Aktien zum Preis  $S_{k-1}$  kauft, um sie am Tag  $k$  dann zum Preis  $S_k$  zu verkaufen.

Ist  $(M_n)_{n=0}^\infty$  ein Martingal (und jedes  $H_n$  beschränkt und previsible), so gilt

$$\mathbb{E}[H_k(M_{k+1} - M_k) | \mathcal{F}_k] = \quad (5.12)$$

$$\mathbb{E}[H_k(M_{k+1} - M_k) | \mathcal{F}_k] = \quad (5.13)$$

$$H_k \mathbb{E}[M_{k+1} - M_k | \mathcal{F}_k] = 0, \quad (5.14)$$

also auch  $\mathbb{E}[H_k(M_{k+1} - M_k)] = 0$ .

Insbesondere gilt daher für jedes Martingal

$$\mathbb{E}[(H \cdot M)_n] = 0. \quad (5.15)$$

Das bedeutet, egal mit welcher Strategie wir handeln, im Durchschnitt werden wir weder Gewinn noch Verlust machen. In diesem Sinn ist ein Martingal ein *fairer Spiel*.

Tatsächlich kann man auch (unschwer) zeigen, dass (5.15) charakteristisch für Martingale ist, d.h. wenn (5.15) für jede (beschränkte) Strategie  $(H_n)_{n=0}^\infty$  erfüllt ist, dann ist  $(M_n)_{n=0}^\infty$  ein Martingal (Übung).

## 5.6 Stoppzeiten

**Definition 5.29.** Eine Stoppzeit ist eine Zufallsvariable  $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  sodass für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$\{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Folgendes Lemma ist leicht zu sehen:

**Lemma 5.30.** Eine Zufallsvariable  $\tau : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$  ist genau dann eine Stoppzeit, wenn für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n.$$

**Beispiel 5.31.** Falls  $\tau = k$ , wobei  $k$  eine feste natürliche Zahl ist, so ist  $\tau$  offenbar eine Stoppzeit, unabhängig von der betrachteten Filtration.

Gegeben eine Filtration  $(\mathcal{F}_n)$ ,  $m < k$  und  $A \in \mathcal{F}_k$ , ist

$$\tau(\omega) := \begin{cases} m & \text{falls } \omega \in A \\ k & \text{falls } \omega \in A^c \end{cases}$$

eine Stoppzeit.

Gegeben ein adaptierter Prozess  $(X_n)$  und eine Borelmenge  $B \subseteq \mathbb{R}$ , so ist

$$\tau_B := \inf\{n : X_n \in B\}$$

eine Stoppzeit. (Übung)

**Definition 5.32** (gestoppter Prozeß). Sei  $X = (X_n)_{n=0}^\infty$  ein adaptierter Prozess und  $\tau$  eine Stoppzeit. Dann ist der gestoppte Prozess  $X^\tau = (X_n^\tau)_{n=0}^\infty$  definiert durch

$$X_n^\tau(\omega) := X_{n \wedge \tau(\omega)}(\omega).$$

Falls die Stoppzeit  $\tau$  f.s. endlich ist (also  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ ), so definieren wir die Zufallsvariable  $X_\tau$  durch

$$X_\tau(\omega) := \begin{cases} X_{\tau(\omega)}(\omega) & \text{falls } \tau(\omega) \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{falls } \tau(\omega) = \infty \end{cases}.$$

Falls  $\tau$  f.s. endlich ist, gilt offenbar

$$X_\tau = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n^\tau.$$

Wir betrachten die *buy-and-hold* Strategie

$$H_k^\tau := \begin{cases} 1 & \text{falls } k \leq \tau \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für eine Stoppzeit  $\tau$  gilt dann

$$\{H_k^\tau = 0\} = \{\tau = 0\} \cup \dots \cup \{\tau = k - 1\} \in \mathcal{F}_k,$$

d.h.  $H^\tau$  ist previsible. Weiters gilt offenbar für einen stochastischen Prozeß  $X$  dass

$$X_n^\tau = X_0 + (H^\tau \cdot X)_n.$$

Indem wir auf beiden Seiten den Erwartungswert anwenden erhalten wir damit:

**Lemma 5.33.** Sei  $X$  ein Martingal und  $\tau$  eine Stoppzeit. Dann gilt für alle  $n \in \mathbb{N}$

$$\mathbb{E}X_n^\tau = \mathbb{E}X_0.$$

Eine wichtige Frage ist, wann wir bei obiger Gleichung  $n$  gegen  $\infty$  gehen lassen dürfen. Der nächste Satz nennt hinreichende Bedingungen dafür:

**Satz 5.34** (Doob's Optional Stopping Theorem). Sei  $\tau$  eine Stoppzeit und  $X$  ein Martingal. Dann ist  $X_\tau$  integrierbar und  $\mathbb{E}X_\tau = \mathbb{E}X_0$  in jeder der folgenden Situationen:

1.  $\tau$  ist beschränkt, d.h. es gibt ein  $c \in \mathbb{R}_+$  mit  $\tau \leq c$ .
2.  $X$  ist beschränkt, d.h. es gibt ein  $c \in \mathbb{R}_+$  sodas  $\sup_n |X_n| \leq c$  und  $\tau$  ist fast sicher endlich.
3.  $\mathbb{E}\tau < \infty$  und  $X$  hat beschränkte Zuwächse, d.h. es gibt ein  $c \in \mathbb{R}_+$  mit  $|X_{n+1} - X_n| \leq c$  für alle  $n$ .

*Beweis.* Unter den beiden ersten Bedingungen ist der Beweis jeweils recht einfach.

Beweis von (3): Die Folge  $X_n^\tau$  erfüllt

$$|X_n^\tau| \leq |X_0| + c\tau$$

und die Zufallsvariable auf der rechten Seite ist integrierbar, also ist der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar.  $\square$

**Satz 5.35.** *Seien  $a, b \in \mathbb{N}$  und  $S_n$  die symmetrische Irrfahrt mit Start in 0. Die Irrfahrt trifft fast sicher irgendwann auf  $-a$  oder  $b$ . Für die Zeit  $\tau_{a,b}$  die bis dahin vergeht gilt*

$$\mathbb{E}\tau_{a,b} = ab.$$

*Die Irrfahrt trifft mit Wahrscheinlichkeit  $\frac{b}{a+b}$  auf  $-a$  bevor sie auf  $b$  trifft.*

*Beweis.* Dass

$$\tau_{a,b} := \min\{n : S_n \in \{-a, b\}\}$$

endlich ist, könnte eine Übungsaufgabe sein.

Dann gilt

$$0 = \mathbb{E}S_0 = \mathbb{E}S_\tau = (-a)\mathbb{P}(\text{Irrfahrt auf } a \text{ getroffen}) + b\mathbb{P}(\text{Irrfahrt auf } b \text{ getroffen}).$$

Schreiben wir  $p_a$  für die Wahrscheinlichkeit zuerst auf  $-a$  zu treffen und  $p_b$  für die Wahrscheinlichkeit zuerst auf  $b$  zu treffen so gilt daher

$$0 = p_a * (-a) + p_b * b,$$

woraus (wegen  $p_a + p_b = 1$ )  $p_a = b/(a+b)$  folgt.

Wir haben oben schon gesehen, dass auch  $M_n = S_n^2 - n$  ein Martingal ist und es gilt wiederum

$$0 = \mathbb{E}M_0 = \mathbb{E}[M_{n \wedge \tau_{a,b}}] = \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau_{a,b}}^2] - \mathbb{E}[n \wedge \tau_{a,b}] \quad (5.16)$$

$$\rightarrow a^2\mathbb{P}(\text{Irrfahrt auf } -a \text{ getroffen}) + b^2\mathbb{P}(\text{Irrfahrt auf } b \text{ getroffen}) - \mathbb{E}[\tau_{a,b}], \quad (5.17)$$

wenn wir  $n$  gegen  $\infty$  gehen lassen (und einmal dominierte und einmal monotone Konvergenz verwenden). Wir erhalten also  $\mathbb{E}[\tau_{a,b}] = a^2b/(a+b) + ab^2/(a+b) = ab$ .  $\square$

Indem wir  $b$  gegen unendlich gehen lassen, erhalten wir aus obigem Satz leicht, dass  $\mathbb{P}[\tau_{a,\infty} < \infty] = 1$ , aber  $\mathbb{E}[\tau_{a,\infty}] = \infty$ .

## 5.7 Konvergenz von Martingalen

Gegeben ein stochastischer Prozess  $(M_n)_n$  betrachten wir eine “buy low, sell high” Strategie: Wir stellen uns vor, dass  $M_n$  den Preis einer Aktie am Tag  $n$  beschreibt (und erlauben auch negative Preise). Immer wenn  $M_n$  unter die Null gefallen ist, kaufen wir eine Aktie. Sobald  $M_n$  auf Eins oder darüber gestiegen ist, verkaufen wir die Aktie wieder. Sei  $(H_n)_n$  die entsprechende Strategie. Bei jedem *upcrossing* des Intervalls  $[0, 1]$  machen wir dann einen Euro Gewinn. Die Anzahl aller upcrossings bis zum Zeitpunkt  $n$  bezeichnen wir mir  $U_n^{[0,1]}$ . Tatsächlich ist unser Gewinn oder Verlust  $(H^{[0,1]} \cdot M)_n$  bis zum Zeitpunkt  $n$  nicht unbedingt größer als  $U_n^{[0,1]}$ , da es auch passieren kann, dass  $M_n$  nachdem wir es unterhalb der 0 gekauft haben weiter an Wert verliert. Was aber jedenfalls richtig ist, ist die Ungleichung

$$U_n^{[0,1]} \leq (H^{[0,1]} \cdot M)_n + (M_n)_-, \quad (5.18)$$

wobei  $(M_n)_-$  den Negativteil von  $M_n$  bezeichnet.

Wenn man das Argument mit dem Intervall  $[a, b]$  wiederholt, erhält man

$$(b - a)U_n^{[a,b]} \leq (H^{[a,b]} \cdot M)_n + (M_n - a)_-,$$

Indem wir auf beiden Seiten Erwartungswerte nehmen, sehen wir.

**Lemma 5.36** (Doob’s upcrossing lemma). *Sei  $M$  ein Supermartingal. Dann gilt*

$$(b - a)\mathbb{E}U_n^{[a,b]} \leq \mathbb{E}(M_n - a)_- \leq \mathbb{E}[|M_n| + |a|].$$

*Insbesondere impliziert  $\sup \mathbb{E}[|M_n|] < \infty$  dass*

$$\mathbb{E}[U_\infty^{[a,b]}] < \infty, \mathbb{P}[U_\infty^{[a,b]} = \infty] = 0.$$

Damit zeigen wir:

**Satz 5.37** (Doob’scher Konvergenzsatz). *Sei  $M$  ein Supermartingal mit  $\sup \mathbb{E}|M_n| < \infty$ . Dann existiert  $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$  fast sicher.*

*Beweis.* Die Menge von  $\omega \in \Omega$  auf der der Grenzwert nicht existiert können wir schreiben als

$$\{\liminf_n M_n < \limsup_n M_n\} = \bigcup_{a < b, a, b \in \mathbb{Q}} \{\liminf_n M_n < a < b < \limsup_n M_n\} \quad (5.19)$$

$$\subseteq \bigcup_{a < b, a, b \in \mathbb{Q}} \{U_\infty^{[a,b]} = \infty\}. \quad (5.20)$$

Nachdem rechts eine Vereinigung von abzählbar vielen Nullmengen steht, sind wir fertig.  $\square$

Falls  $M$  ein Submartingal ist, erhalten wir natürlich das selbe Resultat indem wir den obigen Satz auf  $-M$  anwenden.

Wenn wir ein Supermartingal betrachten das von unten beschränkt ist, ist natürlich auch die Folge der absoluten Erwartungswerte beschränkt. Also erhalten wir:

**Korollar 5.38.** Sei  $M$  ein Supermartingal dass von unten beschränkt ist. Dann existiert  $M_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$  fast sicher.

Wir haben oben schon besprochen, dass für die einfache symmetrische Irrfahrt  $S_n$  die Trefferzeit von  $(-1)$  fast sicher endlich ist. Der Prozeß  $Y_n := S_n^\tau, n \geq 1$  ist ein von unten beschränktes Martingal und  $S_\tau = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^\tau = -1$  bzw.  $Y_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n$  fast sicher. Allerdings gilt in dieser Situation *nicht*  $\mathbb{E}Y_0 = \mathbb{E}Y_\infty$ .

Im nächsten Kapitel wollen wir noch ein bisschen besser verstehen, unter welchen Umständen wir sicherstellen können, dass diese Gleichung erfüllt ist.

## 5.8 Uniform integrierbare Martingale

Ist eine Zufallsvariable  $X$  integrierbar, so sieht man leicht, dass

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{|X| \geq k} |X| d\mathbb{P} \rightarrow 0.$$

Eine Folge von Zufallsvariablen  $(X_n)$  heißt uniform integrierbar falls

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_n \int_{|X_n| \geq k} |X_n| d\mathbb{P} \rightarrow 0. \quad (5.21)$$

**Bemerkung 5.39.** Aus der uniformen Integrierbarkeit folgt, dass  $\sup_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ , aber diese Bedingung ist nicht hinreichend.

Eine Folge von Zufallsvariablen  $(X_n)$ , ist uniform integrierbar genau dann wenn  $\sup_n \mathbb{E}[|X_n|] < \infty$  und

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_n \sup_{B: \mathbb{P}(B) \leq \varepsilon} \int_B |X_n| d\mathbb{P} \rightarrow 0. \quad (5.22)$$

Das könnte eine Übungsaufgabe sein.

Eine Folge von Zufallsvariablen ist jedenfalls dann uniform integrierbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

1. Es gibt eine integrierbare dominierende Funktion, d.h. es gibt eine Zufallsvariable  $Y$  mit  $\mathbb{E}Y < \infty$  und  $Y \geq |X_n|$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .
2. Die Folge is in  $L_2$  beschränkt. Dann gilt nämlich für  $k \rightarrow \infty$  dass

$$\sup_n \int_{|X_n| > k} |X_n| d\mathbb{P} \leq 1/k \sup_n \int X^2 d\mathbb{P} \rightarrow 0.$$

Allgemeiner sieht man so, dass Beschränktheit in  $L_p$  für ein  $p > 1$  ausreicht um uniforme Integrierbarkeit zu zeigen.

3. Es gibt eine integrierbare Zufallsvariable  $X$  sodass  $X_n = \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n]$  für eine Folge von  $\sigma$ -Algebren  $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots$ . Dann gilt nämlich nach der Definition der bedingten Erwartung, der bedingten Jensenungleichung und der Markovungleichung

$$\int_{|X_n| \geq k} |X_n| d\mathbb{P} = \int_{|X_n| \geq k} |\mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n]| d\mathbb{P} = \int_{|X_n| \geq k} |X| d\mathbb{P} \leq \sup_{B: \mathbb{P}(B) < \mathbb{E}|X|/k} \int_B |X| d\mathbb{P}.$$

Die rechte Seite konvergiert für  $k \rightarrow \infty$  gegen 0, natürlich gleichmäßig in  $n$ .

Mit dem Konzept der uniformen Integrierbarkeit können wir den Satz von der dominierten Konvergenz verallgemeinern:

**Satz 5.40.** *Angenommen  $X_n \rightarrow X$  fast sicher und die Folge  $(X_n)_n$  ist uniform integrierbar. Dann gilt auch*

$$\lim_n \mathbb{E}|X_n - X| = 0,$$

(d.h.  $X_n \rightarrow X$  in  $L^1$ ) und natürlich  $\lim_n \mathbb{E}X_n = \mathbb{E}X$ .

*Beweis.* Wegen dem Lemma von Fatou und  $\sup_n \mathbb{E}|X_n| < \infty$  ist  $X$  integrierbar. Daraus folgert man unschwer, dass auch  $Y_n := |X_n - X|, n \in \mathbb{N}$  uniform integrierbar ist.

Wir müssen noch zeigen, dass  $\lim_n \mathbb{E}Y_n = 0$ . Wegen der uniformen Integrierbarkeit der  $Y_n, n \in \mathbb{N}$ , wird  $\sup_n \int_{Y_n \geq k} Y_n d\mathbb{P}$  für große  $k$  beliebig klein. Andererseits gilt  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}Y_n \wedge k = 0$  für jedes  $k$  nach dem Satz über dominierte Konvergenz.  $\square$

**Satz 5.41.** *Sei  $(M_n)_n$  ein uniform integrierbares Martingal. Dann existiert*

$$M_\infty := \lim_n M_n$$

fast sicher und in  $L^1$ . Außerdem gilt

$$M_n = \mathbb{E}[M_\infty | \mathcal{F}_n], n \geq 1. \tag{5.23}$$

Umgekehrt ist jedes Martingal mit einer (“Doob’schen”) Darstellung  $M_n = \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n], n \geq 1$  uniform integrierbar und es gilt  $M_n \rightarrow \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_\infty]$  für  $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$ .

Das heißt wir können jedes uniform integrierbare Martingal “abschließen” indem wir ihm  $M_\infty$  als letztes Element hinzufügen.

*Beweis.* Wegen der uniformen Integrierbarkeit ist  $\sup_n \mathbb{E}|M_n| < \infty$  und die fast sichere Konvergenz  $M_\infty = \lim_n M_n$  folgt aus dem Doob’schen Konvergenzsatz. Im letzten Satz haben wir auch gesehen, dass wegen uniformer Integrierbarkeit dann auch  $L^1$ -Konvergenz gilt.

Wir zeigen noch, dass  $M_n = \mathbb{E}[M_\infty|\mathcal{F}_n]$  fast sicher. Für  $r \geq n$  und  $B \in \mathcal{F}_n$  liefert die Martingaleigenschaft dass

$$\int_B M_r d\mathbb{P} = \int_B M_n d\mathbb{P}.$$

Andererseits gilt

$$\left| \int_B M_r d\mathbb{P} - \int_B M_\infty d\mathbb{P} \right| \leq \int_B M_r - M_\infty d\mathbb{P} \leq \mathbb{E}|M_r - M_\infty| \rightarrow 0$$

für  $r \rightarrow \infty$ . Daher muß  $\int_B M_n d\mathbb{P} = \int_B M_\infty d\mathbb{P}$  gelten.

Dass die Darstellung  $M_n = \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_n]$ ,  $n \geq 1$  uniforme Integrierbarkeit impliziert, haben wir oben schon gesehen. Setze  $M_\infty := \lim_n M_n$ . (Wegen uniformer Integrierbarkeit ist der punktweise Grenzwert natürlich der  $L^1$ -Grenzwert.) Wir müssen noch sehen überlegen, dass

$$M_\infty = \mathbb{E}[X|\mathcal{F}_\infty].$$

Falls  $A \in \mathcal{F}_n$  für ein  $n \in \mathbb{N}$ , gilt natürlich  $\mathbb{E}[I_A M_\infty] = \mathbb{E}[I_A X]$ . Weil  $\bigcup_n \mathcal{F}_n$  ein Durchschnitts-stabiler Erzeuger von  $\mathcal{F}_\infty = \sigma(\bigcup_n \mathcal{F}_n)$  ist, gilt die Gleichheit auch auf  $\mathcal{F}_\infty$ .  $\square$

Besonders einfach lässt sich ein Martingal verstehen falls  $(M_n)$  in  $L^2$  beschränkt bleibt. Grund dafür ist die fundamentale Orthogonalitätsrelation

$$\mathbb{E}[(M_m - M_n)Y] = 0$$

für  $k \leq n \leq m$  und  $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_k, \mathbb{P})$ . Daraus folgt nämlich mit Pythagoras

$$\|M_n - M_0\|_2^2 = \sum_{k=1}^n \|M_k - M_{k-1}\|_2^2.$$

Damit sehen wir:

**Satz 5.42.** Sei  $(M_n)_n$  ein Martingale. Falls  $\sup_n \mathbb{E}M_n^2 < \infty$ , existiert

$$M_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} M_n$$

fast sicher und in  $L^2$  (und es gilt  $M_n := \mathbb{E}[M_\infty|\mathcal{F}_n]$ ).

*Beweis.* Die  $L^2$ -Konvergenz erhält man leicht aus der Vollständigkeit von  $L^2$ . Nur für die punktweise Konvergenz brauchen wir den Doob'schen Konvergenzsatz.  $\square$

## 5.9 Kolmogorovs 0-1-Gesetz

**Satz 5.43.** Seien  $(X_n)_{n \geq 1}$  unabhängige Zufallsvariablen. Definieren wir  $\mathcal{G}_n = \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$ . Für jedes Ereignis  $A$  in der terminalen  $\sigma$ -Algebra

$$\mathcal{G}_\infty := \bigcap_{n \geq 1} \mathcal{G}_n$$

gilt: Die Wahrscheinlichkeit  $P(A)$  ist entweder 0 oder 1.

*Beweis.* Sei  $(\mathcal{F}_n)_n$  die von  $X_1, X_2, \dots$  erzeugte Filtration. Wir betrachten die Zufallsvariablen  $Y_n = \mathbb{E}[I_A | \mathcal{F}_n]$ . Nach dem Martingalkonvergenzsatz gibt es ein  $Y$  sodass  $Y_n \rightarrow Y$  fast sicher und in  $L^1$  und es ist  $Y = \mathbb{E}[I_A | \mathcal{F}_\infty] = I_A$ .

Für jedes  $n \in \mathbb{N}$  gilt wegen  $A \in \sigma(X_{n+1}, X_{n+2}, \dots)$  und der Unabhängigkeit der  $X_1, X_2, \dots$

$$Y_n = \mathbb{E}[I_A | \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[I_A] = \mathbb{P}(A).$$

Daraus folgt  $I_A = \mathbb{P}(A)$  fast sicher, also  $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ . □

Wenn alle Elemente einer  $\sigma$ -Algebra Wahrscheinlichkeit 0 oder 1 haben, so sind auch alle bezüglich dieser  $\sigma$ -Algebra meßbaren Funktionen konstant (Übung). In der Situation des 0-1-Gesetzes erhalten wir daraus z.B. dass  $\limsup_n X_n$  fast sicher konstant ist.

## 5.10 Starkes Gesetz der großen Zahlen unter Momentenbedingungen

Mittels der Martingalkonvergenzsätze von oben ist es recht leicht eine Version des Gesetzes der großen Zahlen zu beweisen.

Wir brauchen dazu noch zwei elementare Lemmata aus der Analysis.

**Lemma 5.44** (Cesaro). *Angenommen eine Folge reeller Zahlen erfüllt  $v_n \rightarrow v_\infty$ , dann gilt auch*

$$\frac{v_1 + \dots + v_n}{n} \rightarrow v_\infty.$$

*Beweis.* Sei  $\varepsilon > 0$ . Wenn wir  $N$  groß genug wählen ist  $v_n \geq v_\infty - \varepsilon$  für alle  $n \geq N$ . Daher gilt

$$\liminf_n \frac{v_1 + \dots + v_n}{n} \geq \liminf_n \frac{(n - N)(v_\infty - \varepsilon)}{n} = v_\infty - \varepsilon.$$

Analog erhält man  $\limsup_n v_n \leq v_\infty + \varepsilon$ . □

**Lemma 5.45** (Kronecker). *Seien  $x_n, n \geq 1$  reelle Zahlen sodass*

$$u_n := \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{k} \rightarrow u_\infty.$$

*Dann gilt*

$$\frac{s_n}{n} \rightarrow 0, \quad \text{wobei } s_n := x_1 + \dots + x_n.$$

*Beweis.* Wegen  $u_n - u_{n-1} = \frac{x_n}{n}$  haben wir

$$s_n = \sum_{k=1}^n k(u_k - u_{k-1}) = nu_n - \sum_{k=1}^n u_k.$$

Wenn wir beide Seiten durch  $n$  dividieren können wir nach dem vorigen Lemma (Cesaro) schließen, dass  $\frac{s_n}{n} \rightarrow u_\infty - u_\infty = 0$ . □

Aus dem Lemma von Kronecker und den Martingalkonvergenzsätzen aus dem letzten Kapitel erhalten wir nun leicht die folgende Version des Gesetzes der großen Zahlen:

**Satz 5.46** (Starkes Gesetz der großen Zahlen unter Momentenbedingungen). *Sei  $W_1, W_2, \dots$  eine Folge von unabhängigen Zufallsvariablen mit  $\mathbb{E}W_i = 0, i \in \mathbb{N}$  und*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var } W_n}{n^2} < \infty.$$

Dann gilt fast sicher

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{W_1 + \dots + W_n}{n} = 0.$$

*Beweis.* Unter den Voraussetzungen des Satzes definiert  $M_n := W_1/1 + \dots + W_n/n, n \geq 1$  ein Martingal dass in  $L^2$  beschränkt ist. Insbesondere existiert

$$\lim_n (W_1/1 + \dots + W_n/n)(\omega)$$

für fast alle  $\omega \in \Omega$ . Aus dem Lemma von Kronecker folgt dann das Gewünschte. □

## 5.11 Klassische Variante des starken Gesetzes der großen Zahlen

Die klassische Variante des Gesetzes der großen Zahlen besagt:

**Satz 5.47.** *Sei  $X_1, X_2, \dots$  eine i.i.d. Folge von integrierbaren Zufallsvariablen mit  $\mathbb{E}X_i = \mu$ . Dann gilt fast sicher*

$$\lim_n \frac{S_n}{n} = \mu, \quad \text{wobei } S_n := X_1 + \dots + X_n.$$

Wir bringen hier das Argument von [1]. Zur Vorbereitung benötigen wir ein paar Lemmata. Insbesondere das erste ist auch für sich genommen interessant:

**Lemma 5.48.** *Seien  $Y_1, Y_2, \dots$  i.i.d. mit  $\mathbb{E}Y_i > 0$  und  $Y_i \leq C$  für ein  $C \in \mathbb{R}$  und  $S_n := Y_1 + \dots + Y_n$ . Sei  $b \geq 0$ . Dann erfüllt  $\tau := \inf\{n : S_n > b\}$  dass  $\mathbb{E}\tau < \infty$ .*

*Beweis.* Um das zu zeigen, betrachten wir das Martingal

$$M_n := S_n - \mathbb{E}[Y_1]n.$$

Dann gilt natürlich  $0 = \mathbb{E}[M_{n \wedge \tau}]$  also

$$\mathbb{E}[Y_1]\mathbb{E}[n \wedge \tau] = \mathbb{E}[S_{n \wedge \tau}] \leq C + b.$$

Weil die rechte Seite beschränkt bleibt, muß auch die linke Seite für  $n \rightarrow \infty$  beschränkt bleiben, daher gilt jedenfalls  $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ . Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt nun  $\mathbb{E}[n \wedge \tau] \leq (C + b)/\mathbb{E}[Y_1]$ . □

**Lemma 5.49.** Seien  $Y_1, Y_2, \dots$  i.i.d. mit  $\mathbb{E}Y_i > 0$ . Dann gilt fast sicher

$$\inf_n Y_1 + \dots + Y_n > -\infty$$

*Beweis.* Gegeben potentiell unbeschränkte  $Y_i$  mit  $\mathbb{E}Y_i > 0$ , so gibt es nach dem Satz von der monotonen Konvergenz ein  $C > 0$ , sodass auch  $\mathbb{E}Y_i \wedge C > 0$ . Natürlich folgt aus  $\inf(Y_1 \wedge C) + \dots + (Y_n \wedge C) > 0$  dann auch  $\inf Y_1 + \dots + Y_n > -\infty$ . Daher können wir oBdA annehmen, dass  $Y_i \leq C$ .

Wir setzen  $S_n := Y_1 + \dots + Y_n$ . Für jedes  $n$  gilt

$$(0 = S_0, S_1, \dots, S_n) \sim (S_n - S_n, S_n - S_{n-1}, \dots, S_n - S_0),$$

d.h. beide Zufallsvektoren haben die selbe Verteilung.

Sei wieder  $\tau := \inf\{n : S_n > 0\}$ . Weiters nennen wir  $n$  einen (schwachen) Negativrekord der Folge  $S_0, S_1, \dots, S_n$  falls

$$S_n = S_0 \wedge S_1 \wedge \dots \wedge S_n.$$

Anders ausgedrückt:  $n$  ist ein (schwacher) Negativrekord, wenn die Werte  $S_n - S_n, S_n - S_{n-1}, \dots, S_n - S_0$  alle  $\leq 0$  erfüllen. Daher erhalten wir

$$\mathbb{P}(\tau > n) = \mathbb{P}(n \text{ ist ein (schwacher) Negativrekord}).$$

Indem wir über alle  $n$  summieren, erhalten wir

$$\mathbb{E}[\tau] = \sum_n \mathbb{P}(\tau > n) = \mathbb{E}|\{n : n \text{ ist ein (schwacher) Negativrekord}\}|.$$

$\inf_n S_n = -\infty$  kann natürlich nur gelten, wenn es unendlich viele Negativrekorde gibt. Daher reicht es zu zeigen, dass  $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ . □

*Beweis von Satz 5.47.* Sei  $\varepsilon > 0$  und  $Y_n := X_n - \mu + \varepsilon$  für  $n \in \mathbb{N}$  sodass  $\mathbb{E}Y_n > 0$ . Aus

$$\inf_n Y_1 + \dots + Y_n > 0,$$

folgt dann

$$\liminf_n (Y_1 + \dots + Y_n)/n \geq 0$$

fast sicher, also auch  $\liminf_n (X_1 + \dots + X_n)/n \geq \mu - \varepsilon$ .

Analog erhalten wir  $\limsup_n (X_1 + \dots + X_n)/n \leq \mu + \varepsilon$ . □

## 5.12 Skizze eines weiteren Beweises des starken Gesetzes der großen Zahlen

Wir skizzieren einen weiteren Beweis von Satz 5.47.

Wir betrachten für  $n \in \mathbb{N}$  die  $\sigma$ -Algebra

$$\mathcal{G}_{-n} := \sigma(S_n, S_{n+1}, S_{n+2}, \dots) = \sigma(S_n, X_{n+1}, X_{n+2}).$$

und setzen

$$Y_{-n} := \mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}_{-n}].$$

Dann ist

$\dots, Y_{-3}, Y_{-2}, Y_{-1}$  ein Martingal bezüglich der Filtration  $\dots \subseteq \mathcal{G}_{-3} \subseteq \mathcal{G}_{-2} \subseteq \mathcal{G}_{-1}$ .

Die Familie von Zufallsvariablen  $Y_{-n}, n \in \mathbb{N}$  ist uniform integrierbar und mit dem selben Beweis wie für den Doob'schen Konvergenzsatz erhält man, dass

$$Y_{-\infty} := \lim_{n \rightarrow \infty} Y_{-n}$$

fast sicher und in  $L^1$  existiert. ("Doob'scher Konvergenzsatz für Rückwärtsmartingale")

Weiters gilt  $\mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}_{-n}] = \mathbb{E}[X_1 | S_n]$ , weil  $X_{n+1}, X_{n+2}, \dots$  keine weitere Information über  $X_1$  liefern. Nach einem Satz aus der Maßtheorie gibt es in diesem Fall eine  $P_{S_n}$  eindeutig bestimmte Funktion  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sodass

$$\mathbb{E}[X_1 | S_n] = f(S_n).$$

Aus Symmetriegründen gilt dann natürlich auch  $\mathbb{E}[X_i | S_n] = f(S_n)$  für  $i = 2, \dots, n$ . Damit folgt

$$nf(S_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i | S_n] = \mathbb{E}[S_n | S_n] = S_n,$$

also  $f(x) = x/n$  und somit

$$Y_{-n} = \mathbb{E}[X_1 | \mathcal{G}_{-n}] = \frac{S_n}{n}.$$

Zusammen erhalten wir also, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = Y_{-\infty}$$

fast sicher und in  $L^1$ . Weil  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} \in \sigma(X_k, X_{k+1}, \dots)$  für alle  $k \in \mathbb{N}$  erhalten wir schließlich aus dem 0-1-Gesetz von Kolmogorov, dass  $Y_{-\infty}$  fast sicher konstant ist.

### 5.13 Maximalungleichungen

Wir haben oben gesehen, dass Martingale eine Reihe von nützlichen Eigenschaften haben, sie sind *faire Spiele* (d.h.  $\mathbb{E}[(H \cdot X)_n] = 0$  für alle previsiblen  $(H)$ ), sie erfüllen das optional stopping theorem  $\mathbb{E}X_{\tau \wedge n} = \mathbb{E}X_0$  und haben starke Konvergenzeigenschaften.

Zum Abschluss des Kapitels erwähnen wir noch knapp *Martingalungleichungen*. Grob gesagt, erlauben Sie, das Verhalten eines Martingals durch dessen Werte zu Endzeitpunkt zu kontrollieren.

Exemplarische für diese große Klasse von Ungleichungen erwähnen wir die Doob'sche  $L^2$ -Ungleichung:

**Satz 5.50.** Sei  $(S_n)_{n=0}^N, S_0 = 0$  ein nicht-negatives Submartingal und  $\bar{S}_k := \max_{i \leq k} S_i$  das laufende Maximum. Dann gilt

$$\mathbb{E}\bar{S}_N^2 \leq 4\mathbb{E}S_N^2.$$

*Beweisskizze.* Gegeben reelle Zahlen  $s_0, \dots, s_N$  gilt

$$\bar{s}_N^2 + 4 \sum_{n=1}^N \bar{s}_{n-1}(s_n - s_{n-1}) \leq 4s_N^2.$$

Wir beweisen diese Ungleichung nicht, aber wir betonen, dass das Argument elementar ist: es genügt die Terme umzuordnen und Quadrate zu ergänzen. Die Bedeutung der Ungleichung liegt darin, dass sie uns direkt die gewünschte Martingalungleichung liefert: indem wir die Ungleichung auf die Pfade des Martingals anwenden und Erwartungswerte nehmen erhalten wir nämlich

$$\mathbb{E}\bar{S}_N^2 + 4 \underbrace{\mathbb{E} \sum_{n=1}^N \bar{S}_{n-1}(S_n - S_{n-1})}_{\geq 0 \text{ wegen Submartingaleigenschaft}} \leq 4\mathbb{E}\bar{S}_N^2.$$

□

## 5.14 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir den Begriff der bedingten Erwartung kennengelernt. Er ermöglicht uns eine zentrale Klasse stochastischer Prozesse zu definieren, die der *Martingale*. Schon mit einfachen Mitteln kann man Eigenschaften von Martingalen beweisen, die weitreichende Konsequenzen für die Stochastik haben. Exemplarisch haben wir das 0-1-Gesetz von Kolmogorov und verschiedene Beweise des Gesetzes der großen Zahlen kennengelernt.

## 6 Stetige Verteilungen und zentraler Grenzwertungssatz

### 6.1 Wiederholung - Dimension 1

Gegeben eine Zufallsvariable  $X$  auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ , lässt sich ihre Verteilung  $P_X$  (wobei  $P_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$  für messbare  $A \subseteq \mathbb{R}$ ) durch die Verteilungsfunktion

$$F(x) := \mathbb{P}(X \leq x), x \in \mathbb{R}$$

festlegen. Man sieht leicht, dass eine Funktion  $F$  genau dann Verteilungsfunktion ist, wenn  $F$  (schwach) monoton wachsend und rechtsstetig ist, sowie  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  erfüllt.

Wir sagen dass  $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  (wobei  $d \geq 1$ ) eine **stetige Zufallsvariable** ist, wenn es eine messbare Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$  gibt, sodass

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) 1_A(x) dx$$

für jedes messbare  $A \subset \mathbb{R}$ . Falls  $X$  stetig ist, ist die Dichte natürlich die Ableitung der Verteilungsfunktion.

Ein Punkt  $x \in \mathbb{R}$  heißt *Atom* von  $P_X$  (bzw.  $X$ ) falls  $\mathbb{P}(X = x) > 0$ . Aus  $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x-)$  folgt, dass  $P_X$  genau dann *atom-frei* ist, wenn die Verteilungsfunktion stetig ist.

Besitzt eine Zufallsvariable  $X$  eine Dichte, so ist ihre Verteilungsfunktion natürlich stetig (d.h.  $P_X$  hat keine Atome). Die Umkehrung gilt jedoch nicht. Es gibt nämlich Zufallsvariablen, deren Verteilungsfunktion stetig ist, die aber keine Dichte besitzen, das sieht man unschwer wenn man ein bisschen mit der Cantormenge spielt. Genauer kann man zeigen, dass eine Zufallsvariable genau dann stetig ist, wenn ihr Verteilungsfunktion *absolut stetig* ist. Das bedeutet: für alle  $\varepsilon > 0$  gibt es ein  $\delta$  sodass für alle  $a_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq b_n$

$$\sum_{i=1}^n |b_i - a_i| < \delta \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n |F(b_i) - F(a_i)|.$$

(Wir werden dieses Resultat jedoch nicht verwenden.)

### 6.2 Wiederholung - mehrdimensionale Zufallsvektoren

Wir sagen dass  $X = (X_1, \dots, X_d) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$  ein **stetiger Zufallsvektor** ist, wenn es eine Funktion  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty)$  gibt, sodass

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) 1_A(x) dx$$

für jedes messbare  $A \subset \mathbb{R}^d$ .

Wir beschränken uns der Einfachheit halber meist auf den Fall von zwei Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$ . Das macht die Notation einfacher, die Definitionen und Resultate gelten aber natürlich genauso auch im allgemeinen Fall. Wenn  $(X, Y)$  ein stetiger Zufallsvektor ist, nennt man  $X, Y$  auch *gemeinsam stetig verteilt*.

Gegeben zwei Zufallsvariablen  $X$  und  $Y$  ist die *gemeinsame / multivariate Verteilungsfunktion* durch

$$F(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y), \quad F : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1] \quad (6.1)$$

gegeben. Genau wie im eindimensionalen Fall kann man Verteilungsfunktionen leicht durch Monotonie und Rechtsstetigkeit charakterisieren. Die **Marginalverteilung** (oder **Randverteilung**) von  $X$  ist gegeben durch die Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y).$$

(Und analog für  $Y$ .)

**Beispiel 6.1.** Bemerken Sie dass  $X$  und  $Y$  beide stetig sein können, ohne dass  $X$  und  $Y$  gemeinsam stetig sind. Sei z.B.  $X$  stetig und  $Y = X$ . Dann sind  $X$  und  $Y$  nicht gemeinsam stetig: die Verteilung von  $(X, Y)$  ist auf  $\Delta = \{(x, y) : y = x\}$  konzentriert (bemerken Sie, dass die Fläche von  $\Delta$  null ist).

Seien  $X$  und  $Y$  gemeinsam stetig verteilt. In diesem Fall erhält man für die gemeinsame Verteilungsfunktion

$$F(x, y) = \int_{u \leq x} \int_{v \leq y} f(u, v) \, dudv.$$

Umgekehrt gilt natürlich

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y},$$

wenn die Verteilungsfunktion hinreichend differenzierbar ist. Weiters gilt

**Proposition 6.2.** *Seien  $X$  und  $Y$  gemeinsam stetig verteilt mit gemeinsamer Dichtefunktion  $f$ . Dann ist  $X$  stetig mit Dichtefunktion*

$$f_X(x) = \int_{y \in \mathbb{R}} f(x, y) \, dy.$$

*Beweis.* Bemerken Sie, dass

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X \in A, Y \in \mathbb{R}) = \int_{x \in A} \underbrace{\int_{y \in \mathbb{R}} f(x, y) \, dy}_{=: f_X(x)} \, dx = \int_A f_X(x) \, dx, \quad (6.2)$$

wie gewünscht. □

Begriffe	Diskreter Fall	Stetiger Fall
Funktion	Wahrscheinlichkeitsfunktion $p(x)$	Dichtefunktion $f(x)$
Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(X \in A)$	$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x)$	$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx$
Erwartungswert	$\mathbb{E}(X) = \sum_x xp(x)$	$\mathbb{E}(X) = \int xf(x) dx$
Erwartungswert einer Funktion der ZV	$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_x g(x)p(x)$	$\mathbb{E}(X) = \int g(x)f(x) dx$
Gemeinsame Verteilung	Gemeinsame WF $p(x, y)$	Gemeinsame Dichtefunktion $f(x, y)$
Randverteilung	$p_X(x) = \sum_y p(x, y)$	Wenn $X$ und $Y$ gemeinsam stetig sind, dann ist auch $X$ stetig mit Dichtefunktion $f_X(x) = \int_y f(x, y) dy$

**Abbildung 9:** Eine Tabelle mit unseren Definitionen und Begriffe zur Erinnerung.

**Beispiel 6.3.** Sei  $(X, Y)$  gleichverteilt auf der Scheibe  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ . Dann ist  $X$  stetig mit Dichtefunktion

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x^2}; \quad -1 \leq x \leq 1$$

und 0 sonst. Zum Beispiel, kann man für  $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$  überprüfen, dass

$$\mathbb{E}(R^2) = 2\mathbb{E}(X^2) = 2 \int_{-1}^1 x^2 \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x^2} dx = 1/2.$$

Das obige Integral ist nicht ganz leicht zu berechnen. Allerdings erhalten wir mithilfe von Polarkoordinaten:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(R^2) &= \int_D (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^1 r^2 (2\pi r) dr \\ &= 2 \int_0^1 r^3 dr = 1/2. \end{aligned}$$

Seien nun  $X, Y$  Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte  $f = f(x, y)$  und sei  $f_Y$  die Randdichte von  $Y$ . Für  $y$  mit  $f_Y(y) \neq 0$  definiert man die bedingte Dichte von  $X$  gegeben

$Y = y$  durch

$$f_{X|Y=y}(x) := \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

**Beispiel 6.4.** Der Zufallsvektor  $(X, Y)$  sei gleichverteilt auf der Einheitskreisscheibe. Gegeben  $Y = 0$  ist  $X$  gleichverteilt auf  $[-1, 1]$ . Gegeben  $Y = 1/2$  ist  $X$  gleichverteilt auf  $[-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2]$ .

Aus dem Satz von Fubini erhält man leicht den Zusammenhang mit der bedingten Erwartung: Für jede beschränkte messbare Funktion  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  gilt:

$$\mathbb{E}[h(X)|Y](\omega) = \int_{\mathbb{R}} h(x) f_{X|Y=Y(\omega)}(x) dx.$$

Weiters erhalten wir dass gemeinsam stetige verteilte Zufallsvariable  $X, Y$  genau dann unabhängig sind falls die gemeinsame Dichte das Produkt der einzelnen Dichten ist,  $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ .

### 6.3 Exponentialverteilung

**Definition 6.5.** Wir sagen, dass  $X$  **exponentialverteilt** mit Parameter  $\lambda \geq 0$  ist, wenn

$$\bar{F}(x) := 1 - F(x) = e^{-\lambda x}; x \geq 0 \text{ (und 1 sonst)}.$$

D.h.,  $X$  ist stetig mit Dichtefunktion

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}; x \geq 0 \text{ (und 0 sonst)}.$$

Die Exponentialverteilung ist das stetige Analogon zur Geometrischen Verteilung bei der

$$\mathbb{P}(X > n) = (1 - p)^n.$$

Man kann sich auch in diesem Fall vorstellen, dass  $X$  die Zeit bis zu einem ersten Erfolg darstellt, wobei es in jeder Zeiteinheit  $dt$  es eine Wahrscheinlichkeit ungefähr gleich  $\lambda dt$  gibt, dass ein Erfolg eintritt. Das ist der Inhalt des nächsten elementaren Satzes:

**Proposition 6.6.** Sei  $X$  exponentialverteilt mit Parameter  $\lambda \geq 0$ . Dann gilt

$$\mathbb{P}(X > t + h | X > t) = e^{-\lambda h}$$

(Gegeben  $X > t$ , ist die Verteilung von  $X - t$  auch exponentiell). Wir bezeichnen diese Eigenschaft als die **Gedächtnislosigkeit** von  $X$ . Insbesondere gilt

$$\mathbb{P}(X \in [t, t + h] | X > t) = \lambda h + o(h).$$

Der Parameter  $\lambda$  sollte daher als **Erfolgsrate** gedacht werden.

## 6.4 Die Normalverteilung

**Definition 6.7.** Eine Zufallsvariable  $X$  heißt normalverteilt wenn die Dichte von  $X$  gegeben ist durch

$$\phi_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}. \quad (6.3)$$

In diesem Fall ist der Erwartungswert von  $X$  gleich  $\mu$  und die Varianz gleich  $\sigma^2$  (Übung). Wir schreiben dann  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

Um zu sehen, dass (6.3) tatsächlich eine Dichte definiert, erinnern wir uns zunächst an folgendes Integral:

**Beispiel 6.8.**

$$\left( \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy \quad (6.4)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \quad (6.5)$$

$$= \left| \begin{array}{l} (x, y) = J(r, \phi) = (r \sin \alpha, r \cos \alpha) \\ \det(J) = r \end{array} \right| \quad (6.6)$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} r e^{-r^2/2} dr d\alpha = 2\pi. \quad (6.7)$$

Mittels Substitution erhält man daraus leicht, dass (6.3) eine Dichte definiert.

Falls  $X \sim N(0, 1)$ , heißt  $X$  *standardnormalverteilt*. Oft schreibt man  $\phi$  für die Dichte der Standardnormalverteilung und  $\Phi$  für die entsprechende Verteilungsfunktion. Durch Substitution erhält man leicht:  $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$  (Übung). Dadurch kann man Fragen über die Normalverteilung leicht auf Fragen über die Standardnormalverteilung zurückführen.

Es gibt keine explizite Formel für die Verteilungsfunktion / Tailfunktion der (Standard-) Normalverteilung. Folgende Abschätzung für die Tailfunktion vermittelt jedoch einen guten Eindruck über deren Abfallen: Es gilt für  $X \sim N(0, 1)$  und  $x > 0$

$$\frac{1}{x + 1/x} \phi(x) < \mathbb{P}(x \leq X) = 1 - \Phi(x) < \frac{1}{x} \phi(x). \quad (6.8)$$

Um das rasche Abfallen der Tailfunktion einer normalverteilten Zufallsvariablen  $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$  zu illustrieren, betrachten wir auch folgende Tabelle die Werte für die Normalverteilung mit der Abschätzung aus der Chebychev'schen Ungleichung ( $\mathbb{P}(|Z - \mu| > k\sigma) \leq 1/k^2$ ) vergleicht:

$$\begin{array}{ll} \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq \sigma) \leq 1 & \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq \sigma) = 0.32 \\ \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 2\sigma) \leq 0.25 & \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 2\sigma) = 0.046 \\ \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 3\sigma) \leq 0.11 & \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 3\sigma) = 0.0027 \\ \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 4\sigma) \leq 0.06 & \mathbb{P}(|Z - \mu| \geq 4\sigma) = 0.00006. \end{array} \quad (6.9)$$

Grob wird dieses starke Abfallen auch wie folgt ausgedrückt: Ist eine Größe normalverteilt, so liegen etwa 70% innerhalb einer Standardabweichung, etwa 95% innerhalb von zwei Standardabweichungen und etwa 99.7% innerhalb von drei Standardabweichungen um den Mittelwert.

**Beispiel 6.9.** Angenommen zwei Rasensorten  $A$  und  $B$  werden zu gleichen Anteilen gesät wobei die Halme von  $A \sim N(10, 1.0^2)$  und die Halme von  $B \sim N(10, 1.5^2)$ . Von den Halmen die kürzer als 7 cm sind stammen (nach Bayes)

$$\frac{0.046}{0.046 + 0.0027} \approx 95\%$$

von Sorte  $B$ . (Wird die Länge 5.5 cm betrachtet, sind mehr als 99% von Sorte  $B$ , etc.)

Das Modell ist insofern nicht realistisch, als dass es suggeriert, dass es Halme negativer Länge gäbe. Andererseits betrifft das auch bei Sorte  $B$  weniger als einen von  $10^{10}$  Halmen.

## 6.5 Charakteristische Funktion

**Definition 6.10.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Werten in  $\mathbb{R}$ . Dann ist die charakteristische Funktion definiert durch

$$\phi_X(\theta) = \phi(\theta) = \mathbb{E}(\exp(i\theta X)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta x} f(x) dx; \theta \in \mathbb{R}.$$

Weiters ist die momentenerzeugende Funktion definiert durch

$$G_X(z) = G(z) = \mathbb{E}(\exp(zX)) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{zx} f(x) dx; z \in \mathbb{R}$$

für alle  $z$  für die dieses Integral existiert.

Für theoretische Überlegungen ist es meist einfacher mit der charakteristischen Funktion zu arbeiten, da das definierende Integral stets auf ganz  $\mathbb{R}$  definiert ist. Wegen

$$G(i\theta) = \phi(\theta)$$

ist es in vielen Fällen natürlich egal mit welchem Konzept man arbeitet.

Die folgenden Eigenschaften der charakteristischen Funktion sind leicht zu sehen:

**Proposition 6.11.** 1.  $\phi_X(0) = 1$ ,  $|\phi_X| \leq 1$ .

2.  $\theta \rightarrow \phi_X(\theta)$  ist stetig.

3.  $\phi(-X)(\theta) = \overline{\phi_X(\theta)}$ .

4.  $\phi_{aX+b}(\theta) = e^{i\theta b} \phi_X(a\theta)$ .

5. Falls  $X$  und  $Y$  unabhängig sind, so gilt  $\phi_{X+Y} = \phi_X \cdot \phi_Y$ .

**Beispiel 6.12.** Sei  $X$  gleichverteilt auf  $[0, a]$ . Dann ist die momentenerzeugende Funktion durch

$$G(z) = \frac{1}{a} \int_0^a e^{zx} dx = \begin{cases} \frac{e^{za}-1}{az} & (z \neq 0) \\ 1 & (z = 0) \end{cases}$$

gegeben.

**Beispiel 6.13.** Sei  $X$  exponentialverteilt mit Parameter  $\lambda \geq 0$ . Dann ist die momentenerzeugende Funktion durch

$$G(z) = \int_0^\infty e^{zx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \begin{cases} \frac{\lambda}{\lambda-z} & z < \lambda \\ \infty & z \geq \lambda \end{cases}$$

gegeben.

Wir weisen auf einige elementare Eigenschaften hin.

**Proposition 6.14.** Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit  $G(z) < \infty$  für alle  $z \in (-\theta, \theta)$ , wobei  $\theta > 0$ . Dann ist  $G(0) = 1$ . Außerdem gilt  $\mathbb{E}(X^n) < \infty$  für jedes  $n = 0, 1, \dots$  und

$$G(z) = 1 + z\mathbb{E}(X) + \frac{z^2}{2!}\mathbb{E}(X^2) + \dots$$

Insbesondere gilt

$$\mathbb{E}(X^n) = G^{(n)}(0)$$

für jedes  $n \geq 0$ .

*Beweis.* (Skizze). Wir können die Taylorentwicklung der Exponentialfunktion verwenden, um zu erhalten, dass

$$e^{zX} = 1 + zX + \frac{z^2}{2!}X^2 + \dots$$

Wir nehmen auf die beiden Seite Erwartungswerte und erhalten

$$G(z) = 1 + z\mathbb{E}(X) + \frac{z^2}{2!}\mathbb{E}(X^2) + \dots$$

wie gewünscht. Aufgrund unserer Annahme  $G(z) < \infty$  für  $z \in (-\theta, \theta)$  können wir Erwartungswert und Summation vertauschen und erhalten  $\mathbb{E}[\sum_n z^n X^n/n!] = \sum_n z^n \mathbb{E}(X^n)/n!$ .  $\square$

Im diskreten Fall, wird die Verteilung einer ganzzahligen Zufallsvariable von der erzeugenden Funktion bestimmt: d.h., zwei Verteilungen  $p_k$  und  $\tilde{p}_k$  sodass

$$m(z) = \tilde{m}(z)$$

(wobei  $m(z) = \sum_k p_k z^k$  und  $\tilde{m}(z) = \sum_k \tilde{p}_k z^k$ ) müssen gleich sein:  $p_k = \tilde{p}_k$  für jedes  $k \geq 0$  weil  $p_k = m^{(k)}(0)/k!$ .

Tatsächlich, gilt diese Folgerung auch im allgemeinen Fall. Das ist aber ein tiefer Satz, dessen Beweis wir weglassen. (Weiter unten, bei charakteristischen Funktionen werden wir ein Argument bringen.)

**Satz 6.15.** Seien  $X, \tilde{X}$  zwei Zufallsvariablen mit  $G(z) = \tilde{G}(z)$  für alle  $z \in (-\theta, \theta)$ . Dann sind die Verteilungen von  $X$  und  $\tilde{X}$  gleich: d.h.,  $\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(\tilde{X} \in A)$  für jede Menge  $A \subset \mathbb{R}$ .

Das Pendant für die charakteristische Funktion ist:

**Satz 6.16** (Levys Umkehrformel). Wir bezeichnen mit  $\phi$  und  $F$  die charakteristische Funktion bzw. die Verteilungsfunktion einer Zufallsvariablen. Dann läßt sich die Verteilungsfunktion aus der charakteristischen Funktion rekonstruieren: Für  $a, b \in \mathbb{R}$  gilt

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-i\theta a} - e^{-i\theta b}}{i\theta} \phi(\theta) d\theta = \frac{F(b) + F(b-)}{2} - \frac{F(a) + F(a-)}{2}. \quad (6.10)$$

*Beweisskizze.* Indem wir in die linke Seite von (6.10) die Definition für die charakteristische Funktion einsetzen erhalten wir

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\theta=-T}^T \frac{e^{-i\theta a} - e^{-i\theta b}}{i\theta} \int_{x \in \mathbb{R}} e^{i\theta x} d\theta = \int_{x \in \mathbb{R}} \underbrace{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{\theta=-T}^T \frac{e^{i\theta(x-a)} - e^{i\theta(x-b)}}{i\theta} d\theta}_{=:g(a,b)} dx,$$

wobei wir uns hier ersparen wollen, formal zu rechtfertigen, wieso man die Integrationsreihenfolge vertauschen und den Grenzwert unter das Integral ziehen darf.

Um  $g(a, b)$  zu berechnen, verwendet man die Identität  $e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$ . Weil die Funktion  $\cos(t)/t$  ungerade ist und das Intervall  $[-T, T]$  symmetrisch ist, kann man  $g$  leicht berechnen, in dem man die Identität

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{t=-T}^T \sin(t)/t dt = \pi$$

verwendet. Damit erhalten wir dann

$$g(a, b) = \begin{cases} 0 & x \notin [a, b] \\ 1/2 & x \in \{a, b\} \\ 1 & x \in (a, b), \end{cases}$$

d.h.  $g$  ist fast die Indikatorfunktion des Intervalls  $(a, b]$ . Der Satz folgt nun unmittelbar.  $\square$

**Beispiel 6.17.** Sei  $X$  normalverteilt  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Dann ist die momentenerzeugende Funktion von  $X$  gegeben durch

$$G_X(z) = e^{\mu z + \frac{1}{2} z^2 \sigma^2}.$$

Um das zu sehen, rechnen wir

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[e^{zX}] &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{zx} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
 &= \left| \begin{array}{l} y = (x - \mu)/\sigma \\ dy = dx/\sigma \end{array} \right| \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{z(\mu+\sigma y)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= e^{z\mu + \frac{1}{2}\sigma^2 z^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-z\sigma)^2}{2}} dy = e^{\mu z + \frac{1}{2}z^2\sigma^2}.
 \end{aligned}$$

Wir erhalten unmittelbar:

**Satz 6.18.** *Seien  $X, Y$  unabhängig,  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ . Dann gilt  $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ .*

*Sei  $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$  und  $\alpha \in \mathbb{R}_+$ . Dann gilt  $\alpha Z \sim N(\alpha\mu, (\alpha\sigma)^2)$ .*

## 6.6 Schwache Konvergenz

**Definition 6.19.** *Seien  $\mu_n, \mu, n \geq 1$  Wahrscheinlichkeitsmaße auf  $\mathbb{R}$ . Schwache Konvergenz, auch Konvergenz in Verteilung (englisch: ‘weak convergence’) bedeutet dann, dass*

$$\int h d\mu_n \rightarrow \int h d\mu$$

für jede beschränkte stetige Funktion  $h$ . In Zeichen drücken wir das durch

$$\mu_n \Longrightarrow_w \mu$$

aus. Die schwache Konvergenz von Zufallsvariablen und Verteilungsfunktionen wird entsprechend definiert.

Unmittelbar einsichtig ist:

**Lemma 6.20.** *Seien  $(X_n)_n$  Zufallsvariablen sodass  $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$  fast sicher (oder auch nur in Wahrscheinlichkeit). Dann gilt  $X_n \Longrightarrow_w X$ .*

Die Umkehrung dieses Lemmas gilt natürlich nicht!

Wir können schwache Konvergenz auch leicht direkt über die Verteilungsfunktionen ausdrücken:

**Lemma 6.21.** *Seien  $F_n, F, n \geq 1$  Verteilungsfunktionen. Dann gilt  $F_n \Longrightarrow_w F$  genau dann wenn  $F_n(x) \rightarrow F(x)$  in jeder Stetigkeitsstelle  $x$  der Verteilungsfunktion  $F$ .*

Die eine Richtung der obigen Äquivalenz ist leicht, die andere folgt aus dem folgenden Satz.

**Satz 6.22** (Darstellungssatz von Skorokhod). *Seien  $\mu_n, \mu, n \geq 1$  Wahrscheinlichkeitsmaße auf  $\mathbb{R}$  sodass  $\mu_n \Rightarrow_w \mu$ . Dann gibt es Zufallsvariablen  $X_n, X, n \geq 1$  auf einem geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum, sodass  $X_n \sim \mu_n, X \sim \mu, n \geq 1$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$  fast sicher.*

*Beweisidee.* Wir betrachten zur Verteilungsfunktion  $F$  von  $\mu$  die Quantilfunktion  $q : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$q(u) := \inf\{t : F(t) \geq u\},$$

die wir als Zufallsvariable auf dem Wahrscheinlichkeitsraum  $([0, 1], \lambda)$  interpretieren. Dann gilt  $q \sim X$  und wenn wir  $q_n$  analog definieren auch  $q_n \sim X_n$ . Aus der Konvergenz in Verteilung erhält man dann leicht die  $\lambda$ -fast sichere Konvergenz  $q_n \rightarrow q$ .  $\square$

**Satz 6.23** (Satz von Helly-Bray). *Sei  $(F_n)_n$  eine Folge von Verteilungsfunktionen. Dann gibt es eine Teilfolge  $(F_{n_k})_k$  und eine wachsende rechtsstetige Funktion  $F$  sodass  $F_{n_k} \rightarrow F$  in allen Stetigkeitsstellen der Funktion  $F$ .*

*Beweis.* Das folgt leicht indem eine abzählbare dichte Teilmenge von  $\mathbb{R}$  betrachtet und diagonalisiert.  $\square$

**Definition 6.24.** *Eine Familie  $(\mu_n)$  von Wahrscheinlichkeitsmaßen heisst straff (“tight”) falls es für jedes  $\varepsilon > 0$  eine kompakte Menge  $K$  gibt, sodass für alle  $n$*

$$\mu_n(K) \geq 1 - \varepsilon.$$

Den Begriff verwendet man natürlich sinngemäß auch für Verteilungsfunktionen und Zufallsvariablen.

**Beispiel 6.25.** Sei  $(X_n)_n$  eine Folge von Zufallsvariablen mit  $\sup_n \mathbb{E}|X_n| < \infty$ . Dann ist die Folge straff.

Aus dem Satz von Helly-Bray folgt offenbar:

**Satz 6.26.** *Sei  $(F_n)_n$  eine straffe Folge von Verteilungsfunktionen. Dann gibt es eine Teilfolge  $(F_{n_k})_k$  und eine Verteilungsfunktion  $F$  sodass  $F_{n_k} \rightarrow F$  in allen Stetigkeitsstellen von  $F$ .*

## 6.7 Der zentrale Grenzverteilungssatz

Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig identisch verteilt mit Mittel 0 (oBdA) und Varianz  $\sigma^2$ . Dann hat die Zufallsvariable

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{n}} =: S_n/\sqrt{n} \tag{6.11}$$

wieder Mittel 0 und Varianz  $\sigma^2$ . Aus Satz 6.3 wissen wir: Falls zusätzlich  $X_1, \dots, X_n \sim N(0, \sigma^2)$ , dann ist auch  $S_n/\sqrt{n}$  normalverteilt und mithin gilt

$$S_n/\sqrt{n} \sim N(0, \sigma^2). \tag{6.12}$$

Der zentrale Grenzverteilungssatz besagt, dass (6.12) ohne Normalverteilungsannahme immerhin noch approximativ stimmt. Genauer gilt folgendes:

**Satz 6.27** (zentraler Grenzwertungssatz). Sei  $X_1, X_2, \dots$  eine Folge unabhängig identisch verteilter Zufallsvariablen mit Mittel 0 und endlicher Varianz  $\sigma^2$ . Bezeichne  $S_n := X_1 + \dots + X_n$ . Dann gilt für alle  $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \leq x \right) = \Phi(x), \quad (6.13)$$

wobei  $\Phi$  die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet.

Wir machen einige Bemerkungen zur Aussage des Grenzwertungssatzes vor dem Beweis:

1. Falls die  $X_i$  nicht zentriert sind, d.h. wir  $\mathbb{E}X_i \neq 0$  zulassen, wird die Aussage des Grenzwertungssatzes zu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x \right) = \Phi(x) \quad (6.14)$$

2. Die Gleichung (6.14) sagt aus, dass die Verteilung von  $S_n$  ungefähr  $N(n\mu, n\sigma^2)$  ist. Zum Beispiel ist (6.13) offenbar äquivalent zu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( a < \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} \leq b \right) = \Phi(b) - \Phi(a),$$

und es kommt nicht darauf an, ob man hier mit den Zeichen  $<$  oder  $\leq$  arbeitet. (Das folgt aus der Stetigkeit von  $\Phi$ .)

3. Die Konvergenz in (6.13) besagt gerade, dass die Verteilungsfunktionen  $F_n$  von  $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$  punktweise gegen die Verteilungsfunktion  $\Phi$  der Standardnormalverteilung konvergieren.

Aus der schwachen Konvergenz folgt natürlich die Konvergenz der charakteristischen Funktionen. Der Beweis des zentralen Grenzwertsatzes basiert auf folgender Umkehrung:


**Satz 6.28** (Lévy's Stetigkeitssatz). Seien  $X_1, X_2, \dots$  Zufallsvariablen deren charakteristische Funktionen  $\phi, \phi_1, \phi_2, \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \phi_n(\theta) = \phi(\theta).$$

erfüllen. Falls  $\{P_{X_n}\}_n$  straff ist, dann konvergiert  $X_1, X_2, \dots$  in Verteilung.

(Genauer kann man zeigen, dass  $\{P_{X_n}\}_n$  genau dann schwach konvergiert, wenn die Grenzfunktion der charakteristischen Funktionen existiert und in einer Umgebung der 0 stetig ist.)

*Beweis.* Angenommen,  $X_1, X_2, \dots$  konvergiert nicht in Verteilung. Aus der Straffheit folgt, dass es zwei Teilfolgen  $(X_{n_k})_k, (X_{m_k})_k$  und  $X^a, X^b$  mit unterschiedlichen Verteilungen gibt, sodass  $X_{n_k} \rightarrow X, X_{m_k} \rightarrow X^b$ . Aus Lévy's Umkehrformel folgt, dass  $X^a$  und  $X^b$  unterschiedliche charakteristische Funktionen haben, das heißt, es gibt ein  $\theta$  mit  $\phi_a(\theta) \neq \phi_b(\theta)$ . Das widerspricht aber  $\lim \phi_{X_n}(\theta) = \phi(\theta)$ .  $\square$



**Abbildung 10:** Größenverteilung für Frauen und Männer in den USA, und Verteilung der Punktzahlen in SAT.

*Beweis des zentralen Grenzwertsatzes.* Die charakteristische Funktion  $\phi$  von  $X_k$  erfüllt

$$\begin{aligned} \phi(z) &= \mathbb{E}[e^{i\theta X_k}] \\ &= 1 + i\theta\mathbb{E}[X_k] + \frac{1}{2!}(i\theta)^2\mathbb{E}[X_k^2] + \frac{1}{3!}(i\theta)^3\mathbb{E}[X_k^3] + \dots \\ &= 1 - \frac{\sigma^2}{2!}\theta^2 + o(z^2). \end{aligned}$$

Damit erhalten wir für die charakteristische Funktion von  $S_n/(\sigma\sqrt{n})$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[e^{i\theta\frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}}}\right] &= \mathbb{E}\left[e^{i\theta\frac{X_1+\dots+X_n}{\sigma\sqrt{n}}}\right] \\ &= \left(\mathbb{E}\left[e^{i\theta\frac{X_1}{\sigma\sqrt{n}}}\right]\right)^n \\ &= \left(\phi\left(\frac{\theta}{\sigma\sqrt{n}}\right)\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{\sigma^2}{2!}\left(\frac{\theta}{\sigma\sqrt{n}}\right)^2 + o(1/n)\right)^n \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2n} + o(1/n)\right)^n \rightarrow e^{-\theta^2/2}, \end{aligned}$$

was gerade die charakteristische Funktion der Standardnormalverteilung ist. Mittels des Satzes 6.28 ist der Beweis komplett.  $\square$

## 6.8 Beispiele und Anwendungen

Wenn eine Größe die Summe von vielen kleinen Zufallseffekten ist, erwarten wir aus dem Satz 6.27, dass sie ungefähr normalverteilt ist. Betrachten Sie zum Beispiel die Verteilung der Körpergröße innerhalb einer Population, oder die Verteilung der Punktzahlen in der SAT Prüfung.

Wir bringen noch einige weitere Beispiele:

**Beispiel 6.29.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig Bernoulli ( $p$ ) verteilt (d.h.  $\mathbb{P}(X_i = 1) = p = 1 - \mathbb{P}(X_i = 0)$ .) Wir möchten  $p$  schätzen. Sei  $\hat{p}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ . Wie groß sollten wir  $n$  wählen, sodass  $|\hat{p}_n - p| \leq \varepsilon := 3\%$  mit zumindest 95.4% Wahrscheinlichkeit?

(Dies ist die Situation, die wir für Umfragen analysieren sollten.)

Nach dem zentralen Grenzwertungssatz erhalten wir

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\hat{p}_n - p| \geq \varepsilon) &\approx \mathbb{P}(|N(0, \sigma^2/n)| \geq \varepsilon) \\ &= \mathbb{P}(|N(0, 1)| \geq \frac{\varepsilon\sqrt{n}}{\sigma}) \end{aligned}$$

wobei  $\sigma^2 = \text{Var}(X_1) = p(1-p) \leq 1/4$ . Deshalb gilt

$$\mathbb{P}(|\hat{p}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \mathbb{P}(|N(0, 1)| \geq 2\varepsilon\sqrt{n})$$

Die Größe auf der rechten Seite ist kleiner gleich 4.6% wenn  $2\varepsilon\sqrt{n} \geq 2$  (siehe (6.9)). Äquivalent dazu erhalten wir

$$n \geq \lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \rceil = 1,112.$$

Wenn wir die *Toleranz* auf 5% setzen (statt 4.6%), dann ergibt sich  $2\varepsilon\sqrt{n} \geq q$ , wobei

$$\int_{-q}^q e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} = 5\%; \quad q \approx 1.96.$$

Diese Bedingung ist äquivalent zu  $n \geq 1,068$ . Dies ist typisch für die Stichprobengröße und Fehlerspanne, die in kommerziellen Umfragen verwendet wird. Um die Frage komplett rigoros zu beantworten müssten wir auch die Fehler bei der Anwendung des zentralen Grenzwertungssatzes schätzen. In der *wirklichen* Wirklichkeit gibt es viele anderen Sorten von Fehlern wie z.B. Stichprobenverzerrung.

**Beispiel 6.30. Irrfahrt auf  $\mathbb{Z}$ .** Sei  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ , wobei  $X_i = \pm 1$  mit Wahrscheinlichkeit  $1/2$  und unabhängig sind.  $S_n$  ist die Position zum Zeitpunkt  $n$  der (symmetrischer) Irrfahrt auf  $\mathbb{Z}$ . Nach dem zentralen Grenzwertungssatz erhalten wir


$$\frac{S_n}{\sqrt{n}} \Rightarrow_D N(0, 1)$$

wenn  $n \rightarrow \infty$ . Das heißt, nach  $n$  Schritten ist die Position des Teilchens ungefähr  $\pm\sqrt{n}$  (Größenordnung), und ihre Verteilung ungefähr die Standardnormalverteilung. Wir sagen, dass die Irrfahrt sich *diffus* ausbreitet.

Diese Tatsache ist ein grundlegendes Naturgesetz (das sogenannte Ficks'sche Gesetz in der Physik). Sie ist tief verbunden mit Eigenschaften der Wärmeleitungsgleichung (heat equation)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta u$$

die sich auch diffus ausbreitet. Um mehr über dieses Thema zu erfahren sollten Sie mehr über Stochastische Prozessen und insbesondere die *Brownsche Bewegung* lernen.



**Abbildung 11:** Einige Stichproben der symmetrischen Irrfahrt, im Vergleich zu  $n \mapsto \pm\sqrt{n}$ .

## 7 Einführung in die Statistik

Ein gute Einführung in die mathematische Statistik bietet [3].

### 7.1 Was ist Statistik?

Die Statistik befasst sich mit der *Datenanalyse*: der Verwendung von Daten, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Es geht um Fragen wie “Was sagen mir diese Daten?”. Wir untersuchen in diesem Kurs mathematische Techniken zur Schätzung von Parametern, Anpassung von Modellen und dem Testen von Hypothesen.

**Beispiel 7.1.** Eine berühmte Studie untersuchte die Auswirkungen auf Herzinfarkte durch die Einnahme eines Aspirins jeden zweiten Tag. Die Ergebnisse nach 5 Jahren waren

Gruppe	Herzinfarkte	Keine Herzinfarkte	Herzinfarkte pro 1000
Aspirin	104	10,933	9.42
Placebo	189	10,845	17.13

Was können wir daraus schließen? Wie sicher sind wir uns bei unserer Schlussfolgerung?

**Beispiel 7.2.** Steigen die Hauspreise linear mit der Zeit? Nehmen wir an, dass wir einige Hauspreise  $(x_i, y_i)_{i=1}^n$  beobachten, wobei  $y_i$  die Preise bezeichnen und  $x_i$  den entsprechenden Monat.

Ist es sinnvoll dass

$$y_i = \alpha + \beta x_i + \text{Fehler?}$$

Wenn ja, wie sollen wir  $\alpha$  und  $\beta$  schätzen?




Abbildung 12: Scatterplot einiger Hauspreise in Oxford

**Unterschied zwischen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik.** Für die meisten Leute sind die zwei Begriffe fast Synonyme. Es gibt jedoch einen großen Unterschied. In der Wahrscheinlichkeitstheorie nehmen wir an, dass die Verteilungen der Zufallsvariablen gegeben sind. Wir arbeiten dann ihre Eigenschaften aus. Im Gegensatz dazu, haben wir in der Statistik *Daten*, von denen wir annehmen, dass sie aus einem unbekanntem Wahrscheinlichkeitsmodell  $\mathbb{P}$  generiert wurden. Wir möchten in der Lage sein, einige nützliche Dinge über  $\mathbb{P}$  zu sagen; etwa welches Modell  $\mathbb{P}$  die Daten am besten beschreibt.

In der Praxis geht Statistik über Mathematik hinaus. Um komplexe Daten zu verstehen braucht man nicht nur mathematische Kenntnisse, sondern auch gesunden Menschenverstand zusammen mit guter Intuition: Datenanalyse kann eine subtile Kunst sein, und kann sogar philosophische Fragen aufwerfen. Diese Aspekte werden uns jedoch natürlich nicht betreffen, und wir werden nur bei der Mathematik bleiben.

## 7.2 Empirische Verteilungsfunktion

Vor allem von theoretischem Interesse ist die Frage ob man die Verteilung einer Zufallsvariable schätzen kann, falls man beliebig viele Realisierungen beobachten kann.

Gegeben sei eine Folge  $X_1, X_2, \dots$  von unabhängig verteilten Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion  $F$ . Wir definieren dann die *empirische Verteilungsfunktion*

$$\hat{F}_n(t) = \frac{\text{Anzahl der Elemente im Sample } \leq t}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} I_{X_i \leq t}.$$

Dann gilt  $\mathbb{E}\hat{F}_n(t) = \mathbb{P}(X_1 \leq t) = F(t)$  und  $\text{Var}(\hat{F}_n(t)) = \text{Var} I_{X_1 \leq t}/n$ . Weil  $I_{X_1 \leq t}, I_{X_2 \leq t}, \dots$  unabhängig sind, gilt nach dem starken Gesetz der großen Zahlen, dass

$$\hat{F}_n(t) \rightarrow F(t).$$

Der sogenannte Satz von Glivenko-Cantelli besagt, dass diese Konvergenz sogar gleichmäßig ist.

Da alle Eigenschaften, die wir in der Wahrscheinlichkeitstheorie betrachten nur von der Verteilung (bzw. Verteilungsfunktion) abhängen ist es, vom theoretischen Standpunkt, befriedigend, dass wir die Verteilung beliebig genau annähern können, wenn wir ein Experiment nur oft genug wiederholen.

In der Praxis nimmt man jedoch meist an, dass man bestimmte Informationen über die grundsätzliche Form der Verteilung hat und die eigentliche Verteilung dann schon über bestimmte Parameterwerte festgelegt wird. Entsprechend ist es dann ausreichend, diese Parameter zu schätzen. Das wichtigste Verfahren dafür wird im nächsten Kapitel diskutiert.

### 7.3 Maximum-Likelihood Schätzung

**Rahmen** Eine Zufallsvariable  $X \in \mathbb{R}^d$  hat Verteilung  $\mathbb{P}_\theta$ , wobei  $\theta \in \Theta$  ein uns unbekannter Parameter ist. Hier ist  $\Theta$  die Menge aller möglichen Parameter (die wir normalerweise als bekannt annehmen). Die Verteilung  $\mathbb{P}_\theta$  kann diskret oder stetig (oder etwas exotischer) sein. Unser Ziel ist  $\theta$  zu schätzen gegeben, dass wir unabhängig, identisch verteilte Zufallsvariablen  $X_1, \dots, X_n$  beobachtet haben, die jeweils die Verteilung  $\mathbb{P}_\theta$  haben. Wenn der Parameter aus dem Kontext klar ist, werden wir ihn weglassen. Andererseits wollen wir manchmal betonen, dass ein Erwartungswert bezüglich  $\mathbb{P}_\theta$  berechnet wird und schreiben dann  $\mathbb{E}_\theta$ .

**Beispiel 7.3** (Umfrage).  $\mathbb{P}_\theta$  könnte die Bernoulli ( $\theta$ ) Verteilung sein. Hier ist  $\Theta = [0, 1]$ . Gegeben ist  $(X_1, \dots, X_n) \in \{0, 1\}^n$  (wobei  $x = 1$  ‘ja’ und  $x = 0$  ‘nein’ entspricht) wie sollen wir  $\theta = \mathbb{P}_\theta(X_i = 1)$  schätzen?

**Beispiel 7.4** (Glühbirne).  $\mathbb{P}_\theta$  könnte die Exponentialverteilung mit Parameter  $\theta > 0$  sein (hier ist  $\Theta = (0, \infty)$ ). Zum Beispiel sind  $X_1, \dots, X_n$  die Zeiten zwischen aufeinanderfolgenden Erneuerungen einer Glühbirne und unser Ziel ist  $\theta$  (oder  $1/\theta = \mathbb{E}_\theta(X_i)$ ) zu schätzen.

**Beispiel 7.5.** Die Verteilung könnte  $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$  sein. Hier ist  $\Theta = \{(m \in \mathbb{R}, \sigma \in \mathbb{R})\}$ . Bemerken Sie dass  $\mathbb{P}_{(m, \sigma)} = \mathbb{P}_{(m, -\sigma)}$  es kann also sein, dass  $\theta$  nicht eindeutig ist.

Seien  $(X_1, \dots, X_n)$  unsere Beobachtungen. Wir halten  $\mathbf{x} = (X_1, \dots, X_n)$  fest. Sei

$$f(\mathbf{x}; \theta)$$

die gemeinsame Dichtefunktion/Wahrscheinlichkeitsfunktion von  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$  für den Parameter  $\theta$ . Manchmal schreibt man auch  $f(\mathbf{x}|\theta)$  statt  $f(\mathbf{x}; \theta)$ . Wichtig ist, dass wir  $f(\mathbf{x}; \theta)$  als Funktion von  $\theta \in \Theta$  auffassen.

**Definition 7.6.** Die Likelihood Funktion ist die Funktion

$$\theta \in \Theta \mapsto L(\theta) = f(\mathbf{x}; \theta).$$

Die log Likelihood ist die Funktion  $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ .

Die Likelihood und log-Likelihood Funktionen hängen natürlich von unseren Beobachtungen  $\mathbf{x}$  ab. Aber wie gesagt halten wir sie fest, während  $\theta$  variiert.

**Definition 7.7.** Der Maximum-Likelihood-Schätzer (MLS) ist der Wert  $\hat{\theta}$ , der  $L(\theta)$  maximiert (sofern er wohldefiniert ist):

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$

Das heißt,  $\hat{\theta}$  ist der Wert, für den die Beobachtungen  $\mathbf{x} = (X_1, \dots, X_n)$  am wahrscheinlichsten sind.

**Beispiel 7.8.** Im Umfragebeispiel hat man

$$L(\theta) = \theta^s (1 - \theta)^{n-s}$$

wobei  $s = s(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i$ . D.h.,

$$\ell(\theta) = s \log \theta + (n - s) \log(1 - \theta).$$

In dem man differenziert, erhält man

$$\frac{s}{\hat{\theta}} = \frac{n - s}{1 - \hat{\theta}},$$

oder

$$s(1 - \hat{\theta}) = (n - s)\hat{\theta};$$

d.h.

$$\hat{\theta} = s/n = \bar{x}_n.$$

**Beispiel 7.9.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig nach  $N(\mu, \sigma^2)$  verteilt, wobei die Parameter  $\mu, \sigma^2$  unbekannt sind. Die Likelihood ist

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i \leq n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (7.1)$$

$$= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i \leq n} (x_i - \mu)^2}. \quad (7.2)$$

Die entsprechende log-Likelihood ist dann

$$l(\mu, \sigma^2) = \text{const.} - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i \leq n} (x_i - \mu)^2. \quad (7.3)$$

Für die Ableitungen erhalten wir

$$\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i \leq n} (x_i - \mu) \quad (7.4)$$

$$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i \leq n} (x_i - \mu)^2. \quad (7.5)$$

Nullsetzen liefert uns

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} x_i = \bar{x}_n \quad (7.6)$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} (x_i - \hat{\mu})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} (x_i - \bar{x}_n)^2. \quad (7.7)$$

Ist  $\sigma^2$ , bekannt ist  $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} x_i = \bar{x}_n$  ebenfalls der MLE. Ist  $\mu$  bekannt, so ist  $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i \leq n} (x_i - \mu)^2$  der MLE.

## 7.4 Abstrakter Blickwinkel auf Parameterschätzung

**Definition 7.10.** *Formal ist eine Statistik eine Funktion  $T$  auf  $\mathbb{R}^n$ .*

*Typischer Weise denken wir wieder, dass  $(X_1, \dots, X_n)$  ein Zufallsvektor ist, den wir beobachten. Wenn wir von einer Statistik reden, stellen wir uns typischer Weise vor, dass wir eine Zuordnung haben, die einem Ausgang  $\mathbf{x}$  von  $(X_1, \dots, X_n)$  den Wert  $T(\mathbf{x})$  zuordnet.*

Ein typisches Beispiel für eine Statistik ist das Stichprobenmittel  $T(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n$ .

**Definition 7.11.** *Seien wieder  $X_1, \dots, X_n$  Zufallsvariablen, deren Verteilung durch einen Parameter  $\theta$  beschrieben wird. Ein Schätzer für  $\theta$  ist dann eine beliebige Statistik  $T$  die wir verwenden um  $\theta$  zu schätzen.*

Das für uns wichtigste Beispiel eines Schätzers ist der MLE den wir im letzten Kapitel kennengelernt haben.

Heuristisch ist  $T$  ein guter Schätzer, wenn er Werte nahe am tatsächlichen Parameter annimmt. Wir werden uns bald damit beschäftigen, dass zu formalisieren.

**Definition 7.12.** *Seien  $X_1, \dots$  Zufallsvariablen deren Verteilung durch  $\theta \in \Theta$  parametrisiert wird. Eine Folge von Schätzern  $T_n : \mathbb{R}^n \rightarrow \Theta$  heißt konsistent falls*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(X_1, \dots, X_n) = \theta \quad (7.8)$$

*in Wahrscheinlichkeit.*

*Meist ist aus dem Kontext klar, wie  $T_n$  von  $n$  abhängt und man spricht nur von der Konsistenz von  $T$ .*

In der Situation von Beispiel 7.9 gilt nach dem schwachen Gesetz der großen Zahlen

$$T(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n \rightarrow \mu.$$

Der MLE ist in vielen Fällen konsistent.

**Definition 7.13.** *Gilt  $\mathbb{E}T(X_1, \dots, X_n) = \theta$ , so nennen wir den Schätzer erwartungstreu / unverzerrt / unbiased andernfalls verzerrt / biased*

In Beispiel (7.9) gilt  $\mathbb{E}\hat{\mu}(X_1, \dots, X_n) = \mu$  aber  $\mathbb{E}\hat{\sigma}^2(X_1, \dots, X_n) = (n-1)\sigma^2/n$ . Der letzte Schätzer ist also biased aber immer noch *asymptotisch unbiased*.

**Definition 7.14.** Der bias eines Schätzers ist gegeben durch

$$b(T) = \mathbb{E}_\theta T(X_1, \dots, X_n) - \theta,$$

die mittlere quadratische Abweichung *MQA* (englisch *MSE*) durch

$$MQA(T) = \mathbb{E}_\theta (T(X_1, \dots, X_n) - \theta)^2.$$

Systematische Fehler sind offenbar eher unerwünscht. *MQA* ist ein einfaches Maß für die Qualität eines Schätzers.

**Satz 7.15.**  $MQA(T) = \text{Var}(T) + (b(T))^2$ .

*Beweis.* Wir schreiben  $\mu = \mathbb{E}T$ . Dann gilt

$$MQA(T) = \mathbb{E}((T - \mu) + (\mu - \theta))^2 \tag{7.9}$$

$$= \mathbb{E}((T - \mu)^2 + 2(\mu - \theta)(T - \mu) + (\mu - \theta)^2) \tag{7.10}$$

$$= \mathbb{E}(T - \mu)^2 + (\mu - \theta)^2 = \text{Var}(T) + (b(T))^2. \tag{7.11}$$

□

In Beispiel 7.3 haben wir uns mit Bernoulli( $\theta$ ) verteilten Zufallsvariablen  $X_1, X_2, \dots$  beschäftigt. Wir haben schon festgestellt, dass der MLS gerade das Stichprobenmittel war, d.h.

$$\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n.$$

Ein anderer möglicher Schätzer ist

$$\hat{\theta}'(x_1, \dots, x_n) := x_1/3 + 2x_2/3.$$

Beide Schätzer sind unbiased. Jedoch ist  $\hat{\theta}$  konsistent, während  $\hat{\theta}'$  das offenbar nicht ist.

Da beide Schätzer unbiased sind, ist die *MQA* jeweils gerade die Varianz:

$$MQA(\hat{\theta}) = \text{Var}(\bar{X}_n) = \text{Var}(X_1)/n = p(1-p)/n \tag{7.12}$$

$$MQA(\hat{\theta}') = \text{Var}(X_1/3 + 2X_2/3) = p(1-p)(1/9 + 4/9). \tag{7.13}$$

(Was uns wiederum nicht sehr überrascht.)

Gilt für eine Folge von Schätzern  $MQA(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$ , so ist sie offenbar konsistent.

Natürliche Fragen an dieser Stelle sind:

1. Wie schnell konvergieren gute Schätzer typischer Weise, d.h. wie schnell fällt  $MQA(\hat{\theta}_n)$  ab?
2. Wie findet man einen guten Schätzer, gibt es 'optimale' Schätzer. Ist der MLS ein guter Schätzer?

Wir geben nur ohne Beweis einige Resultate an, die Einblick bezüglich der obigen Fragen geben.

Ein wichtiges Resultat ist die sogenannte Cramér-Rao Schranke, die uns eine untere Schranke für die mögliche Güte eines Schätzers darstellt.

**Satz 7.16** (Cramér-Rao). *Seien  $X_1, \dots, X_n$  unabhängig identisch verteilt mit Dichte  $f(x; \theta)$ ,  $\theta \in \Theta$  mit  $\Theta \in \mathbb{R}$  offen. Bezeichne weiters*

$$I(\theta) := \mathbb{E}_\theta \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1; \theta) \right)^2 = \int \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x; \theta) \right)^2 f(x, \theta) dx$$

die zu  $X_1$  (bzw. zu  $f(\cdot; \theta)$ ) gehörige Fisher-Information.

Sei weiters  $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \Theta$  ein unverzerrter Schätzer. Dann gilt (unter milden Regularitätsvoraussetzungen an  $f$ )

$$\text{Var}_\theta(T) \geq \frac{1}{nI(\theta)}. \quad (7.14)$$

*Beweis.* Wir betrachten zuerst den Fall  $n = 1$  und definieren die Zufallsvariable

$$U_1(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1, \theta).$$

Falls ( $f_\theta$ ) hinreichend regulär ist, dass wir Integration und Differentiation vertauschen dürfen, erhalten wir

$$\mathbb{E}[U_1(\theta)] = \int \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x, \theta) f(x, \theta) dx = \int \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = \frac{\partial}{\partial \theta} \int f(x, \theta) dx = 0. \quad (7.15)$$

Damit folgt dann

$$\text{Var}[U_1(\theta)] = \mathbb{E}[U_1(\theta)^2] = \int \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x, \theta) \right)^2 f(x, \theta) dx = I(\theta). \quad (7.16)$$

Weil  $T$  unverzerrt ist, erhalten wir

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{\partial}{\partial \theta} \int T(x) f(x, \theta) dx = \int T(x) \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx = \int T(x) \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x, \theta) \right) f(x, \theta) dx \\ &= \mathbb{E}[TU_1(\theta)] = \text{Cov}[TU_1(\theta)] \leq \sqrt{\text{Var } T \text{Var } U_1(\theta)}, \end{aligned}$$

wobei wir im letzten Schritt die Cauchy-Schwarz Ungleichung verwendet haben. Es folgt  $\text{Var } T \geq 1/I(\theta)$ .

Für allgemeines  $n$  setzen wir für  $k \leq n$

$$U_k(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_k, \theta)$$

und  $U(\theta) = U_1(\theta) + \dots + U_n(\theta)$ .

Dann gilt

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[U(\theta)] &= 0 \\ \text{Var}[U(\theta)] &= n \text{Var}[U_1(\theta)] = nI(\theta). \\ 1 &= \int T(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial}{\partial \theta} \prod_{i \leq n} f(x_i, \theta) dx_1 \dots dx_n \\ &= \int T(x_1, \dots, x_n) \left( \sum_{i \leq n} \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x_i, \theta) \right) \prod_{i \leq n} f(x_i, \theta) dx_1 \dots dx_n = \text{Cov}[U(\theta)T]\end{aligned}$$

Die gewünschte Schranke folgt dann wieder wie oben. □

Um so etwas wie die ‘Norm’ eines Fehlers zu erhalten, sollten wir natürlich die Wurzel aus  $MQA(T)$  bzw.  $\text{Var}(T)$  nehmen. In diesem Sinn besagt (7.14), dass ein optimaler (unverzerrter) Schätzer stets einen Fehler der Größenordnung  $\frac{1}{\sqrt{n}}$  aufweisen wird.

Falls wir eine Schätzer finden, sodass in der Cramer-Rao Schranke Gleichheit gilt, haben wir offenbar einen bestmöglichen Schätzer identifiziert.

Wenn man sich auf geeignete Klassen von Dichten (‘exponentielle Familien’) einschränkt, kann man zeigen, dass der MLS asymptotisch unverzerrt ist und auch die Cramér-Rao Schranke asymptotisch annimmt.

## 7.5 Konfidenzintervalle

**Beispiel 7.17.** Prognose nach einer Wahl (exit poll): Aufgrund einer repräsentativen Stichprobe am Ausgang von Wahllokalen wir angegeben, dass etwa 32% aller Wähler\*innen für Partei A gestimmt haben. Weiters wird angegeben, dass das 95% Konfidenzintervall (29%, 35%) beträgt. *Wie ist das genau zu interpretieren?*

Ein wesentliches Ziel dieses Abschnitts ist es die obige Frage zu beantworten. Wir gehen zunächst von einem mathematisch einfacheren Beispiel aus:

**Beispiel 7.18.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  standardnormalverteilt nach  $N(\mu, \sigma^2)$  wobei  $\sigma$  bekannt ist und  $\mu$  aus einem sample geschätzt werden soll. Wie wir oben schon besprochen haben ist der MLS gerade

$$\hat{\mu}(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n.$$

Das Stichprobenmittel  $\bar{X}_n$  erfüllt

$$\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n) \tag{7.17}$$

$$\iff \bar{X}_n - \mu \sim N(0, \sigma^2/n) \tag{7.18}$$

$$\iff \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1). \tag{7.19}$$

Ist  $Z \sim N(0, 1)$ , so gilt  $\mathbb{P}(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95$ . Damit erhalten wir

$$\mathbb{P}\left(-1.96 < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < 1.96\right) = 0.95 \quad (7.20)$$

$$\iff \mathbb{P}\left(\bar{X}_n - 1.96\sigma/\sqrt{n} < \mu < \bar{X}_n + 1.96\sigma/\sqrt{n}\right) = 0.95 \quad (7.21)$$

$$\iff \mathbb{P}\left(\text{das Intervall } (\bar{X}_n \pm 1.96\sigma/\sqrt{n}) \text{ enthält } \mu\right) = 0.95. \quad (7.22)$$

D.h. wir erhalten ein *zufälliges* Intervall dessen Endpunkte aus der Zufallsvariable  $\bar{X}$  berechnet werden, sodass der Parameter  $\mu$  mit hoher Wahrscheinlichkeit im Intervall liegt.

**Definition 7.19.** Seien  $X_1, \dots, X_n$  nach  $\mathbb{P}_\theta$  verteilt. Sei weiter  $\alpha \in (0, 1)$  (typisch:  $\alpha = 0.05$ .) und seien zwei Statistiken  $a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)$  gegeben. Dann ist

$$(a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n))$$

ein Konfidenzintervall zum Konfidenzlevel  $1 - \alpha$  (also typisch  $1 - \alpha = 95\%$ ) falls für alle  $\theta$

$$\mathbb{P}_\theta(a(X_1, \dots, X_n) < \theta < b(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \alpha. \quad (7.23)$$

(Tatsächlich ist man in (7.23) natürlich zufrieden, sobald die linke Seite größer als die Rechte ist.)

Man nennt  $(a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n))$  dann ein  $100(1 - \alpha)\%$  Konfidenzintervall (typisch: 95% Konfidenzintervall).

Wir bemerken, dass  $a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)$  natürlich nicht vom Parameter  $\theta$  abhängen dürfen.

Im allgemeinen möchte man natürlich  $a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)$  so konstruieren, dass

1. die Länge von  $(a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n))$  klein ist, während
2. die Wahrscheinlichkeit  $\mathbb{P}_\theta(a(X_1, \dots, X_n) < \theta < b(X_1, \dots, X_n))$  groß ist.

Ist eine der Intervallgrenzen eines Konfidenzintervalls gleich  $\pm\infty$ , spricht man von einem *einseitigen* Konfidenzintervall.

**Beispiel 7.20** (Normalverteilungsapproximation des Binomialkonfidenzintervalls). Wir gehen wieder zurück zum Beispiel mit den exit polls. Angenommen insgesamt jede  $\mu$ -te Wähler\*in wählt Partei A. Wir modellieren das indem wir annehmen, dass  $X_1, X_2, \dots$  unabhängig Bernoulli-verteilt mit Parameter  $\mu$  sind. Der MLS für  $\mu$  ist

$$\hat{\mu}(X_1, \dots, X_n) = \bar{X}_n$$

und wir erhalten  $\text{Var}_\mu(\bar{X}_n) = \mu(1 - \mu)/n$ . Wie schon in Beispiel 6.29 approximieren wir die Binomialverteilung mit der Normalverteilung und erhalten für das 95% Konfidenzintervall

$$\begin{cases} 0.95 = \mathbb{P}(|\hat{\mu} - \mu| \leq \varepsilon) \approx & \mathbb{P}(|N(0, \mu(1 - \mu)/n)| \leq \varepsilon) \\ = & \mathbb{P}\left(|N(0, 1)| \leq \varepsilon/\sqrt{\mu(1 - \mu)/n}\right). \end{cases} \quad (7.24)$$

Indem wir wieder  $0.95 = \mathbb{P}(|N(0, 1)| \geq 1.96)$  beachten, erhalten wir aus (7.24)

$$\varepsilon / \sqrt{\mu(1 - \mu)/n} \approx 1.96. \quad (7.25)$$

Das heißt, wir erhalten, dass mit 95% Wahrscheinlichkeit

$$\mu \in \left( \hat{\mu} - 1.96 * \sqrt{\mu(1 - \mu)/n}, \hat{\mu} + 1.96 * \sqrt{\mu(1 - \mu)/n} \right).$$


Es handelt sich hier um *kein* Konfidenzintervall, da die beiden Intervallgrenzen noch vom Parameter  $\mu$  abhängen.

Um doch zu einem Intervall zu gelangen, kann man hier  $\mu$  durch den Wert Schätzwert  $\hat{\mu}$  ersetzen und bekommt das folgende ungefähre Konfidenzintervall

$$\left( \hat{\mu} - 1.96 * \sqrt{\hat{\mu}(1 - \hat{\mu})/n}, \hat{\mu} + 1.96 * \sqrt{\hat{\mu}(1 - \hat{\mu})/n} \right),$$

welches auch Standardintervall (zum level 95%) genannt wird.

Fragt man z.B. Beispiel  $n = 1003$  Menschen und erhält dass 321 Menschen Partei A gewählt haben, ergibt sich  $\hat{\mu} = 321/1003 = 32\%$  und ein Standardintervall von (29%, 35%).



**Abbildung 13:** Die Verwendung des Standard-Intervalls kann problematisch sein.

In der Abbildung ist als Beispiel die Überdeckungswahrscheinlichkeit für  $n = 400$  und  $p \in [0.125, 0.875]$  illustriert.

Bei gegebenem  $n$  hängt die Breite des Standardintervalls von  $\hat{\mu}$  ab und ist für  $\hat{\mu} = 1/2$  am größten. Wenn man garantieren will, dass die Schwankung höchstens  $\pm 3\%$  beträgt muß man also fordern, dass

$$1.96\sqrt{1/2(1 - 1/4)/n} \approx 0.03 \iff n \approx 1068.$$

Um eine ‘Schwankungsbreite’ von  $\pm 3\%$  zu erreichen, ist es also eine gute Idee rund 1100 Leute zu befragen.

### Interpretation von Konfidenzintervallen:

- Der Parameter  $\theta$  ist deterministisch aber unbekannt.
- Wenn wir unser Experiment erneut durchführen würden, bekämen wir neue Daten  $x'_1, \dots, x'_n$  und entsprechend ein neues Konfidenzintervall. Wenn wir unser Experiment 100 mal wiederholen, dann überdeckt das 95% Konfidenzintervall in (durchschnittlich) 95 Fällen den wahren Parameter.

**NICHT Interpretation:** Nachdem wir Daten  $x_1, \dots, x_n$  beobachtet haben, würden wir sehr gerne sagen, dass der wahre Parameter mit 95% Wahrscheinlichkeit im 95% Konfidenzintervall  $(a(x_1, \dots, x_n), b(x_1, \dots, x_n))$  liegt. Leider ist diese Interpretation nicht zulässig, der wahre Parameter ist *keine* Zufallsvariable.

Tatsächlich ist diese Art der Interpretation der *Bayes’schen Statistik* vorbehalten, in der man eine sogenannte *a priori* Verteilung auf den möglichen Werten des Parameters  $\theta$  vorgibt und nach Beobachtung der Daten dann ein *a posteriori* Verteilung des Parameters erhält. Zur Unterscheidung spricht man in der Bayes’schen Statistik von *Kredibilitätsintervallen*.

## 7.6 Lineare Regression

Erinnern Sie sich an das Beispiel 7.2, indem  $x_i$  die Monate und  $y_i$  die Hauspreise in Oxford bezeichneten. Hier ist unsere Vorstellung, dass


- $x_i$  die erklärende Variable ist, und
- $y_i$  die resultierende Variable.

**Beispiel 7.21.** Sei  $x$  = das BIP pro Kopf und  $y$  = die CO<sub>2</sub>-Emissionen pro Kopf in verschiedenen Ländern. Wie ändert sich  $y$  mit  $x$ ?

Ein einfaches Modell wäre

$$y = \alpha + \beta x + \text{“Fehler”}.$$

Etwas präziser machen wir die folgende Annahmen.



**Definition 7.22.** Ein lineares Regressionsmodell ist von der Form

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

wobei  $\varepsilon_i$  unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen mit Varianz  $\sigma^2$  sind. In Vektornotationen können wir dieses Modell auch in folgender Form schreiben:

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon. \quad (7.26)$$

Hier betrachten wir  $x_i$  als fest und  $Y_i$  als Zufallsvariablen. Deshalb schreiben wir  $x$  und  $Y$  für die Vektoren  $x = (x_1, \dots, x_n)$  und  $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ . Natürlich sind auch  $\varepsilon_i$  Zufallsvariablen.

Wir betrachten  $\alpha, \beta$  (und vielleicht auch  $\sigma^2$ , obwohl wir es nicht tun) als unbekannte Konstanten, die wir durch Daten schätzen müssen. Unsere Methode der Wahl ist der Maximum-Likelihood Schätzer.

**Satz 7.23.** Seien  $y = (y_1, \dots, y_n)$  die beobachteten Werte für  $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ . Sei  $\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^n x_i$  und  $\bar{y} = (1/n) \sum_{i=1}^n y_i$ . Der Maximum-Likelihood Schätzer für  $\alpha, \beta$  erfüllt

$$(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = \arg \min S(\alpha, \beta)$$

wobei

$$S(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta x_i - \alpha)^2.$$

Explizit erhalten wir

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \bar{x}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2}$$

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}.$$

Der Satz besagt, dass  $\hat{\alpha}$  und  $\hat{\beta}$  durch Minimierung des *quadratischen Fehlers* (quadratic loss) erhalten werden. Aus diesem Grund werden  $\hat{\alpha}$  und  $\hat{\beta}$  auch **Kleinste-Quadrate-Schätzer** genannt.

**Bemerkung 7.24.** Wenn wir  $X$  als unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen betrachten würden (was sie genau nicht sind!) dann könnte man aus dem Gesetz der Großen Zahlen schließen, dass

$$\hat{\beta} \approx \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

*Beweis des Satzes.* Die Zufallsvariablen  $Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$  sind unabhängig (weil  $x$  nicht zufällig ist und  $\varepsilon_i$  unabhängig sind) und ihre Dichtefunktionen sind durch

$$f_{Y_i}(y_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i - \alpha - \beta x_i)^2\right)$$

gegeben. Deshalb ist die Likelihood Funktion gleich

$$L(\alpha, \beta) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2}(y_i - \alpha - \beta x_i)^2\right).$$

Die log-Likelihood erfüllt

$$\ell(\alpha, \beta) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2.$$

Das Problem von log-Likelihood Maximierung ist deshalb äquivalent zu dem Problem der Minimierung von

$$S(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$$

wie gewünscht. Außerdem gilt

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial \alpha} &= -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i) \\ &= -2(n\bar{y} - n\alpha - n\beta\bar{x}) \\ \frac{\partial S}{\partial \beta} &= -2 \sum_i x_i (y_i - \alpha - \beta x_i). \end{aligned}$$

Wenn wir  $\partial S/\partial \alpha = \partial S/\partial \beta = 0$  einsetzen, erhalten wir zwei Gleichungen die wir lösen können:

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x},$$

während

$$\sum_i x_i y_i - \sum_i x_i (\bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}) - \hat{\beta} \sum_i x_i^2 = 0.$$

Das heißt,

$$\hat{\beta}(\sum_i x_i^2 - \bar{x} \sum_i x_i) = \sum_i x_i y_i - \bar{y} \sum_i x_i.$$

Wir dividieren durch  $n$  und erhalten

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \bar{x}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2},$$

wie gewünscht. □

Die Gerade

$$y = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$$

wird als *Regressionsgerade* bezeichnet. Wir beobachten, dass  $(\bar{x}, \bar{y})$  immer auf dieser Linie liegt.

Jetzt untersuchen wir ein Paar Eigenschaften vom MLS  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ . Sind  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  biased? Was sind ihre MQA?

Um diese Fragen zu beantworten ist es praktisch das Problem neu zu parametrisieren. Wir setzen

$$w_i = x_i - \bar{x}$$

und schreiben

$$Y = \alpha + \beta w + \varepsilon \tag{7.27}$$

Das ist äquivalent zu (7.26) obwohl die Werte von  $\alpha$  und  $\beta$  sich ändern werden. In dieser Form ist (7.27) auch eine Regression und deshalb erhalten wir aus Satz 7.23 dass der MLS

$$\hat{\alpha} = \bar{y}, \hat{\beta} = \frac{\sum_i w_i y_i}{\sum_i w_i^2} \tag{7.28}$$

erfüllt.

**Satz 7.25.** *Betrachten wir das Regressionsmodell (7.27) und sei  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  der entsprechende MLS. Dann gilt:*

- $\hat{\alpha} \sim N(\alpha, \sigma^2/n)$
- $\hat{\beta} \sim N(\beta, \frac{\sigma^2}{\sum_i w_i^2})$
- $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  sind unabhängig.

**Bemerkung 7.26.** Bemerken Sie, dass  $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$  unbiased sind. Wir können auch aus diesem Satz schließen, dass  $\hat{\alpha}$  konsistent ist. Falls  $\sum_{i=1}^n w_i^2 \rightarrow \infty$ , ist auch  $\hat{\beta}$  konsistent.

Diese zwei Eigenschaften gelten auch für (7.26), Unabhängigkeit jedoch gilt nur in der Form (7.27).

*Beweis.* Erinnern Sie sich an die explizite Form des MLSes in (7.28). Da  $\hat{\alpha} = \bar{Y}$  erhalten wir sofort die Verteilung von  $\hat{\alpha}$ .  $\hat{\beta}$  ist auch eine Linearkombination von unabhängigen normalverteilten Zufallsvariablen, und ist deshalb auch normalverteilt. Es reicht daher, Erwartungswert und Varianz zu berechnen:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\hat{\beta}) &= \|w\|_2^{-2} \mathbb{E}\left(\sum_i w_i Y_i\right) \\ &= \|w\|_2^{-2} \sum_i w_i \mathbb{E}(Y_i) \\ &= \|w\|_2^{-2} \sum_i w_i (\alpha + \beta w_i) \\ &= \beta.\end{aligned}$$

Außerdem gilt, da  $\varepsilon_i$  unabhängig sind,

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\beta}) &= \|w\|_2^{-4} \sum_i w_i^2 \text{Var}(Y_i) \\ &= \|w\|_2^{-4} \sum_i w_i^2 \sigma^2 \\ &= \sigma^2 / \|w\|_2^2,\end{aligned}$$

wie gewünscht.

Die Unabhängigkeit folgt aus einer wichtigen Eigenschaft von (gemeinsam) normalverteilten Zufallsvariablen, die wir jedoch noch nicht gesehen haben: für solche Zufallsvariablen, impliziert unkorreliert schon unabhängig. Wir setzen diese Eigenschaft voraus und prüfen nur dass  $\text{Cov}(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) = 0$  ist. Man hat

$$\begin{aligned}\text{Cov}(\hat{\alpha}, \hat{\beta}) &= \|w\|_2^{-2} \text{Cov}(\bar{Y}, \sum_i w_i Y_i) \\ &= \frac{1}{n \|w\|_2^2} \sum_{i,j} \text{Cov}(w_i Y_i, Y_j) \\ &= \frac{1}{n \|w\|_2^2} \sum_{i=1}^n w_i \text{Var}(Y_i^2) \\ &= \frac{\sigma^2}{n \|w\|_2^2} \sum_i w_i \\ &= 0,\end{aligned}$$

wie gewünscht. □

## 7.7 Hypothesentest und Neyman–Pearson lemma

Der Hypothesentest ist einer der wichtigsten Bereiche der Statistik. Eine statistische Hypothese ist eine Behauptung oder Vermutung über die Verteilung einer oder mehrerer Zufalls-

variablen. Ein **Test einer statistischen Hypothese** ist eine Regel oder ein Verfahren zur Entscheidung, ob diese Behauptung abgelehnt werden soll.

Ein typisches Beispiel wäre das folgende. Ein\*e Wissenschaftler\*in hat eine neue Theorie, macht Beobachtungen und zeichnet dann die Daten auf. Gibt es in diesen Daten irgendwelche Beweise, um die Hypothese zu verwerfen, dass die derzeit vorherrschende Theorie richtig ist, und um zu schließen dass die neue Theorie besser geeignet ist?

Wir führen einen theoretischen Rahmen ein, um solche Fragen zu beantworten. Dieser Rahmen wird als **Neyman–Pearson** Rahmen genannt. Angenommen, wir haben Daten  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  die sich ergeben nachdem  $n$  mal aus einer Verteilung mit Dichtefunktion bzw. Wahrscheinlichkeitsfunktion  $f$  gezogen wird. Wir haben zwei Hypothesen über  $f$ . Aufgrund der Daten wird die eine akzeptiert, die andere abgelehnt. Die beiden Hypothesen haben jedoch anderen philosophischen Status. Die erste, Nullhypothese genannt, und bezeichnet durch  $H_0$ , ist eine konservative Hypothese, die nicht abgelehnt werden darf, ohne dass die Beweise absolut klar sind.

Die zweite wird sonst als die Alternativhypothese bezeichnet und spezifiziert die Art der Abweichung von der Nullhypothese. Sie wird mit  $H_1$  bezeichnet.

Zum Beispiel wäre für die obige Wissenschaftler\*in  $H_0$  die vorherrschende Theorie, während  $H_1$  die vorgeschlagene neue Theorie würde. Um die vorherrschende Theorie abzulehnen, müssen die Beweise absolut klar sein: sie müssen eine Art Gegenbeispiel sein, so zu sagen. Um ein anderes Beispiel zu geben, sollte die Jury in einem Mordprozess als Nullhypothese nehmen, dass die Angeklagt\*e unschuldig ist. Bei einem Test of eine (seltene) Krankheit wäre die Nullhypothese der Normalzustand, d.h. dass die getestete Person gesund ist, etc.

**Beispiel 7.27.** Wir wollen testen, ob eine Münze fair ist (Nullhypothese  $H_0$ ) d.h. ob sie gleich oft Kopf wie Zahl zeigt. D.h. wir wollen testen, ob eine Münze gemäß  $B(1/2)$  verteilt oder nach  $B(p)$  für  $p \neq 1/2$ . Sei  $\bar{X}_n = \sum_{i \leq n} X_i/n$  die durchschnittliche Anzahl der Köpfe nach  $n$ -maligem Werfen der Münze. Offenbar werden wir  $H_0$  verwerfen, wenn  $\bar{X}_n$  deutlich von  $1/2$  abweicht. Wie groß soll diese Abweichung sein?

Typischer Weise nimmt man an, dass die Dichte  $f$  Element einer Familie  $\{f(\cdot, \theta) : \theta \in \Theta\}$  ist. Die beiden Hypothesen werden dann über Teilmengen  $\Theta_0, \Theta_1$  der Parametermenge  $\Theta$  beschrieben, wobei  $H_i$  dem Fall entspricht, dass  $f = f(\cdot, \theta)$  für  $\theta \in \Theta_i$ :

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1.$$

Man verlangt hier, dass  $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$ . Im Gegensatz dazu kann  $\Theta_0 \cup \Theta_1 = \Theta$  erfüllt sein, muß aber nicht.

Wichtige Beispiele von Tests, die nicht von dieser Form sind *Anpassungstests* (engl: *goodness-of-fit*) bei

$$H_0 : f = f_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : f \neq f_0.$$

Häufig wird dies durch asymptotische Betrachtungen der empirischen Verteilungsfunktion realisiert.

Eine weitere Alternative sind Tests der Form

$$H_0 : f = f_0 \quad \text{gegen} \quad H_1 : f = f_1.$$

Eine Hypothese die  $f$  komplett festlegt heißt *simpel*, z.B.  $\theta = \theta_0$ , andernfalls *zusammengesetzt*.

Angenommen wir wollen  $H_0$  gegen  $H_1$  testen. Ein Test wird durch eine *kritische Region*  $C$  beschrieben. (Im Münzwurfbeispiel wäre  $C$  die Menge aller Folgen von Ausgängen bei denen es deutlich mehr Köpfe gibt.) Das Komplement  $\Theta \setminus C$  bezeichnen wir mit  $\bar{C}$ . Falls

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \in \mathbf{C}$$

wir  $H_0$  *verworfen*. Ist andererseits

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \in \bar{\mathbf{C}}$$

wird  $H_0$  *akzeptiert* oder, genauer, *nicht zurückgewiesen*.

**Beispiel 7.28.** Wir betrachten wieder die Münzwurfsituation aus Beispiel ?? . Angenommen die Münze wird 20 mal geworfen. Wir betrachten die Statistik

$$T(X_1, \dots, X_{20}) := |\bar{X}_{20} - 1/2|.$$

Die Münze ist eher unfair wenn  $T$  deutlich größer als 0 ist. Wir wählen daher

$$C = \{(x_1, \dots, x_{20}) : T(x_1, \dots, x_{20}) > k\},$$

wobei wir uns noch für einen geeigneten Wert von  $k$  entscheiden müssen. (Offenbar passiert es bei recht kleinem  $k$  leicht, dass wir eine faire Münze für fair halten. Bei großem  $k$ , ist das Problem, dass wir vielleicht eine unfaire Münze nicht als solche erkennen.)

Prinzipiell unterscheiden wir beim Testen von Hypothesen zwei Arten von Fehlern:

1. *Fehler erster Art*:  $H_0$  ist wahr, wird aber verworfen. (Die Münze ist fair, aber wir fühlen uns betrogen. Die Unschuldige kommt lebenslang ins Gefängnis. Der eigentlich Gesunde wird fälschlich als krank identifiziert, vielleicht wird ihm das gesunde Bein abgenommen, oder so.). Man spricht hier auch von *falsch positiv*.

Da  $H_0$  als ‘konservativ’ / ‘Normalfall’ angesehen wird, gilt diese Art Fehler als der schwerwiegende Fehler.

2. *Fehler zweiter Art*:  $H_0$  ist falsch, wird aber akzeptiert. Man spricht hier auch von *falsch negativ*.

Basierend auf der Philosophie, dass Fehler erster Art jedenfalls zu vermeiden sind, fixiert man eine Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art, typischer Weise 1% oder 5% und definiert dann die kritische Region  $C$  sodass der Fehler zweiter Art möglichst minimiert wird.

Falls  $H_0$  simpel ist,  $\Theta_0 = \{\theta_0\}$ , nennt man die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler erster Art *Signifikanzniveau* des Tests. Ist  $H_0$  zusammengesetzt, verwendet man stattdessen

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(X \in C)$$

(d.h. man verlangt, dass der Fehler erster Art in jedem Fall möglichst klein bleibt).

**Beispiel 7.29.** Im Münzbeispiel betrachten wir  $\mathbb{P}_{H_0}(|\bar{X}_n - 1/2| > k) = \mathbb{P}_{1/2}(|\bar{X}_n - 1/2| > k)$ . Der Fall von 4 oder mehr Würfeln Überhang entspricht  $k = 3.5/20$ . Hier erhalten wir  $\mathbb{P}_{1/2}(|X_n - 1/2| > 3.5/20) \approx 0.115$ . Das bedeutet, ein so konstruierter Test hat eine Wahrscheinlichkeit für Fehler erster Art von 11.5%. Wenn wir (z.B.) 14 Köpfe sehen, wollen wir also noch nicht auf eine unfaire Münze schließen. Das Ergebnis ist *nicht signifikant*.

Wir betrachten stattdessen einen Überhang von 5 oder mehr. Das entspricht  $k = 4.5/20$  womit wir  $\mathbb{P}_{1/2}(|X_n - 1/2| > 4.5/20) \approx 0.041 < 0.05$  erhalten.

Zusammenfassend: Um einen Münze auf fairness zu testen, werfen wir sie 20 mal. Wenn wir höchstens 5 Köpfe oder höchstens 5 mal Zahl sehen, werden wir sie als unfair betrachten. Das Signifikanzniveau dieses Tests liegt bei 4.1%.

Eine andere Interpretation dieses Ergebnisses ist dass

$$\mathbb{P}_{1/2}(\bar{X}_{20} - 4.5/20 < 1/2 < \bar{X}_{20} + 4.5/20) \approx 95\%.$$

Das illustriert den Zusammenhang zwischen Signifikanzniveau und Konfidenzintervall.

Wir wollen auch noch kurz in diesem Beispiel erläutern, was der sogenannte  $p$ -Wert ist: Wenn wir (z.B.) 14 Köpfe sehen, können wir uns fragen wie wahrscheinlich eine so große (oder noch größere) Abweichung von den 10 erwarteten Köpfen unter  $H_0$  ist. Die Antwort darauf ist gerade

$$\mathbb{P}_{1/2}(|\bar{X}_n - 1/2| > 3.5/20) \approx 0.115.$$

In diesem Fall ist der  $p$ -Wert also 0.115 oder 11.5%. Dieser Wert ist relativ klein und unterstützt die Nullhypothese nicht. Wegen  $11.5\% > 5\%$  ist das Ergebnis jedoch *nicht signifikant*, es reicht nicht um die Nullhypothese zu verwerfen.

Die *likelihood* einer einfachen Hypothese  $H$  (entsprechend dem Parameter  $\theta^*$ ) ist gegeben durch

$$L_x(H) = f_{\theta^*}(x).$$

Im zusammengesetzten Fall, d.h. einer Hypothese  $H$  mit Parameterbereich  $\Theta^*$  verwendet man

$$L_x(H) = \sup_{\theta \in \Theta^*} f_{\theta^*}(x).$$

Die *likelihood ratio* von zwei Hypothesen  $H_0, H_1$  ist gegeben durch

$$L_x(H_0, H_1) = L_x(H_1)/L_x(H_0).$$

**Definition 7.30.** *Ein Test bei dem die kritische Region von der Form*

$$C = \{x : L_x(H_1)/L_x(H_0) > k\}$$

*für eine Konstante  $k$  ist, heißt likelihood ratio Test.*

Im Fall von simplen Hypothesen sind likelihood ratio tests optimal im Sinne des folgenden Lemmas:

**Lemma 7.31** (Neyman-Pearson Lemma). *Seien  $H_0 : f = f_0$  und  $H_1 : f = f_1$ . Hypothesen die gegeneinander getestet werden sollen. Unter allen Tests mit gegebenem Signifikanzniveau  $\alpha$  hat der likelihood ratio test (gegeben durch  $C = \{x : f_1(x)/f_0(x) > k\}$ ) den kleinsten Fehler zweiter Art. Hier ist  $k$  so gewählt, dass*

$$\alpha = \mathbb{P}_0(X \in C) = \int_C f_0(x) dx.$$

*Beweis.* Gegeben sei ein Test mit Signifikanzniveau  $\alpha$  und kritischer Region  $D$  sodass

$$\mathbb{P}_0(X \in D) \leq \alpha.$$

Wir betrachten  $C$  und  $k$  wie in der Formulierung des Lemmas und bemerken dass

$$0 \leq (I_C(x) - I_D(x))(f_1(x) - kf_0(x)).$$

(Wenn der rechte Faktor  $> 0$  ist, dann ist  $x \in C$  und  $I_C(x) = 1$ . Wenn der rechte Faktor  $< 0$  ist, dann ist  $x \notin C$  und  $I_C(x) = 0$ .)

Wir schließen daraus

$$0 \leq \int (I_C(x) - I_D(x))(f_1(x) - kf_0(x)) dx \tag{7.29}$$

$$= \mathbb{P}_1(X \in C) - \mathbb{P}_1(X \in D) - k[\mathbb{P}_0(X \in C) - \mathbb{P}_0(X \in D)] \tag{7.30}$$

$$= \mathbb{P}_1(X \in C) - \mathbb{P}_1(X \in D) - k[\alpha - \mathbb{P}_0(X \in D)] \tag{7.31}$$

$$\leq \mathbb{P}_1(X \in C) - \mathbb{P}_1(X \in D). \tag{7.32}$$

Daher ist  $\mathbb{P}_1(X \notin D)$  mindestens so groß wie  $\mathbb{P}_1(X \notin C)$ . □

## Literatur

- [1] N. Curien. Yet another proof of the strong law of large numbers. 2021.
- [2] H.-O. Georgii. Probabilistic aspects of entropy. In A. Greven, G. Keller, and G. Warnecke, editors, *Entropy*, chapter 3, pages 37–54. Princeton University Press, 2003.
- [3] V. M. Panaretos. *Statistics for Mathematicians: A Rigorous First Course*. Birkhäuser/Springer, [Cham], 2016.
- [4] D. Williams. *Probability with martingales*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 1991.