

ÜBER DIE PERMANENTE GEWISSER ZIRKULANTER MATRIZEN UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDER TOEPLITZ-MATRIZEN

von

ARNOLD RICHARD KRÄUTER*

Zur Einführung werden zwei Anwendungen der Permanente zirkulanter $(0,1)$ -Matrizen auf klassische Abzählprobleme besprochen. Darauf folgt ein kurzer Überblick über die bisher erschienene einschlägige Literatur zu dem im Titel genannten Thema im Falle von $(0,1)$ -Matrizen. Für das analoge Problem bei $(1,-1)$ -Matrizen werden schließlich einige neue Ergebnisse angekündigt, wobei auf die Präsentation der zu ihrer Herleitung erforderlichen Methoden besonderer Wert gelegt wird. Eine dieser Methoden führt nebenbei auf einen neuen Beweis der TOUCHARDSchen Formel für die reduzierten Ménage-Zahlen.

1. Zwei einführende Beispiele

Die Permanente einer $n \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ ist definiert durch

$$(1.1) \quad \text{per } A = \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)},$$

wobei S_n die symmetrische Gruppe der Ordnung n bezeichnet.

Ferner bezeichne I_n die $n \times n$ -Einheitsmatrix, J_n die $n \times n$ -Matrix mit lauter Einsen und P_n jene $n \times n$ -Permutationsmatrix, deren Einsen in den Positionen $(1,2), (2,3), \dots, (n-1,n), (n,1)$ stehen.

Das erste der hier zu behandelnden Beispiele ist das bekannte *problème des rencontres* (MONTMORT, 1708), welches sich so formulieren läßt:

Auf wieviele Arten können sich n Ehepaare zu n Tanzpaaren formieren, so daß kein Herr mit seiner Ehefrau tanzt?

Es bezeichne X_i die Menge jener Damen, die mit dem i -ten Herrn tanzen dürfen ($i=1, \dots, n$). Die *Inzidenzmatrix* für die Mengen X_1, \dots, X_n ist dann gerade $J_n - I_n$ und die gesuchte Anzahl von Möglichkeiten ergibt sich gemäß [15], p. 31 zu

*Überarbeitete Fassung eines anlässlich des Séminaire Lotharingien de Combinatoire (Onzième Session) in Mitwitz (Bundesrepublik Deutschland) am 26. September 1984 gehaltenen Vortrages.

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

$$(1.2) \quad \text{per}(J_n - I_n) = d_n,$$

wobei d_n die n -te *Dérangement-Zahl*

$$(1.3) \quad d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!}$$

bezeichnet. Die Formel (1.2) läßt sich mithilfe elementarer permanententheoretischer Methoden induktiv herleiten (siehe [15], p. 44).

Im Vergleich dazu ist die Lösung des *problème des ménages* (LUCAS, 1891) etwas aufwendiger:

Auf wieviele Arten können sich n Ehepaare an einen runden Tisch setzen, so daß Damen und Herren abwechselnd sitzen und keine Dame neben ihrem Ehemann sitzt?

Wir bestimmen diese Anzahl für den Fall, daß die Sitzordnung der Herren bereits feststeht (dafür gibt es klarerweise $2 \cdot n!$ Möglichkeiten).

Dann lautet die Inzidenzmatrix $J_n - I_n - P_n$ und die gesuchte Antwort

$$(1.4) \quad \text{per}(J_n - I_n - P_n) = \mu_n,$$

wobei μ_n die n -te *reduzierte Ménage-Zahl*

$$(1.5) \quad \mu_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)!$$

bezeichnet (zu dieser Formel siehe TOUCHARD [21], p. 632).

2. Zirkulante und TOEPLITZsche (0,1)-Matrizen

Die im Abschnitt 1 behandelten Matrizen

$$(2.1) \quad J_n - I_n = \sum_{k=1}^{n-1} P_n^k \quad \text{und} \quad J_n - I_n - P_n = \sum_{k=2}^{n-1} P_n^k$$

sind Spezialfälle von

$$(2.2) \quad c_0 I_n + c_1 P_n + c_2 P_n^2 + \dots + c_{n-1} P_n^{n-1},$$

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

wobei die c_k entweder 0 oder 1 sind ($k=0, \dots, n-1$). Eine solche Matrix nennen wir *zirkulante (0,1)-Matrix*: bei gegebener erster Zeile der Matrix geht die $(i+1)$ -te Zeile aus der i -ten ($i=1, \dots, n-1$) durch Verschiebung um eine Spalte nach rechts hervor (das n -te Element der i -ten Zeile wird erstes Element der $(i+1)$ -ten Zeile).

Im allgemeinen ist die Permanente von (2.2) schwer zu berechnen, weshalb explizite Formeln bisher nur für Spezialfälle vorliegen.

Wir wählen zunächst $c_0 = \dots = c_{r-1} = 1$ und $c_r = \dots = c_{n-1} = 0$, betrachten also die Matrizen

$$(2.3) \quad Q(n,r) = \sum_{k=0}^{r-1} P_n^k.$$

Erste Untersuchungen über die Permanente der $Q(n,r)$ stammen von MENDELSON [11]. Das weitere Interesse an dieser Matrizenklasse entspringt dem folgenden in [11], p. 32, Formel (12) enthaltenen Ergebnis, welches in unserer Notation so lautet: Für festes r gilt

$$(2.4) \quad \text{per } Q(n,r) \sim K(r) \cdot \alpha^n,$$

wobei $K(r)$ eine nur von r abhängige Konstante und α die im Intervall $(1,2)$ liegende Wurzel von $x^r - 2x^{r-1} + 1 = 0$ ist.

Für festes $r > 5$ und hinreichend großes n folgt wegen $\alpha < 2$

$$K(r) \cdot \alpha^n < K(r) \cdot 2^n < \left(\frac{r}{e}\right)^n < n! \left(\frac{r}{n}\right)^n,$$

also

$$\text{per } Q(n,r) < n! \left(\frac{r}{n}\right)^n.$$

Damit wäre in $\frac{1}{r} Q(n,r)$ eine einfache Matrizenklasse gefunden, welche die Vermutung von van der WAERDEN (mittlerweile von FALIKMAN und EGORYČEV bewiesen; siehe etwa [10], pp. 47-52) ad absurdum führt. In der Tat konnte MINC [14] zeigen, daß (2.4) bereits für $r \geq 5$ falsch ist. Ferner wies er darauf hin, daß die Formeln für $\text{per } Q(n,3)$ und

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

Satz 2 (MINC [14], pp. 257-258).

Für alle $n \geq 5$ gilt

$$(2.9) \quad \begin{cases} \text{per } Q(n,3) = f_{n-1,2} + 2f_{n-2,2} + 2, \\ \text{per } Q(n,3) = \text{per } Q(n-1,3) + \text{per } Q(n-2,3) - 2, \\ \text{per } Q(n,3) = \left[\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})\right]^n + \left[\frac{1}{2}(1-\sqrt{5})\right]^n + 2 \end{cases}$$

und für alle $n \geq 7$ gilt

$$(2.10) \quad \begin{cases} \text{per } Q(n,4) = 2(f_{n-1,3} + 2f_{n-2,3} + 3f_{n-3,3} + 1), \\ \text{per } Q(n,4) = \text{per } Q(n-1,4) + \text{per } Q(n-2,4) + \text{per } Q(n-3,4) + 4, \\ \text{per } Q(n,4) = 2(\alpha_1^n + \alpha_2^n + \alpha_3^n + 1), \end{cases}$$

wobei $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ die Wurzeln von $x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ sind.

Die in Satz 2 erwähnten Rekursionsformeln für $\text{per } Q(n,r)$ führen zu der folgenden

Vermutung.

Für alle $r \geq 3$ gilt

$$(2.11) \quad \text{per } Q(n,r) = \sum_{k=1}^{r-1} \text{per } Q(n-k,r) + C(r),$$

worin $C(r)$ eine nur von r abhängige Konstante bezeichnet.

Bereits für $r = 5$ konnte aber ein Gegenbeispiel gefunden werden:

Satz 3 (METROPOLIS, STEIN und STEIN [12], p. 292).

Für alle $n \geq 15$ gilt

$$(2.12) \quad \text{per } Q(n,5) = \sum_{k=1}^{10} a_k \text{per } Q(n-k,5) + 24,$$

wobei $(a_1, \dots, a_{10}) = (2, 2, 0, -2, -8, -6, -2, 0, 2, 1)$ ist.

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

In [12] findet man überdies neben einer expliziten Rekursion für $\text{per } Q(n,6)$ ausführliche Tabellen der Werte von $\text{per } Q(n,r)$ für $4 \leq r \leq 9, r \leq n \leq 80$. Eine gegenüber den bereits bekannten Formeln (2.9) neue Darstellung von $\text{per } Q(n,3)$ durch Summen von Binomialkoeffizienten wurde übrigens von KING und BRUCE [7] hergeleitet.

Permanenten von zirkulanten $(0,1)$ -Matrizen, welche sich von den $Q(n,r)$ unterscheiden, wurden im Zusammenhang mit verschiedenen Aufgabenstellungen betrachtet, so beispielsweise bei der Behandlung des *mehrdimensionalen Dimerenproblems* (einen schönen Überblick über den aktuellen Stand dieses von zahlreichen Forschern in Angriff genommenen Problems findet man bei MINC [16], pp. 233-236). Andere erwähnenswerte Untersuchungen stammen von TINSLEY [20] (Charakterisierung der Gleichheit von Permanente und Betrag der Determinante bei sogenannten *Abelschen $(0,1)$ -Matrizen*), BRUALDI und NEWMAN [2] (Studium des asymptotischen Verhaltens der minimalen Permanente zirkulanter $(0,1)$ -Matrizen), KIM und ROUSH [6] (Behandlung einer abgeschwächten Version der Vermutung von van der WAERDEN), NEMETH, SEBERRY und SHU [17] (Bestimmung der Mächtigkeit des Wertebereiches der Permanente auf der Menge aller zirkulanten $n \times n$ - $(0,1)$ -Matrizen) sowie EADES, PRAEGER und SEBERRY [5].

3. Zirkulante und TOEPLITZsche $(1,-1)$ -Matrizen

Zirkulante Matrizen und TOEPLITZ-Matrizen aus den Elementen 1 und -1 treten als extremale Matrizen bei Problemen auf, welche mit der Bestimmung guter oberer Schranken für die Permanente nichtsingulärer $(1,-1)$ -Matrizen zusammenhängen (siehe KRÄUTER und SEIFTER [8], [9] und SEIFTER [19]). Es sind dies Matrizen der Bauart

$$(3.1) \quad T(n,r) = \left[\begin{array}{cccccccc} -1 & \dots & -1 & 1 & \dots & 1 & & \\ 1 & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ \vdots & & & & & & & \\ 1 & \dots & \dots & 1 & & & & -1 \end{array} \right] \left. \vphantom{\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}} \right\} r\text{-mal}$$

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

und

$$(3.2) \quad Z(n,r) = \left[\begin{array}{cccccccc} -1 & \dots & -1 & 1 & \dots & 1 & & \\ & \ddots & & \ddots & & & & \\ & & \ddots & & \ddots & & & \\ & & & \ddots & & & & \\ & & & & \ddots & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & \ddots & \\ -1 & \dots & -1 & 1 & \dots & 1 & & \end{array} \right] \left. \vphantom{\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}} \right\} r\text{-mal}$$

Die im vorigen Abschnitt erwähnte Arbeit [5] verdient wegen der darin enthaltenen Methoden zur Berechnung der Permanente besonderes Interesse. Hier sollen nun zwei weitere Methoden vorgestellt werden, welche bei der Betrachtung von (1,-1)-Matrizen von Nutzen sind. Dazu führen wir einige Bezeichnungen ein. Für $k \leq n$ bezeichne $Q_{k,n}$ die Menge

$$(3.3) \quad Q_{k,n} = \left\{ \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}^k : 1 \leq \alpha_1 < \dots < \alpha_k \leq n \right\} .$$

Für $\alpha, \beta \in Q_{k,n}$ sei $A(\alpha|\beta)$ jene $(n-k) \times (n-k)$ -Untermatrix von A , welche aus A durch Streichung der Zeilen mit den Indizes α und der Spalten mit den Indizes β entsteht (für $k=0$ ist $A(\alpha|\beta) = A$). $A[\alpha|\beta]$ bezeichne das Komplement von $A(\alpha|\beta)$ in A . Zu jeder $n \times n$ -(1,-1)-Matrix A gibt es eine geeignete $n \times n$ -(0,1)-Matrix B , so daß

$$(3.4) \quad A = J_n - 2B$$

gilt. Nach einem Satz über die Permanente der Summe zweier Matrizen (CAIANIELLO [3], p. 644, Formel (18); siehe auch [15], p. 18, Theorem 1.4) haben wir dann

$$(3.5) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{per } A = \sum_{k=0}^n \sum_{\alpha, \beta \in Q_{k,n}} \text{per}(J_n[\alpha|\beta]) \text{per}(-2B(\alpha|\beta)) = \\ = \sum_{k=0}^n (-2)^k (n-k)! \sigma_k(B), \end{array} \right.$$

wobei

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

$$(3.6) \quad \begin{cases} \sigma_k(B) = \sum_{\alpha, \beta \in Q_{k, n-k}} \text{per}(B(\alpha|\beta)) & \text{für } 0 \leq k \leq n-1, \\ \sigma_n(B) = 1 \end{cases}$$

ist. Die Bestimmung der Permanente einer $(1, -1)$ -Matrix ist somit zurückgeführt auf die Berechnung der Summen aller k -reihigen Unterpermanenten einer entsprechenden $(0, 1)$ -Matrix. Die explizite Bestimmung von $\sigma_k(B)$ läßt sich für kleine k noch mit vertretbarem Aufwand durchführen.

In bezug auf die Matrizen (3.1) und (3.2) erhalten wir für $r = 1, 2$ folgende Resultate:

Satz 4.

$$(3.7) \quad \text{per } T(n, 1) = \sum_{k=0}^n (-2)^k \frac{n!}{k!} .$$

$$(3.8) \quad \text{per } Z(n, 1) = \text{per } T(n, 1) .$$

Für $T(n, 1)$ ist nämlich $B = I_n$ und somit für $0 \leq k \leq n$

$$(3.9) \quad \sigma_k(B) = \binom{n}{k} .$$

Satz 5.

$$(3.10) \quad \text{per } T(n, 2) = \sum_{k=0}^n (-2)^k \binom{2n-k}{k} (n-k)! .$$

$$(3.11) \quad \text{per } Z(n, 2) = \text{per } T(n, 2) - 2 \text{per } T(n-1, 2) .$$

$$(3.12) \quad \text{per } Z(n, 2) = \sum_{k=0}^n (-2)^k \frac{2n}{2n-k} \binom{2n-k}{k} (n-k)! .$$

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

Auf die Präsentation detaillierter Beweise sowie auf die Behandlung der Fälle $r \geq 3$ wollen wir hier verzichten; dies soll im Rahmen einer in Vorbereitung befindlichen ausführlichen Note geschehen.

Bemerkung.

Ersetzt man in (3.3) $2B$ durch B , erhält man auf die gleiche Weise anstelle der Beziehungen (3.8) und (3.12) die Formeln (1.3) und (1.5). Die eben skizzierte Methode liefert somit unter anderem einen neuen Zugang zur TOUCHARDSchen Formel für die reduzierten Ménage-Zahlen.

Für große Werte von r ist es nützlich, einen anderen Weg einzuschlagen. Im problème des rencontres ist - mathematisch formuliert - die Anzahl jener Permutationen aus S_n zu bestimmen, welche keinen Fixpunkt besitzen, das heißt kein i wiederum in i überführen. Man kann also sagen, alle (i,j) -ten Elemente der Inzidenzmatrix mit $j = \sigma(i) = i$ für ein $\sigma \in S_n$ repräsentieren *verbotene Positionen* von σ . Diesen Sachverhalt wollen wir folgendermaßen verallgemeinern:

Die Matrix $A = (a_{ij})$ sei gegeben durch

$$(3.13) \quad a_{ij} = \begin{cases} t, & \text{falls } j = \sigma(i) \text{ für ein } \sigma \in S_n \text{ verboten ist,} \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Jedem $\sigma \in S_n$ entspricht umkehrbar eindeutig das Produkt

$a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$; daraus und aus (3.13) folgt somit:

$\sigma \in S_n$ ist eine Permutation mit k verbotenen Positionen genau dann, wenn $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = t^k$ gilt.

Bezeichnet man nun mit v_k die Anzahl der Permutationen mit k verbotenen Positionen, so erhält man bei Summation über alle $\sigma \in S_n$

$$(3.14) \quad \sum_{\sigma \in S_n} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \sum_{k=0}^n v_k t^k = N_n(t).$$

Der Ausdruck auf der linken Seite von (3.14) ist gemäß (1.1) gerade per A. Wir fassen zusammen:

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

$$(3.15) \quad \text{per } A = N_n(t).$$

Diese Beziehung soll im folgenden zur Berechnung von $\text{per } T(n,n)$ herangezogen werden (siehe KRÄUTER und SEIFTER [8], pp. 57-58, Lemma 2).

Die Matrix $S_n(t) = (s_{ij})$ sei definiert durch

$$(3.16) \quad s_{ij} = \begin{cases} t & \text{für } 1 \leq i \leq j \leq n, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann gilt für das gemäß den obigen Ausführungen konstruierte, zur Matrix $S_n(t)$ gehörige Polynom $N_n(t)$ gemäß (3.15)

$$(3.17) \quad \text{per } S_n(t) = N_n(t).$$

Nach RIORDAN [18], p. 215 hat die Folge der Polynome $N_n(t)$ die exponentiell erzeugende Funktion (man definiert $N_0(t) = 0$)

$$(3.18) \quad \sum_{n=0}^{\infty} N_n(t) \frac{x^n}{n!} = \frac{1-t}{1-t \exp[x(1-t)]},$$

aus welcher für $t = -1$ mit (3.17) sofort

$$(3.19) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \text{per } T(n,n) \frac{x^n}{n!} = \frac{2}{1+e^{2x}}$$

folgt. Die gleiche exponentiell erzeugende Funktion besitzt die Zahlenfolge $2^n E_n(0)$, wobei $E_n(y)$ das n -te EULER-Polynom bezeichnet (siehe [4], p. 48, Formel (14b)). Somit ist für alle $n \geq 0$

$$(3.20) \quad \text{per } T(n,n) = 2^n E_n(0).$$

Der bekannte Zusammenhang von $E_n(0)$ mit den BERNOULLI-Zahlen (siehe etwa [1], p. 805, Formel 23.1.20) führt bei geeigneter Zusammenfassung ([1], p. 75, Formel 4.3.67) letztlich auf das folgende Ergebnis:

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

Satz 6.

$$(3.21) \quad \text{per } T(n,n) = (-1)^{(n+1)/2} \tau_n,$$

wobei τ_n die n -te Tangenzahl ([4], p. 259), definiert durch

$$(3.22) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \tau_n \frac{x^n}{n!} = \tan x,$$

ist.

Bemerkung.

Wegen $\tau_{2k} = 0$ ist auch $\text{per } T(2k,2k) = 0$ für alle $k \geq 0$. Dieses Resultat findet man bereits bei WANG [22], p. 359, Example 2.

Abschließend notieren wir noch die (triviale) Formel für $\text{per } Z(n,n)$:

Satz 7.

$$(3.23) \quad \text{per } Z(n,n) = (-1)^n n!.$$

Literatur

- [1] Milton ABRAMOWITZ and Irene A. STEGUN (editors). *Handbook of Mathematical Functions*. Ninth printing. New York: Dover, 1972.
- [2] Richard Anthony BRUALDI and Morris NEWMAN. Some theorems on the permanent. *Journal of Research of the National Bureau of Standards, Section B*, 69, 159 - 163 (1965).
- [3] Eduardo R. CAIANIELLO. Regularization and renormalization I. General Part. *Il Nuovo Cimento, Serie 10*, 13, 637 - 661 (1959).
- [4] Louis COMTET. *Advanced Combinatorics*. Revised and enlarged edition. Translated from the French by J. W. NIENHUYS. Dordrecht: Reidel, 1974.
- [5] Peter EADES, Cheryl Elisabeth PRAEGER and Jennifer Roma SEBERRY. Some remarks on the permanents of circulant (0,1) matrices. *Utilitas Mathematica* 23, 145 - 159 (1983).

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

- [6] Ki Hang KIM and Fred William ROUSH. On a conjecture of Erdős and Rényi. *Linear Algebra and Its Applications* 23, 179 - 189 (1979).
- [7] Bruce W. KING and Francis Dunbar PARKER. A Fibonacci matrix and the permanent function. *The Fibonacci Quarterly* 7, 539 - 544 (1969).
- [8] Arnold Richard KRÄUTER and Norbert SEIFTER. On some questions concerning permanents of $(1,-1)$ -matrices. *Israel Journal of Mathematics* 45, 53 - 62 (1983).
- [9] Arnold Richard KRÄUTER and Norbert SEIFTER. Some properties of the permanent of $(1,-1)$ -matrices. *Linear and Multilinear Algebra* 15, 207 - 223 (1984).
- [10] Arnold Richard KRÄUTER. Permanenten - Ein kurzer Überblick. *Publications de l'Institut de Recherche Mathématique Avancée Strasbourg* 230, 39 - 83 (1984).
- [11] Nathan Saul MENDELSON. Permutations with confined displacements. *Canadian Mathematical Bulletin* 4, 29 - 38 (1961).
- [12] Nicholas METROPOLIS, Marvin Leonard STEIN, and Paul R. STEIN. Permanents of cyclic $(0,1)$ matrices. *Journal of Combinatorial Theory* 7, 291 - 321 (1969).
- [13] Ernest P. MILES, jr. Generalized Fibonacci numbers and associated matrices. *The American Mathematical Monthly* 67, 745 - 752 (1960).
- [14] Henryk MINC. Permanents of $(0,1)$ -circulants. *Canadian Mathematical Bulletin* 7, 253 - 263 (1964).
- [15] Henryk MINC. *Permanents*. Encyclopedia of Mathematics and Its Applications, Volume 6. Reading: Addison-Wesley, 1978.
- [16] Henryk MINC. Theory of permanents 1978 - 1981. *Linear and Multilinear Algebra* 12, 227 - 263 (1983).
- [17] Evi NEMETH, Jennifer SEBERRY, and Michael SHU. On the distribution of the permanent of cyclic $(0,1)$ matrices. *Utilitas Mathematica* 16, 171 - 182 (1979).
- [18] John RIORDAN. *An Introduction to Combinatorial Analysis*. Fourth printing. New York: Wiley, 1967.
- [19] Norbert SEIFTER. Upper bounds for permanents of $(1,-1)$ -matrices. *Israel Journal of Mathematics* (to appear).
- [20] Marion Franklin TINSLEY. Permanents of cyclic matrices. *Pacific Journal of Mathematics* 10, 1067 - 1082 (1960).

A. R. Kräuter: Zirkulante Matrizen

- [21] Jacques TOUCHARD. Sur un problème de permutations. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris* 198, 631 - 633 (1934).
- [22] Edward Tzu-Hsia WANG. On permanents of $(1,-1)$ -matrices. *Israel Journal of Mathematics* 18, 353 - 361 (1974).

Anschrift des Verfassers:

Arnold Richard KRÄUTER
Institut für Mathematik und
Angewandte Geometrie der
Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Straße 18
A-8700 Leoben, Österreich