

Familienname:
Vorname:
Matrikelnummer:
Studienkennzahl:

1
2
3
4
G

- R. Steinbauer
 H. Schichl

Note:

Einführung in das mathematische Arbeiten
(4.5.2007)

1. (*Kurvendiskussion*)

Eine Polynomfunktion p vierten Grades ist symmetrisch um die y -Achse (d.h. $p(-x) = p(x) \forall x \in \mathbb{R}$) und besitzt bei $W = (1, 3)$ einen Wendepunkt. Die Steigung der Tangente in W ist $k_W = 2$.

- (a) Bestimme die Funktionsgleichung von p . (4 Punkte)
(b) Ermittle alle Hoch-, Tief- und Wendepunkte von p . (2 Punkte)
(c) Berechne alle Nullstellen. (2 Punkte)
(d) Ermittle den Inhalt des endlichen Flächenstücks, das von p und der x -Achse eingeschlossen wird. (2 Punkte)

2. (*Analytische Geometrie*)

- (a) Untersuche (rechnerisch) die Lagebeziehung der drei angegebenen Ebenen. Berechne gegebenenfalls Schnittpunkt oder Schnittgeraden.

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 : 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 11 \\ \varepsilon_2 : 2x_1 - 1x_2 - 3x_3 &= -9 \\ \varepsilon_3 : -x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 11.\end{aligned}$$

(6 Punkte)

- (b) Beweise die folgende Aussage: Ist $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ein Vektor im \mathbb{R}^2 , dann sind die Vektoren $y = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$ und $z = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}$ Normalvektoren für x mit gleichem Betrag. (4 Punkte)

3. (a) ($\sqrt{2}$) Zeige dass $\sqrt{2}$ irrational ist. (5 Punkte)

- (b) (*Algebra*) Überprüfe, ob die Menge mit der unten definierten Relation ($G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}, \oplus$) eine Gruppe bildet:

$$(a_1, a_2) \oplus (b_1, b_2) := (a_1 b_2 + b_1 a_2, a_2 b_2).$$

(5 Punkte)

4. (*Sammelsurium*)

- (a) Zeige, dass auf \mathbb{Z}_3 die Operation $\sqrt{a} := \overline{\sqrt{a}}$ nicht wohldefiniert ist. (2 Punkte)
- (b) Sind Körper nullteilerfrei? Warum (nicht)? (2 Punkte)
- (c) Gibt es eine Gruppe mit einem Element? Gibt es einen Körper mit einem Element? (Beispiele oder Gegenargumente; 2 Punkte)
- (d) Bestimme die Potenzmenge von $\{\nabla, *, \circ, \delta, \partial\}$ und gib eine Partition dieser Menge an. (2 Punkte)
- (e) Beweise die Dreiecksungleichung für den Abstand auf \mathbb{R} , d.h. zeige, dass für alle $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$$

gilt. (2 Punkte)