

Erste Schularbeit Mathematik Klasse 7A G am 12.11.2015

SCHÜLERNAME: _____

Punkte im ersten Teil: _____

Punkte im zweiten Teil: _____

Davon Kompensationspunkte: _____

Note: _____

Notenschlüssel:

Falls die Summe der erzielten Kompensationspunkte im zweiten Teil und des ersten Teils weniger als 16 ist, so ist die Note **Nicht Genügend**. Falls diese Summe 16 oder mehr beträgt, dann wird folgender Notenschlüssel benutzt:

NOTENSCHLÜSSEL	
41 - 48 Punkte	Sehr Gut (1)
33 - 40 Punkte	Gut (2)
25 - 32 Punkte	Befriedigend (3)
16 - 24 Punkte	Genügend (4)

Aufgabe 1. (2P) Zahlenmengen.

Es folgen Aussage über Zahlenmengen. Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an!

<input type="checkbox"/>	$2 \cdot 10^{-3}$ ist eine ganze Zahl.
<input type="checkbox"/>	$i \cdot (i + 1)$ liegt in \mathbb{C} und nicht in \mathbb{R} .
<input type="checkbox"/>	$\sqrt{5}$ liegt nicht in \mathbb{Q} .
<input type="checkbox"/>	Das Quadrat einer complexen Zahl liegt in \mathbb{R} .
<input type="checkbox"/>	$1,21 \cdot 10^2$ liegt in \mathbb{Q} und nicht in \mathbb{N} .

Aufgabe 2. (2P) Komplexe Zahlen 1.

Der Betrag einer komplexen Zahl z sei 13. Das Argument von z sei $\frac{5\pi}{6}$ (in Bogenmaß). Bestimmen Sie den Realteil von z .

Realteil von z : _____

Aufgabe 3. (2P) Komplexe Zahlen 2.

Eine reelle quadratische Gleichung $x^2 + px + q = 0$ hat als Lösung eine komplexe Zahl $2 + 3i$. Bestimmen Sie die andere komplexe Lösung und finden Sie p und q - m.a.W. finden Sie einen Term Ausdruck für die quadratische Gleichung.

andere komplexe Lösung: _____

$p =$ _____

$q =$ _____

Aufgabe 4. (2P) Komplexe Zahlen 3.

Gegeben ist die komplexe Zahl $z = 5 + 12i$. Bestimmen Sie den **Realteil** und den **Imaginärteil** der **komplex Konjugierten** zu z und den **Betrag** von z !

Realteil von \bar{z} : _____

Imaginärteil von \bar{z} : _____

Betrag von z : _____

Aufgabe 5. (2P) Äquivalente Terme.

Gegeben sind vier Terme. Ordnen Sie jedem Term in der linken Tabelle den passenden äquivalenten Term aus der rechten Tabelle zu!

Linke Tabelle	
$(x + y)(x - y)$	
$(x - y)^2$	
$(x + y)(x + y)^{-1}$	
$x \cdot (x + y)^{-1}$	

Rechte Tabelle	
A	1
B	$x^2 - 2xy + y^2$
C	$x^2 - 2xy - y^2$
D	$\frac{x}{x+y}$
E	$\frac{x}{x-y}$
F	$x^2 - y^2$

Aufgabe 6. (2P) Quadratische Gleichungen.

Gegeben ist die quadratische Gleichung $3x^2 + 8x + u = 0$. Bestimmen Sie den Wert von u , für welchen die quadratische Gleichung genau eine Lösung hat.

$u =$ _____

Aufgabe 7. (2P) Funktionen und Tabellen.

Betrachten Sie die folgende Tabelle:

t	1	2	3	4	5
$h(t)$	3	8	13	18	23

Kreuzen Sie die richtige Formel für $h(t)$ an!

<input type="checkbox"/>	$h(t) = -2 + 5^t$
<input type="checkbox"/>	$h(t) = 5 \cdot 3^t$
<input type="checkbox"/>	$h(t) = -2 + 5t$
<input type="checkbox"/>	$h(t) = 3 + 5t$
<input type="checkbox"/>	$h(t) = 3 \cdot 5^t$

Aufgabe 8. (2P) Lineare Funktion bei $x = 2$.

Eine lineare Funktion $f(x) = kx + d$ hat folgende Eigenschaften: $f(0) = 4$ und $f(1) = 6$. Bestimmen Sie $f(2)$!

$$f(2) = \underline{\hspace{10em}}$$

Aufgabe 9. (2P) Quotienten.

Gegeben ist eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. (M.a.W. f' existiert.) Kreuzen Sie die korrekten Aussagen an!

<input type="checkbox"/>	$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$
<input type="checkbox"/>	$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ist ein Differenzenquotient.
<input type="checkbox"/>	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ ist ein Differentialquotient.
<input type="checkbox"/>	$f(x) = \lim_{z \rightarrow x} \frac{f'(z) - f'(x)}{z - x}$.
<input type="checkbox"/>	$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Aufgabe 10. (2P) Flächeninhalt eines Kreises.


Die Funktion $f(r) = \pi r^2$ beschreibt den Zusammenhang zwischen dem Radius eines Kreises und seinem Flächeninhalt.

Bestimmen Sie den Radius a , für den gilt $f'(a) = 8\pi$.

Antwort: $a = \underline{\hspace{10em}}$

Aufgabe 11. (2P) Änderungen.

Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion $f(x) = \frac{6}{1+x^2}$.



Kreuzen Sie die beiden Aussagen an, die auf die Funktion f zutreffen!

<input type="checkbox"/>	Die mittlere Änderungsrate von f in $[0; 3]$ beträgt $-1,8$.
<input type="checkbox"/>	Die momentane Änderungsrate von f an der Stelle 1 ist größer als an der Stelle -1 .
<input type="checkbox"/>	Die absolute Änderung von f im Intervall $[-2; 1]$ ist kleiner als 1 .
<input type="checkbox"/>	Die mittlere Änderung von f im Intervall $[-1; 1]$ beträgt Null.
<input type="checkbox"/>	Die Steigung der Tangente an der Stelle 0 ist größer als Null.

Aufgabe 12. (2P) Ermitteln der ersten Ableitung.

Ordnen Sie jeder Funktion ihre Ableitung zu!

Funktionen		Ableitungen	
$f(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + x + 1$		$f'(x) = 2x + 1$	A
$f(x) = x^2 + 2x$		$f'(x) = x^2 - 2x$	B
$f(x) = x + 3$		$f'(x) = x^2 + 2x + 1$	C
$f(x) = x^2 + x$		$f'(x) = 1$	D
		$f'(x) = 2x + 2$	E
		$f'(x) = \frac{x^3}{3} + 2x$	F

Erste Schularbeit Mathematik Klasse 7A G am 12.11.2015

TEIL 2

SCHÜLERNAME: _____

Aufgabe 1. Komplexe Zahlen

Mit zwei komplexen Zahlen z und w kann man in der Gauß'schen Zahlenebene ein Dreieck machen! Die drei Eckpunkte sind dann der Ursprung, z und w .

Damit die drei Punkte nicht auf einer Geraden liegen, muss dann der Imaginärteil von $\frac{z}{w}$ nicht Null sein. Wir gehen davon aus, dass dies der Fall ist.

(a). (2 Kompensationspunkte) Betrachten Sie ein Dreieck in der Gauß'schen Ebene mit Eckpunkten 0 , z und w . Kreuzen Sie an, welche Möglichkeit die Seitenlängen des Dreiecks richtig angibt!

1.	Die drei Seitenlängen des Dreiecks sind z , w und $z - w$.	<input type="checkbox"/>
2.	Die drei Seitenlängen des Dreiecks sind $ z $, $ w $ und $ z - w $.	<input type="checkbox"/>
3.	Die drei Seitenlängen des Dreiecks sind z , w und $z + w$.	<input type="checkbox"/>
4.	Die drei Seitenlängen des Dreiecks sind $ z $, $ w $ und $ z + w $.	<input type="checkbox"/>
5.	Die drei Seitenlängen des Dreiecks sind z , w und $z \cdot w$.	<input type="checkbox"/>

(b). (3 Punkte) Nehmen wir ein konkretes Beispiel: $z = 4$ und $w = 3 + 3i$. Berechnen Sie den Umfang des Dreiecks mit Eckpunkten 0 , z und w .

(c). (3 Punkte) Wieder zurück zum Allgemeinen Fall. Machen Sie eine Skizze und begründen Sie anhand der Skizze, dass der Winkel φ , der beim Ursprung eingeschlossen wird, durch die Differenz zwischen $\text{Arg}(z)$ und $\text{Arg}(w)$ gegeben ist.

Hinweis: Machen Sie eine Skizze! Sie können auch ruhig die Skizze zur Erklärung heranziehen!

Aufgabe 2. Raketenbahnen.

Eine Rakete wird von einer Plattform A in Richtung eines Ziels B abgeschossen. A und B liegen beide auf 0 Meter Seehöhe. Die Höhe der Rakete wird durch folgende Formel beschrieben:

$$h(t) = 100t - 5t^2;$$

in dieser Formel ist t die Zeit in Sekunden nachdem die Rakete abgeschossen wurde und die Höhe $h(t)$ wird in Meter ausgedrückt. Die horizontale Distanz $d(t)$ zwischen Rakete und A wird durch die folgende Formel beschrieben:


$$d(t) = 180 \cdot t, \quad (d(t) \text{ wird in Meter ausgedrückt}).$$

(a) (2 Kompensationspunkte) Geben Sie einen Ausdruck für die erste Ableitung $h'(t)$ und bestimmen Sie eine Zeit t^* , sodass $h'(t^*) = 0$.

(b) (2 Kompensationspunkte) Interpretieren Sie die mathematische Aussage $h'(t) = 0$ korrekt! Kreuzen Sie die beiden richtigen Aussagen an!

1.	Falls $h'(t) = 0$, dann hat die Rakete ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht.	<input type="checkbox"/>
2.	Falls $h'(t) = 0$, hat die Rakete ihren höchsten Punkt erreicht.	<input type="checkbox"/>
3.	Wenn $h'(t) = 0$, dann hat die Rakete eine mittlere Geschwindigkeit von 0 m/s .	<input type="checkbox"/>
4.	Wenn $h'(t) = 0$, dann trifft die Rakete B .	<input type="checkbox"/>
5.	Falls $h'(t) = 0$, dann ist die vertikale Geschwindigkeit Null.	<input type="checkbox"/>

(c) (3 Punkte) Angenommen, die Rakete trifft ihr Ziel B . Berechnen Sie, wie viele Sekunden nach Abschuss die Rakete B trifft, und wie weit A und B aus einander liegen.



Bildverweis: „Minuteman III MIRV path“ by Fastfission: <http://www.nukestrat.com/us/afn/Minuteman.pdf>. Completely re-drawn and re-worked from scratch by Fastfission in Inkscape.. Licensed under Public Domain via Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minuteman_III_MIRV_path.svg#/media/File:Minuteman_III_MIRV_path.svg

Aufgabe 3. Tangenten.

Es sei $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - x$ gegeben.

(a) (3 Punkte) Bestimmen Sie die zwei Punkte P und Q auf dem Graphen von f , sodass die Tangenten am Graphen von f in P und Q parallel zur Geraden $g : 3x - 2y = 8$ sind.

(b) (3 Punkte) Bestimmen Sie die Extrempunkte von f .

Aufgabe 4. Seilbahn

Das Seil einer Materialseilbahn hängt etwas durch und die Höhe des durchhängenden Seils sei ungefähr durch die Funktion $f(x) = \frac{1}{80}(x - 12)^2 + 100$ (mit $0 \leq x \leq 50$) gegeben.

(3 Punkte) Ist das Seil an der Stelle 18 oder an der Stelle 6 steiler? Bestimmen Sie ihre Antwort rechnerisch und überprüfen Sie das Ergebnis anhand einer Skizze!