

ELIMINATION DE GENERATEURS DANS LES STRUCTURES PARTIELLEMENT COMMUTATIVES

par

GÉRARD DUCHAMP

*LITP/LIR, Institut Blaise Pascal
Université Paris 7
2, place Jussieu, 75251 Paris Cedex 05*

Introduction

Les procédés d'élimination se retrouvent en algèbre dans de nombreuses structures différentes. Eliminer un générateur x_n , c'est typiquement écrire, pour une structure *STRUCT* (selon une formulation à la ZEILBERGER [Z]):

$$STRUCT < x_1, x_2, \dots, x_n > \cong NICE < x_1, x_2, \dots, x_n > \diamond STRUCT_1 < x_1, x, \dots, x_{n-1} >$$

où *NICE* et *STRUCT*₁ désignent des structures algébriques engendrées par les générateurs x_i . Le losange, selon les cas, est un produit tensoriel, un produit semi-direct ou une simple factorisation. On peut ainsi écrire pour le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ et le groupe des tresses pures P_n [Bi]:

$$\mathfrak{S}_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \diamond \mathfrak{S}_{n-1} \quad \text{et} \quad P_n \cong F_{n-1} \diamond P_{n-1}$$

dans la première de ces factorisations le losange est un simple produit et la décomposition itérée peut servir à montrer que le groupe symétrique est un groupe de Coxeter ou bien à donner une base du groupe symétrique particulièrement bien adaptée au développement du projecteur de DYNKIN [D1], dans la seconde c'est un produit semi-direct et F_{n-1} est le groupe libre sur $n - 1$ générateurs.

Les structures libres se prêtent bien à l'élimination de générateurs. Par exemple, la formule $k[X_1, X_2, \dots, X_n] \cong k[X_1] \otimes_k k[X_2, \dots, X_n]$ qui est si utile en algèbre commutative, provient de l'élimination de X_1 dans le monoïde libre commutatif $\mathbb{N}\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. De même, lorsqu'on partage un alphabet donné A en $A = B + Z$ on peut écrire, pour le monoïde libre, le groupe libre et l'algèbre de Lie libre:

$$A^* = (B^*Z)^*B^* \quad F(A) \cong F(F(B)Z) \diamond F(B) \quad L(A) \cong L((B^*Z)) \diamond L(B)$$

Les deux derniers losanges sont des produits semi-directs et constituent l'élimination de M.LAZARD [Laz] à proprement parler. Ces décompositions sont étendues au cas partiellement commutatif et nous devons maintenant en dire quelques mots.

Les structures partiellement commutatives sont intermédiaires entre les structures commutatives et non commutatives libres. On a, par exemple, pour un alphabet donné A , le tableau:

	<i>commutatif</i>	<i>non commutatif</i>
<i>monoïde</i>	$N^{(A)}$	A^*
<i>groupe</i>	$Z^{(A)}$	$F(A)$
k - alg. de Lie	$k^{(A)}$	$L_k(A)$
k - alg. assoc. (polynômes)	$k[A]$	$k < A >$

La première structure partiellement commutative présentée comme telle est certainement le monoïde de réarrangements que P.CARTIER et D.FOATA ont défini en 1969 à des fins combinatoires, statistiques et probabilistes [CF].

Depuis, l'histoire de ces structures est à lire parallèlement sur les trois pistes que sont l'algèbre, la combinatoire (algébrique et énumérative) et la théorie des langages.

Pour ce qui est de la combinatoire, signalons que le monoïde partiellement commutatif libre a reçu une représentation géométrique suggestive en termes d'empilements [Vi] qui se prête bien à l'adjonction de structures supplémentaires sur l'alphabet des indéterminées. Cette représentation, essentiellement équivalente à la notion de monoïde partiellement commutatif ([Vi] prop 4.5), a déjà fait ses preuves dans la résolution de plusieurs problèmes combinatoires tels que les hexagones durs de BAXTER, les polynômes orthogonaux et l'énumération des tresses simples.

En théorie des langages, le monoïde partiellement commutatif a été essentiellement employé comme modèle du parallélisme. En effet, de même qu'une suite d'actions $a_1, a_2, \dots, a_n$ peut se représenter par le mot $w = a_1 a_2 \dots a_n$ et la juxtaposition (dans le temps) de deux telles suites, par leur concaténation dans le monoïde libre, de même des actions dont certaines se traitent "en parallèle" ou "indépendamment" peuvent être représentées par des éléments du monoïde partiellement commutatif (ou "traces") et leur composition. Cette théorie des langages, toute jeune, s'intéresse donc à ce qui est parfois appelé "langage trace". On peut citer les travaux fondateurs de ARNOLD, CORI, MAZURKIEWICZ, PERRIN, MÉTIVIER, OCHANSKI et ZIELONKA [Du][CP][HK].

Dans une note à T.C.S., JEAN-YVES THIBON [T] montre que l'algèbre des polynômes partiellement commutatifs (c'est à dire l'algèbre du monoïde partiellement commutatif) est intègre dès que l'anneau des coefficients l'est. Ce fait est relié à la propriété que $k < A, \vartheta >$ est l'algèbre enveloppante de $L_K(A, \vartheta)$; mais la liberté de $k < A, \vartheta >$ (c'est à dire l'existence de bases) n'implique nullement celle de $L_K(A, \vartheta)$ ni la construction de bases combinatoires de celle-ci. La résolution de cette question d'apparence purement esthétique devait d'ailleurs (en 1990) avoir quelque utilité en théorie des langages [DK2] et [Va]. En fait, c'est une version partiellement commutative du procédé d'élimination de M. LAZARD qui permet une démonstration constructive de l'existence des bases (1).

(1) J'avais donné quelque temps avant une preuve de l'existence de bases [D2]. Mais cette preuve a deux défauts: d'abord elle n'est pas constructive et ensuite elle ne peut être généralisée telle quelle à d'autres présentations, même par des mots de Lie, car celles-ci peuvent introduire de la torsion (cf Remarque III.5).

Nous devons maintenant dire quelques mots du procédé lui-même dans le cas partiellement commutatif et, bien qu'il soit apparu pour la première fois (par la nécessité combinatoire du problème) pour l'algèbre de Lie il est plus suggestif de le voir dans le monoïde.

On se souvient de la factorisation $A^* = (B^*Z)^*B^*$ (où $A = B + Z$) qui consiste à dire que, Z étant un sous alphabet de A , tout mot de A^* est "rythmé" par des lettres de Z et donc doit s'écrire de façon unique: $w = w_1z_1w_2z_2 \cdots w_nz_nw_{n+1}$ où $w_i \in B^*$ et $z_i \in Z$. On observe alors facilement que les éléments w_iz_i forment un code [Lo][BP]. La factorisation de $M(A, \vartheta)$ par élimination est l'analogue parfait de ce qui précède, moyennant quelques précautions techniques nécessaires. D'ailleurs l'élimination est toujours possible et fournit une méthode de descente dans les structures partiellement commutatives (2).

Ceci permet aussitôt de montrer que le monoïde partiellement commutatif libre admet une factorisation en monoïdes libres et donc une factorisation complète [DK3][DK5]. Les codes de ces monoïdes sont les analogues de $(BZ)^*$, ils sont apériodiques [D3], et dans le cas d'un alphabet ordonné, l'élimination successive des lettres de poids croissant permet de montrer que la forme normale lexicographique est une section rationnelle. Ces codes seront appelés "codes Z ". Par exemple pour l'alphabet $A = \{a, b, c, d\}$, l'ordre $a < b < c < d$, et le graphe de commutation $a \text{ --- } b \text{ --- } c \text{ --- } d$ on a :

$$A^* = ((d^*b)^*(cc^*d^* + dd^*)a)^*(d^*b)^*c^*d^*$$

L'algèbre de Lie (partiellement commutative) admet une décomposition homogène (pour l'évaluation) en somme directe d'algèbres de Lie libres dont les codes sont précisément les codes Z , cette décomposition permet alors de montrer la liberté de $L(A, \vartheta)$ pour tous les anneaux de coefficients, de donner des algorithmes de calcul des bases et est compatibles avec toutes les bases multihomogènes, comme par exemple la base de Lyndon partiellement commutative (cf [La]) (3). Ces bases sont "universelles" (c'est à dire indépendantes de l'anneau des coefficients) de l'algèbre de Lie partiellement commutative libre. Des cas particuliers d'élimination et de calcul de Witt [DK1] avaient d'ailleurs été traités quelque temps avant par DOROVIČ (cf [Do1] et [Do2]).

I. Préliminaires

Au cours de ce texte, nous ferons appel à la notion de *structure présentée* pour les quatre catégories suivantes: monoïdes (**Mon**), groupes (**Grp**), k -algèbres de Lie Libre (**k-Lie Alg**) et k -algèbres associatives avec élément unité (**k-Alg**).

Soit X un ensemble (un alphabet) et X^* le monoïde libre, $F(X)$ le groupe libre, $L_k(X)$ l'algèbre de Lie libre, $k < X >$ l'algèbre libre c'est à dire les structures librement engendrées par X dans les catégories précédentes. Chacun de ces objets, de façon évidente sera noté $Lib_j(X)$ où $j \in \{ \text{Mon, Grp, k-Lie Alg, k-Alg} \}$. Appellons *relateur* une famille de couples $\mathbf{R} = (u_i, v_i)_{i \in I} \in (Lib_j(X) \times Lib_j(X))^I$, on peut alors se poser la question de la factorisation des morphismes qui coïncident sur les éléments de $\mathbf{R}$. Plus précisément:

(2) Pour une mise en scène des méthodes d'élimination partiellement commutatives on pourra se reporter à leur exposé sous forme d'une pièce de théâtre dans [K].

(3) La décomposition de l'algèbre de Lie correspondant à la suite centrale descendante de P_n [Ca] en algèbres de Lie libres est une image de l'élimination partiellement commutative que nous construisons en III.3.

Existe-t-il un couple $(\alpha, \mathcal{A})$ avec $\mathcal{A} \in \mathcal{Ob}(j)$ et $\alpha \in \text{Mor}_j(\text{Lib}_j(X), \mathcal{A})$ qui vérifie les conditions suivantes ?

SP1) $(\forall i \in I)(\alpha(u_i) = \alpha(v_i))$

SP2) Pour tout $\Phi \in \text{Mor}_j(\text{Lib}_j(X), Y)$ tel que $(\forall i \in I)(\Phi(u_i) = \Phi(v_i))$ il existe $\bar{\Phi} \in \text{Mor}_j(\mathcal{A}, Y)$ tel que le diagramme suivant soit commutatif:




fig.1

La réponse est positive dans chacune des catégories considérées, on a:

Proposition I.1: Pour chacune des catégories $j \in \{ \text{Mon}, \text{Grp}, k\text{-Lie Alg}, k\text{-Alg} \}$ et relateur $\mathbf{R}$, il existe un objet $\langle X; \mathbf{R} \rangle_j$, unique à un isomorphisme près, qui résout le problème précédent.

Preuve: Ces résultats sont classiques.

Dans le cas des monoïdes on montre que $\langle X; \mathbf{R} \rangle_{\text{Mon}} = X^* / \equiv_{\mathbf{R}}$ où $\equiv_{\mathbf{R}}$ est la congruence la plus fine telle que $(\forall i \in I)(u_i \equiv v_i)$.

Pour les groupes c'est $F(X)/H_{\mathbf{R}}$ qui résout la question, où $H_{\mathbf{R}}$ est le sous-groupe distingué (normal) engendré par la famille $(u_i v_i^{-1})_{i \in I}$.

Dans le cas des algèbres (resp. algèbres de Lie) c'est $k \langle X \rangle / \mathfrak{I}$ (resp. $L_k(X)/\mathfrak{I}$) où $\mathfrak{I}$ est l'idéal bilatère (resp. l'idéal de Lie) engendré par les différences $(u_i - v_i)_{i \in I}$ qui est solution du problème. $\square$

Remarques I.2:1) Un morphisme qui vérifie la condition (SP2) $((\forall i \in I)(\Phi(u_i) = \Phi(v_i)))$ est dit *compatible* avec le relateur $\mathbf{R}$ ou qu'il *respecte* les relations de $\mathbf{R}$.

2) Soit ϕ une application $X \rightarrow M$ où M est un objet donné de la catégorie $\mathcal{C}_j$ et $\Phi : \text{Lib}_j(X) \rightarrow M$ son extension à $\text{Lib}_j(X)$. Si Φ respecte les relateurs de $\mathbf{R}$ et que $\bar{\Phi} : \langle X; \mathbf{R} \rangle_j \rightarrow M$ est un isomorphisme. On dira que M admet la présentation $\langle (\phi(x))_{x \in X}; \mathbf{R} \rangle_j$.

II. Exemples d'élimination

1. Mots et autres structures libres

A) MONOÏDE LIBRE

Soit A , un alphabet, Z , un sous-alphabet de A , et $B = A - Z$. Tout $w \in A$, peut se factoriser de façon unique:

$$w = w_1 z_1 w_2 z_2 \cdots w_n z_n w_{n+1}$$

avec $w_i \in B^*$ et $z_i \in Z$. Ce qui revient à écrire:

$$A^* = (B^*Z)^*B^* \quad (\text{II.1.1})$$

B) GROUPE ET ALGÈBRE DE LIE

Pour le groupe libre sur A , on a un analogue de (II.1.1):

$$F(A) \cong F(FB)Z \times F(B)$$

Et pour l'algèbre de Lie:

$$L(A) \cong L(B^*Z) \times L(B)$$

Les deux éliminations précédentes sont dues à M.LAZARD [Laz].

C) GROUPE SYMÉTRIQUE

Si c désigne n'importe quel cycle de longueur maximale dans le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ on :

$$\mathfrak{S}_n = \langle c \rangle . \mathfrak{S}_{n-1}$$

où $\langle c \rangle$ désigne le sous-groupe (d'ordre n) engendré par c . Ce fait est pratiquement évident mais nous le mentionnons parce qu'il ne s'agit pas d'un produit semi-direct. L'égalité précédente montre que, si on se donne des cycles $(c_k)_{k \in \{2, \dots, n\}}$ chacun de longueur k tel que $\text{supp}(c_k) \subseteq \text{supp}(c_{k+1})$ ("supports emboîtés") tout élément $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ s'écrit de façon unique:

$$\sigma = c_2^{\alpha_2} \dots c_n^{\alpha_n} \text{ avec } \alpha_i < i$$

ceci fournit une base de l'algèbre $\mathbb{Q}[\mathfrak{S}_n]$ bien adaptée au développement de l'idempotent de DYNKIN [D1] qui est donné par la formule:

$$nD(x_1x_2x_3 \dots x_n) = [\dots [[x_1, x_2]x_3] \dots x_n]$$

2. Tresses pures

Le groupe des tresses à n brins B_n a été introduit par E.Artin [Ar] en 1925 dans une construction topologique. En fait, le groupe de tresses à n brins, $B_n(M)$ d'une variété connexe M est tout simplement le groupe fondamental de la variété des parties de M à n points distincts (cf [Ca]). Le groupe des tresses classiques est $B_n(\mathbb{R}^2)$. On peut représenter graphiquement une tresse par un diagramme plan formé de n chemins réguliers joignant n points $A_1, \dots, A_n$ sur une même verticale à n autres points $B_1, \dots, B_n$ aussi alignés verticalement et à droite des A_i , les points A_i et B_i étant sur une même horizontale, pour chaque i . Les chemins se coupent transversalement en des points distincts et, à chaque croisement on doit indiquer le brin qui est "au-dessus" et celui qui est "en-dessous" [fig.2]. Deux tresses se composent par juxtaposition et "oubli" des points intermédiaires [fig.3]. Deux tresses sont équivalentes si l'on peut passer de l'une à l'autre par des opérations qui reproduisent, par projection les isotopies de l'espace [fig.4]. Les intuitions que l'on peut avoir sur ce genre de diagramme sont en général confirmées par le calcul (4).

(4) On en verra un exemple en avec l'élimination dans le groupe des tresses pures [cf fig.5].

B_n est engendré par les tresses élémentaires $(t_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ où t_i désigne la tresse obtenue en joignant par des segments de droite les points A_j à B_j pour $j \notin \{i, i+1\}$ ainsi que A_i à B_{i+1} et A_{i+1} à B_i ce dernier brin passant sous le précédent [fig.2]. Ces générateurs vérifient le système (Σ) suivant, qui constitue, comme l'a montré E. ARTIN une présentation de B_n [Ar].

$$(\Sigma_B) \quad \begin{cases} t_i t_j & = t_j t_i \text{ pour } |i-j| \geq 2 \\ t_i t_{i+1} t_i & = t_{i+1} t_i t_{i+1} \text{ pour } i \leq n-2 \end{cases}$$

De même on peut montrer que le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ admet la présentation

$$(\Sigma_{\mathfrak{S}}) \quad \begin{cases} \sigma_i \sigma_j & = \sigma_j \sigma_i \text{ pour } |i-j| \geq 2 \\ \sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i & = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1} \text{ pour } i \leq n-2 \\ \sigma_i^2 & = 1 \text{ pour tout } i \end{cases}$$

où, pour $i \leq n-1$, σ_i est la transposition $(i, i+1)$. Le fait que la famille (σ_i) vérifie (Σ_B) entraîne, l'existence d'un morphisme $\phi: B_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ tel que $(\forall i \in I)(\phi(\sigma_i) = t_i)$. Ce morphisme a un sens géométrique très simple:

dans une tresse τ , le chemin qui part du point $A_i^{(0)}$ aboutit à un point $A_{\pi(i)}^{(1)}$ où $\pi \in \mathfrak{S}_n$ est justement la permutation $\phi(\tau)$.

Le noyau de ϕ est donc formé des tresses qui partent et aboutissent aux points de même indice, on le notera P_n . C'est le groupe des tresses pures.

Comme la présentation de $\mathfrak{S}_n$ s'obtient à partir de celle de P_n en ajoutant les relateurs $(t_i^2 = 1)$, P_n est le sous-groupe distingué engendré par les (t_i^2) . On se convainc assez facilement géométriquement que P_n est engendré par les tresses suivantes [cf fig.6]:

$$g_{ij} = t_{j-1}^{-1} t_{j-2}^{-1} \cdots t_i^2 t_{i-1}^{-1} \cdots t_{j-1} \text{ avec } i < j$$

Proposition II.1: i) $P_n = \langle g_{ij} \rangle_{i < j \leq n}$ et plus précisément

ii) $P_n = \langle g_{i,n} \rangle_{i < n} \times \langle g_{i,j} \rangle_{j < n-1}$ le produit étant semi-direct. Le premier facteur $(\langle g_{i,n} \rangle_{i < n})$ est isomorphe à F_{n-1} et le second $(\langle g_{i,j} \rangle_{j < n-1})$ à P_{n-1}

Preuve: Ces résultats sont classiques et on en trouvera une démonstration topologique dans [Bir]. Une démonstration combinatoire peut se faire par une méthode analogue à celle de prop.III.15 ("recomposition semi-directe").

1): On montre les formules:

$$\begin{aligned} t_i^{-1} g_{r,s} t_i &= g_{r,s} \text{ si } i \notin \{r-1, s-1, s\} \\ t_{r-1}^{-1} g_{r,s} t_{r-1} &= g_{r,s} g_{r-1,s} g_{r,s}^{-1} \\ t_{r-1} g_{r,s} t_{r-1}^{-1} &= g_{r-1,s} \\ t_{s-1} g_{r,s} t_{s-1}^{-1} &= g_{r,s-1} \\ t_{s-1}^{-1} g_{r,s} t_{s-1}^{-1} &= g_{s-1,s}^{-1} g_{r,s-1} g_{s-1,s} \\ t_s^{-1} g_{r,s} t_s &= g_{r,s+1} \\ t_s g_{r,s} t_s^{-1} &= g_{s,s+1} g_{r,s+1} g_{s,s+1}^{-1} \end{aligned}$$

ce qui prouve (i)

2): Les formules précédentes permettent de définir une action de $F(g_{i,j}, i < j < n)$ sur $F_{n-1} = F(g_{i,n}, i < n)$ c'est à dire un homomorphisme $\alpha : F(g_{ij}, i < j < n) \rightarrow \text{Aut}(F(g_{i,n}, i < n))$. On vérifie que cet homomorphisme est compatible avec les relateurs de P_{n-1} (cf Remarques I.2.2) et on a donc ainsi une action de P_{n-1} sur F_{n-1} . Ceci permet de définir le produit semi-direct $F_{n-1} \times P_{n-1}$ puis de montrer qu'il est isomorphe à P_n grâce à la présentation de celui-ci [MKS]. $\square$

III. Elimination dans le cas partiellement commutatif

1. L'algèbre de Lie partiellement commutative

La notion d'algèbre de Lie est historiquement liée à celle de dérivation.

Définition III.1: soit k un anneau et $\mathcal{A}$, une k -algèbre (non nécessairement associative [Bo2]). Une *dérivation* est un élément $D \in \text{End}_k(\mathcal{A})$ vérifiant identiquement:

$$D(xy) = D(x)y + xD(y)$$

Remarques III.2: 1) La composée de de deux dérivations n'est en général pas une dérivation.

2) Par contre le crochet (de Lie) de deux dérivations

$$[D_1, D_2] = D_1 D_2 - D_2 D_1$$

est une dérivation. L'ensemble des dérivations de $\mathcal{A}$ est donc une sous-algèbre de Lie de $\text{End}_k(\mathcal{A})$ qui sera notée $\mathfrak{Der}(\mathcal{A})$.

3) Dans un anneau (ou une algèbre associative) l'application: $x \rightarrow ax - xa = \text{ad}_a(x)$ est une dérivation pour les opérations $\bullet$ et $[,]$. Cette dernière (le crochet de Lie) étant définie par la formule $[x, y] = xy - yx$. On a donc, dans ce cas, les identités:

$$(JAC) \quad [x, [y, z]] = [[x, y], z] + [y, [x, z]]$$

$$(ALT) \quad [x, x] = 0$$

4) La première de ces identités s'appelle *identité de Jacobi* et la seconde exprime que l'application bilinéaire définie par $[,]$ est *alternée* (5) Ceci conduit à la définition suivante:

Définition III.3: On appelle k -algèbre de Lie une k -algèbre qui vérifie identiquement (JAC) et (ALT).

Il résulte des travaux de HALL WITT et MAGNUS [Bo1][Lo] que l'algèbre de Lie libre peut se réaliser comme une algèbre de Lie de polynômes non commutatifs.

(5) Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette identité est essentielle. On pourra consulter par exemple [Cu] pour ce rendre compte de ce qui advient lorsqu'on la supprime.

Proposition III.4: Soit A , un alphabet et k un anneau. On considère $k \langle A \rangle$ ($= k[A^*]$) muni de sa structure d'algèbre de Lie pour $[P, Q] = PQ - QP$. Alors:

La sous-algèbre de Lie $L_k(A)$ de $k \langle A \rangle$ engendrée par A est libre en tant qu'algèbre de Lie. C'est à dire que toute application $\Phi : A \longrightarrow \mathfrak{g}$ (où $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie) se prolonge à $L_k(A)$ de façon que le diagramme suivant soit commutatif:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\Phi} & \mathfrak{g} \\ \text{nat} \downarrow & \nearrow \bar{\Phi} & \\ L_k(A) & & \end{array}$$

fig.7

Conformément à la preuve de prop.I.1, on peut réaliser une algèbre de Lie présentée $\langle A; \mathbf{R} \rangle_{\text{Lie}}$ comme un quotient de l'algèbre de Lie libre. Comme cas particulier on a

$L_k(A, \vartheta) \stackrel{\text{def}}{=} \langle A; ([a, b] = 0)_{(a,b) \in \vartheta} \rangle_{\text{Lie}}$, l'algèbre de Lie partiellement commutative libre associée à un alphabet à commutation (A, ϑ) . On peut alors se poser les questions suivantes:

QUESTION 1: L'algèbre de lie $L_{\mathbf{Z}}(A, \vartheta)$ est-elle libre (en tant que $\mathbf{Z}$ -module) ?

QUESTION 2: Si "oui" comment en construire des bases ?

QUESTION 3: Quelle est l'utilité de résoudre Q1 et Q2 ?

REPOSE 3: Le groupe partiellement commutatif libre est

$$F(A, \vartheta) \stackrel{\text{def}}{=} \langle A; ab = ba \rangle_{(a,b) \in \vartheta} \text{Gr}$$

Si $L_{\mathbf{Z}}(A, \vartheta)$ est sans torsion, $F(A, \vartheta)$ est ordonnable (cf [DK2]) ce qui permet de montrer la décidabilité de l'équivalence des séries partiellement commutatives rationnelles (cf [Va]).

Remarques III.5: 1) Certains relateurs, même composés uniquement de mots de Lie, introduisent de la torsion. Par exemple:

$$(R) \quad \begin{cases} [[[x_1, x_2], x_3], x_3] & = & 0 \\ [[[x_1, x_3], x_3], x_2] & = & 0 \\ [x_1, [[x_2, x_3], x_3]] & = & 0 \end{cases}$$

En effet, on montre que, dans l'algèbre de Lie $\langle x_1, x_2, x_3; \mathbf{R} \rangle_{\mathbf{Z}\text{-Lie Alg}}$ on a

$$P = [[x_1, x_3], [x_2, x_3]] \neq 0 \text{ mais } 2P = 0.$$

La solution de Q2 (et donc de Q1) s'obtient grâce à une adaptation du procédé d'élimination de M.LAZARD au cas partiellement commutatif.

2. Elimination dans $M(A, \vartheta)$

Soit A , un alphabet, on a muni A d'un graphe ϑ , irréflexif et symétrique ($\vartheta \subseteq A^2 - \Delta_A$ et $\vartheta = \vartheta^{-1}$), un tel couple (A, ϑ) sera appelé *alphabet à commutations*. On pose:

$$M(A, \vartheta) \stackrel{\text{def}}{=} \langle A; (xy = yx)_{(x,y) \in \vartheta} \rangle_{\text{Mon}}$$

$M(A, \vartheta)$ est le *monoïde partiellement commutatif* librement engendré par (A, ϑ) , ses éléments seront appelés "mots", "monômes" ou "traces". On note $\equiv_{\vartheta}$, la congruence (sur A^*) engendrée par le relateur $(xy = yx)_{(x,y) \in \vartheta}$. Par exemple, pour $\vartheta = \{(a, b), (b, a), (c, d), (d, c)\}$ (soit graphiquement $a \text{ --- } b \quad c \text{ --- } d$) on a $cabacd \equiv_{\vartheta} ca^2bdc$. De même que les tresses, les mots partiellement commutatifs admettent une représentation graphique qui permet des intuitions justes, ce sont les empilements développés par G.X. VIENNOT et son école [Vi].

L'élimination dans $M(A, \vartheta)$ est l'analogue de la formule (II.1.1) et fait appel à la notion de *sous-alphabet non-commutatif*, et d'*alphabet terminal*.

Définition III.6 : i) On dira que $Z \subseteq A$ est un sous-alphabet *non-commutatif* si

$$(x, y) \in Z^2 \implies (x, y) \notin \vartheta$$

ii) Soit $w \in M(A, \vartheta)$, le sous-alphabet: $AT(w) = \{ a \in A / w \in M(A, \vartheta)a \}$ sera appelé *alphabet terminal de w* .

iii) Soit Z un sous-alphabet non-commutatif de A et B telle que $B \cap Z = \emptyset$. On appelle code " Z " la partie: $C_Z(B) = \{ wz / w \in \langle B \rangle, z \in Z \text{ et } AT(wz) = \{z\} \}$

On a alors la décomposition suivante de $M(A, \vartheta)$.

Théorème III.7: Si $A = B + Z$, et que Z est une partie non-commutative de A , tout mot $w \in M(A, \vartheta)$ s'écrit de façon unique:

$$w = w_1 z_1 w_2 z_2 \cdots w_n z_n w_{n+1}$$

avec $w_i \in \langle B \rangle$ pour $1 \leq i \leq n+1$ et $w_i z_i \in C_Z(B)$.

Preuve: On peut la trouver, par exemple dans [DK3] ou [DK5].

Remarques III.8.1): On voit facilement que pour toute partie $B \subseteq A$ on a $\langle B \rangle \cong M(B, \vartheta_B)$ où ϑ_B désigne le sous-graphe $\vartheta \cap B^2$.

2): Le théorème précédent entraîne l'égalité $M(A, \vartheta) = C_Z(B)^* \langle B \rangle$ ce qui, compte tenu de la remarque précédente, revient à $M(A, \vartheta) = C_Z(B)^* M(B, \vartheta_B)$. Nous sommes donc dans le cadre de la formulation de l'introduction avec $STRUCT = STRUCT_1$.

3): En considérant une *partition chromatique* $(Z_i)_{i \in I}$ de A (c'est à dire en parties non-commutatives) on voit que, dans le cas où I est fini, (ce qui est toujours possible si A l'est) on a:

$$M(A, \vartheta) = C_{Z_{i_1}}(B_{i_1})^* C_{Z_{i_2}}(B_{i_2})^* \cdots C_{Z_{i_n}}(B_{i_n})^*$$

avec $I = \{i_1, i_2 \cdots i_n\}$ et $B_{i_k} = \bigcup_{j > k} Z_{i_j}$.

3. Application à l'algèbre de Lie $L_k(A, \vartheta)$

1^{ère} Etape: Soit (A, ϑ) , un alphabet à commutations et Z une partie non-commutative de A (on posera $B = A - Z$).

Si $wz \in C_Z(B)$ on vérifie que, pour toute écriture $wz = b_1 b_2 \cdots b_p z$, le mot de Lie $[b_1, \cdots [b_{p-1}, [b_p, z]]]$ a la même valeur dans $L_k(A, \vartheta)$. Ce mot sera noté $\alpha(wz)$.

On a donc une factorisation de α :

$$\begin{array}{ccc} C_Z(B) & \xrightarrow{\alpha} & L_k(A, \vartheta) \\ \text{nat} \downarrow & \nearrow \bar{\alpha} & \\ L_k(C_Z(B)) & & \end{array}$$

fig.8

2^{ème} Etape: L'application naturelle $\beta : B \longrightarrow L_k(A, \vartheta)$ respecte les commutations de ϑ_B d'où une factorisation:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\beta} & L_k(A, \vartheta) \\ \text{nat} \downarrow & \nearrow \bar{\beta} & \\ L_k(B, \vartheta_B) & & \end{array}$$

fig.9

3^{ème} Etape: (Action de $L_k(B, \vartheta_B)$ sur $L_k(A, \vartheta)$).

On définit des dérivations par les formules suivantes.

$$\begin{aligned} \partial_b(\alpha(wz)) &= \alpha(bwz) \text{ si } bwz \neq wzb \\ &= 0 \text{ sinon.} \end{aligned}$$

L'application ∂_b s'étend en une dérivation de $L_k(C_Z(B))$ qui vérifie:

$$(b, b') \in \vartheta \implies \partial_b \partial_{b'} = \partial_{b'} \partial_b$$

et, à cause de la présentation de $L_k(B, \vartheta_B)$ (qui est donnée par $\langle B; ([b, b'] = 0)_{(b, b') \in \vartheta_B} \rangle$,

on a une factorisation:

$$\begin{array}{ccc}
 B & \longrightarrow & \mathfrak{Det}(L_k(C_Z(B))) \\
 \text{nat} \downarrow & \nearrow \partial & \\
 L_k(B, \vartheta_B) & &
 \end{array}$$

fig.10

4^{ème} Etape: On définit alors sur $\mathfrak{g} = L_k(C_Z(B)) \oplus L_k(B, \vartheta_B)$ le crochet suivant (6) (produit semi-direct):

$$[P + Q, P' + Q'] = [P, P'] + \partial_Q(P') - \partial_{Q'}(P) + [Q, Q']$$

Théorème III.9 [DK1]: L'application $\gamma : \mathfrak{g} \longrightarrow L_k(A, \vartheta)$ définie par $\gamma(P + Q) = \bar{\alpha}(P) + \bar{\beta}(Q)$ est un isomorphisme d'algèbres de Lie.

Preuve: On pourra trouver, dans [DK1], une preuve qui consiste à examiner le noyau du morphisme naturel $L(A) \longrightarrow L_k(A, \vartheta)$, et une autre dans [DK4] proche dans son esprit de celle qui est évoquée à la proposition II.1.

4. Quelques conséquences

Corollaire III.10: Pour tout anneau k , $L_k(A, \vartheta)$ se plonge naturellement dans $k[M(A, \vartheta)] = k \langle A, \vartheta \rangle$ (polynômes partiellement commutatifs), et s'identifie à la sous-algèbre de Lie engendrée par les lettres.

Remarque III.11: $L_k(A, \vartheta)$ est graduée. En effet, si on pose:

$$L_k^\nu(A, \vartheta) = L_k(A, \vartheta) \cap k^\nu \langle A, \vartheta \rangle$$

pour tout $\nu \in \mathbb{N}^{(A)}$ on a facilement que:

$$Im(\bar{\alpha}) = \bigoplus_{z \in alph(\nu)} L_k^\nu(A, \vartheta)$$

$$Im(\bar{\beta}) = \bigoplus_{z \notin alph(\nu)} L_k^\nu(A, \vartheta)$$

ceci permet de construire facilement des bases de $L_k(A, \vartheta)$, par éliminations successives puisque $Im(\bar{\alpha})$ est libre et que $Im(\bar{\beta}) \cong L_k(B, \vartheta_B)$.

Corollaire III.12: $F(A, \vartheta) = \langle A; (ab = ba)_{(a,b) \in \vartheta} \rangle$, le groupe partiellement commutatif libre, est ordonnable (7).

(6) Cette formule est, comme en théorie des groupes, une imitation des égalités que l'on obtient lorsque l'on a un produit semi-direct interne c'est à dire que $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}'$ où $\mathfrak{h}$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.

(7) C'est à dire peut être muni d'un ordre total compatible avec sa loi [Bo3] [Mu][Neu]

Preuve: On forme la suite centrale descendante définie par

$$F_1 = F \quad \text{et} \quad F_{n+1} = (F_n, F)$$

où (H, K) désigne le sous-groupe engendré par les commutateurs $(hkh^{-1}k^{-1})_{(h,k) \in H \times K}$. Le $\mathbb{Z}$ -module gradué $Gr(F) = \bigoplus_{n \geq 1} F_n/F_{n+1}$ peut être muni d'un crochet de Lie qui "linéarise" l'opération commutateur [MKS] et on peut montrer qu'on a un isomorphisme d'algèbres de Lie graduées $Gr(F) \cong L_{\mathbb{Z}}(A, \vartheta)$. Ce qui prouve que les quotients F_n/F_{n+1} sont des groupes abéliens libres (donc ordonnables). On en déduit alors que $F(A, \vartheta)$ est ordonnable comme dans [Neu].

Remarque III.13: On peut ordonner $F(A, \vartheta)$ par une méthode plus directe [DT].

On a $\dim(k^\nu < A, \vartheta >) = |M^\nu(A, \vartheta)|$. Il résulte donc du travail de P. CARTIER et D. FOATA [CF] que la série de Hilbert de l'algèbre graduée $k < A, \vartheta > = \bigoplus_{\nu \in \mathbb{N}(A)} k^\nu < A, \vartheta >$ s'exprime simplement:

$$\sum_{\nu \in \mathbb{N}(A)} \dim(k^\nu < A, \vartheta >) T^\nu = \left(\sum_{w \in \mathcal{Cl}(\vartheta)} (-1)^{|w|} T_w \right)^{-1}$$

Où $T = (T_a)_{a \in A}$ désigne une famille d'indéterminées commutatives, $\mathcal{Cl}(\vartheta)$ est l'ensemble des mots complètement commutatifs sans multiplicité soit:

$$\mathcal{Cl}(\vartheta) = \{a_1, a_2, \dots, a_n \in M(A, \vartheta) / i < j \implies (a_i, a_j) \in \vartheta\}$$

et $T_{a_1 a_2 \dots a_n} = T_{a_1} T_{a_2} \dots T_{a_n}$. D'autre part, on a l'isomorphisme gradué $k < A, \vartheta > \xrightarrow{k\text{-alg.}} \mathcal{U}(L_k(A, \vartheta))$ et donc grâce au théorème de POINCARÉ-BIRKHOFF-WITT [Bo1] aussi l'isomorphisme gradué $k < A, \vartheta > \xrightarrow{k\text{-mod.}} S((L_k(A, \vartheta)))$. On en déduit:

Corollaire III.14: (Rangs) Soit $l(\nu) = \dim(L_k^\nu(A, \vartheta))$, pour tout $\nu \in \mathbb{N}(A)$. Alors:

$$\sum_{\nu \in \mathbb{N}(A)} \dim(k^\nu < A, \vartheta >) T^\nu = \left(\sum_{w \in \mathcal{Cl}(\vartheta)} (-1)^{|w|} T_w \right)^{-1} = \prod_{\nu \neq 0} (1 - T^\nu)^{-l(\nu)}$$

Preuve: cf [DK1]

On déduit de ce qui précède des formules pour le calcul des rangs qui généralisent celles de Witt.

4. Le groupe partiellement commutatif libre

A) ELIMINATION

On a, là aussi, une formule d'élimination dans $F(A, \vartheta) = \langle A; (ab = ba)_{(a,b) \in \vartheta} \rangle_{\text{Gr}}$.

Soit, comme en III.2, $Z \subseteq A$ un sous-alphabet non-commutatif et B une partie disjointe de Z . On notera $D_Z(B)$ l'orbite $\{wzw^{-1}\}_{w \in \langle B \rangle}$ de Z par les conjugaisons de B .

Proposition III.15: i) $F(A, \vartheta) = \langle D_Z(B) \rangle \times \langle B \rangle$, le produit étant semi-direct.

ii) $\langle D_Z(B) \rangle \cong F(D_Z(B))$ et $\langle B \rangle \cong F(B, \vartheta_B)$.

Preuve: La démonstration est analogue à celle de l'algèbre de Lie libre en remplaçant les dérivations par des automorphismes intérieurs.

Remarque III.16: Avec les notations de II.2, si l'on considère l'alphabet à commutations $A = (g_{ij})_{i < j \leq n}$ et le sous-alphabet $Z = (g_{in})_{i < n}$ on voit que l'élimination dans le groupe des tresse pures est une image de celle qui précède.

b) TRANSFORMATION DE MAGNUS

On peut définir l'algèbre large du monoïde partiellement commutatif libre puisque pour tout $w \in M(A, \vartheta)$ l'ensemble des solutions de $w = uv$ est fini [Bo2]. Elle a pour support le module $k^{M(A, \vartheta)}$ et son produit est:

$$f * g(w) = \sum_{uv=w} f(u)g(v)$$

Notons $k \ll A, \vartheta \gg$ cette algèbre. Pour un anneau de coefficients k donné ("séries formelles partiellement commutatives") et $\mathfrak{M}_k \ll A, \vartheta \gg$ l'idéal $\{S \in k \ll A, \vartheta \gg / S(1) = 0\}$. L'application $a \rightarrow 1+a$ prend ses valeurs dans le groupe $1 + \mathfrak{M}_k \ll A, \vartheta \gg$ des séries de terme constant 1, cette application respecte les relateurs de $F(A, \vartheta)$ si bien qu'on a une factorisation:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad} & 1 + \mathfrak{M}_k \ll A, \vartheta \gg \\ \text{nat} \downarrow & \nearrow \mu & \\ F(A, \vartheta) & & \end{array}$$

fig.11

On peut montrer que μ est injective. C'est la transformation de Magnus. On dira qu'une congruence $\equiv$ sur A^* est compatible avec la transformation de Magnus ssi:

$$u \equiv v \implies \mu(u) \equiv_k \mu(v)$$

où μ est la transformation de Magnus de A^* ($\mu(a_1 a_2 \cdots a_n) = (1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)$) et $\equiv_k$ l'extension par linéarité de $\equiv$ à $k \ll A \gg$. On peut alors préciser les congruences qui, en caractéristique zéro, sont compatibles avec la transformation de Magnus.

Proposition III.17(Duchamp 1991): Soit k , un anneau de caractéristique zéro, A un alphabet et $\equiv$ une congruence sur A^* . Les conditions suivantes sont équivalentes:

- i) $\equiv$ est compatible avec la transformation de Magnus.
- ii) $\equiv$ est engendrée par des différences du type $a - b$ ou $ab - ba$ où a et b sont des lettres.

Preuve: Remarquons d'abord qu'on se ramène aussitôt à $k = \mathbb{Z}$ puisque les images de la transformation de Magnus sont des polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}.1_k$. Montrons alors le sens:

compatible $\rightarrow$ relateurs du type $(a_i = b_i)$ et $(a_j b_j = b_j a_j)$

(la réciproque étant une simple vérification) et plaçons nous sous l'hypothèse où $\equiv$ est compatible avec la transformation de Magnus.

La démonstration comprend 6 étapes.

1): La congruence $\equiv$ est homogène.

En effet, si $u \equiv v$ alors $\mu_k(u) \equiv \mu_k(v)$ et donc $\pi_k^k(\mu_k(u)) = \pi_k^k(\mu_k(v))$ et, en spécialisant tous les mots de $A^*/\equiv$ en $1_{\mathbb{Z}}$, $2^{|u|} = 2^{|v|}$ c'est à dire $|u| = |v|$.

La congruence étant homogène on notera $\equiv^n$ la relation d'équivalence induite sur A^n et $\equiv^{\leq n}$ la congruence engendrée par les relations $u \equiv v$ pour $|u|, |v| \leq n$.

2): Réduction du problème

Considérons un sous-alphabet $S \subseteq A$ qui soit une section de la relation d'équivalence $\equiv^1$ on a alors un isomorphisme naturel $S^*/\equiv_S \rightarrow A^*/\equiv$ ($\equiv_S$ désigne la congruence induite sur S^*) et on vérifie facilement que $\equiv_S$ est aussi compatible avec la transformation de Magnus. Le résultat sera donc prouvé si on démontre que $\equiv_S$ est une congruence partiellement commutative.

3): $\equiv_S$ est multihomogène.

En effet $\mu_{\mathbb{Z}}(u) = 1 + \sum_{a \in S} |u|_a a + \sum \text{termes de longueur} \geq 2$ où $|u|_a$ désigne le degré partiel en la lettre a . La comparaison avec $\mu_{\mathbb{Z}}(v)$ montre que $\sum_{a \in S} |u|_a a = \sum_{a \in S} |v|_a a$ ce qui, en raison de l'indépendance linéaire des lettres entraîne, la propriété:

$$u \equiv_S v \implies (\forall a \in A)(|u|_a = |v|_a)$$

une telle congruence est dite *multihomogène*.

Dans la suite on notera $\equiv$ au lieu de $\equiv_S$.

4): $\equiv$ est simplifiable.

En fait, on a la propriété plus forte que $S^*/\equiv$ se plonge dans un groupe, puisque le fait que $\equiv$ soit compatible avec la transformation de Magnus entraîne que $S^*/\equiv$ se plonge, via cette transformation dans le groupe des éléments f de son algèbre large tels que $f(1) = 1$.

5): Contradiction

Il suffit maintenant de montrer que $\equiv = \equiv^{\leq 2}$. Supposons que ce ne soit pas le cas, on aurait alors un contreexemple de longueur minimale $u \equiv v$ tel que l'on ait pas $u \equiv^{\leq 2} v$ et donc $|u| \geq 3$. On peut écrire $u = u_1 a_n$ avec $a_n \in A$ et $v = v_1 a_n w$ avec $a_n \notin \text{Alph}(w)$. On ne peut avoir $w = 1$ sans quoi, comme $\equiv$ est simplifiable, ceci entraînerait $u_1 \equiv v_1$ puis $u_1 \equiv^{\leq 2} v_1$ en raison de la minimalité du contreexemple et enfin $u \equiv^{\leq 2} v$, contredisant l'hypothèse. En (6) on va montrer qu'on peut toujours se ramener à ce cas, ce qui entraînera l'impossibilité d'un contreexemple minimal, démontrant ainsi la proposition.

6) a_n commute avec w .

Posons $d = |u|_{a_n} = |v|_{a_n}$ et $w = w_1 w_2 \cdots w_k$. Pour toute lettre w_i , le monôme $a_n^d w_i$ qui figure dans $\mu(v)$ figure aussi dans $\mu(u)$. On a donc, en raison de la multihomogénéité, $a_n^d w_i \equiv a_n^{d-j} w_i a_n^j$ et $j \geq 1$ à cause de la forme de u . Ceci entraîne $w_i a_n^j \equiv a_n^j w_i$. En prenant les logarithmes des transformés dans $1 + \mathcal{M}_{\mathbb{Q}}[[S^*/\equiv]]$, on en déduit que $w_i a_n \equiv a_n w_i$ $\square$

Conclusion

Les structures partiellement commutatives sont étroitement liées les unes aux autres. Par exemple on a:

$$k \langle A, \vartheta \rangle = k[M(A, \vartheta)] \cong \mathcal{U}(L_k(A, \vartheta))$$

cela tient à ce que les commutations partielles sont à la fois des relations monoïdales ($ab = ba$) et des relations de Lie ($[a, b] = 0$) et, d'une certaine façon, en caractéristique zéro, ce sont les seules. En fait, on a le théorème suivant:

Théorème de limitation [DK3][DK4]: Soit A , un alphabet et k un anneau de caractéristique zéro (8). On suppose qu'un idéal bilatère $\mathcal{I}$ est engendré (en tant qu'idéal bilatère) par des polynômes de Lie et aussi par des différences de mots. Alors il existe deux familles doubles de lettres $(a_i, b_i)_{i \in I}$ et $(a_j, b_j)_{j \in J}$ tel que $\mathcal{I}$ soit aussi engendré par les polynômes $(a_i - b_i)_{i \in I}$ et $(a_j b_j - b_j a_j)_{j \in J}$.

Ceci implique que $k \langle A \rangle / \mathcal{I}$ est une algèbre de polynômes partiellement commutatifs et montre le caractère très particulier de ces algèbres.

(8) Le théorème ne vaut plus en caractéristique p

BIBLIOGRAPHIE

- [Ar] ARTIN, E., *Theorie der Zöpfe* in Collected papers (Ed. S.Lang et J.Tate), Addison-Wesley (1965).
- [BP] BERSTEL, J., PERRIN, D., *Theory of codes*. Acad. Press. (1985).
- [Bir] BIRMAN, S.J., *Recent developpements in Braid and link theory*. The Mathematical Intelligencer Nov.1991.
- [Bo1] BOURBAKI, N., *Groupes et algèbres de Lie* ch.2 et 3, CCLS 1972.
- [Bo2] BOURBAKI, N., *Algèbre* ch 1 à 3 HERMANN 1970.
- [Bo3] BOURBAKI, N., *Algèbre* ch 6.1 MASSON 1981.
- [Ca] CARTIER, P., *Developpement récents sur les groupes de tresses applications à la topologie et à l'algèbre*. Sem. BOURBAKI 42ème année, 1989-90 716.
- [CF] CARTIER, P., FOATA, D., *Problèmes combinatoires de permutations et réarrangements*, L.N. in Math., 85, Springer Verlag, Berlin (1969).
- [CP] CORI, R., PERRIN, D., *Automates et commutations partielles*, RAIRO Inform.Th., 19, 21-32, 1985.
- [Cu] CUVIER, C., *Homologie des algèbres de Leibnitz*. Thèse Univ. de Strasbourg 12 Jan. 1991.
- [Do1] DOROVIC, D.Z., *A generalization of Witt's formulae*, Jour. of Alg. 111, 262-278 (1987).
- [Do2] DOROVIC, D.Z., *On some inner Derivations of Free Lie Algebras over Commutative Rings*, Jour. of Alg. 119, 233-245 (1988).
- [Du] DUBOC, C., *Commutations dans les monoïdes libres*. Univ.de Rouen (Thèse 1986).
- [D1] DUCHAMP G., *Orthogonal projection onto the free Lie Algebra*, Theor.Comp.Sci. 79 (1991), 227-239.
- [D2] DUCHAMP G., *On the partially commutative free Lie algebra*, Rapport LITP 89.74.
- [D3] DUCHAMP G., *Factorisations partiellement commutatives et apériodicité* rapport LITP 91.08 et actes des journées Montoises 1990 , 42-48.
- [DK1] DUCHAMP G. et KROB D., *The Free Partially commutative Lie Algebra: Bases and Ranks*, rapport LITP 89.93 (à paraître dans Advances in Mathematics).
- [DK2] DUCHAMP G. et KROB D., *The lower central series of the Free Partially Commutative Group*, Rapport LITP 90.32.
- [DK3] DUCHAMP G. et KROB D., *Factorisations dans le monoïde partiellement commutatif libre*, C.R. Acad. Sci. Paris, t. 312, série I (1991), 189-192.
- [DK4] DUCHAMP G., KROB D., *Free partially commutative structures*, Rapports LITP 90.65 et LIR, à paraître au Journal of Algebra.
- [DK5] DUCHAMP G. et KROB D., *Lazard's factorisations of the free partially commutative monoids*, rapport LITP 90.90 et ICALP 1991, MADRID.
- [DT] DUCHAMP, G. THIBON, J-Y. *Decidable orderings for free groups*, manuscrit, 1991.

- [HK] HARJU, T., KARHUMAKI, J., *Decidability of the multiplicity equivalence of multitape finite automata*, T.C.S (1990).
- [K] KROB D., *L'algèbre de Lie partiellement commutative Libre*, rapport LITP 90.74.
- [Laz] LAZARD, M., *Groupes, anneaux de Lie et problème de Burnside*. Inst. Math. dell. Univ. ROMA (1960).
- [Lo] LOTHAIRE, M. *Combinatorics on words* ADDISON-WESLEY (1983)
- [La] LALONDE, P., *Contribution à l'étude des empilements*, Publications du LACIM 4, UQAM Montréal.
- [MKS] MAGNUS, W., KARRASS, A., SOLITAR, D., *Combinatorial group theory*. DOVER 1976.
- [Mu] MURA, R.B., RHEMTULLA, A., *Orderable groups*, MARCEL DEKKER (1977).
- [Neu] NEUMANN, B.H., *On ordered division rings*, Trans.Amer.Math.Soc., 66, 202-252, (1949).
- [T] THIBON, J.Y., *Intégrité des algèbres de séries formelles sur un alphabet partiellement commutatif*, T.C.S (1985), North-Holland.
- [Va] VARRICCHIO, S., *On the decidability of the equivalence problem for partially commutative rational power series*, rapport LITP 90-97.
- [Vi] VIENNOT, G.X., *Heaps of pieces, I: basic definitions and combinatorial lemmas*, in Combinatoire énumérative. Proc., Montréal, Québec 1985, LN in Math 1234, SPRINGER.
- [Z] ZEILBERGER, D., *Identities in search of identities*, Proc. Cong. "Séries Formelles et Combinatoire Algébrique". Bordeaux, 1991.




Fig 3: COMPOSITION

Fig 2: tresse t_i





Fig 4: $t_i t_{i+1} t_i = t_{i+2} t_i t_{i+2}$

Fig 6 g_{ij}




Fig 5: FACTORISATION